

2 0 2 1 中 医 执 业 医 师 考 试



扫码关注更多免费资料及医考资讯

2021 年
中医医师资格考试
专用

第一单元

一、A1型选择题(1~85题)

(答题说明:每一道考题下面有A、B、C、D、E五个备选答案,请从中选择一个最佳答案。)

1. 下列表述中不属于症的是
 - A. 胸闷
 - B. 恶寒
 - C. 口苦
 - D. 发热
 - E. 消渴
2. 人体是一个有机整体,其中心是
 - A. 心
 - B. 脑
 - C. 经络
 - D. 脏腑
 - E. 五脏
3. 精气学说的概念源于
 - A. 庄子
 - B. 孟子
 - C. 老子
 - D. 墨子
 - E. 韩非子
4. 关于阴和阳的概念描述中,最确切的是
 - A. 阴和阳是中国古代的两点论
 - B. 阴和阳即是矛盾
 - C. 阴和阳代表对立的事物
 - D. 阴和阳代表对立又相互关联的事物属性
 - E. 阴和阳说明相互关联着的事件
5. “阴在内,阳之守也;阳在外,阴之使也”,主要说明阴阳之间存在何种关系
 - A. 对立制约
 - B. 互根互用
 - C. 互为消长
 - D. 平衡协调
 - E. 互相转化
6. 下列哪种治法体现了五行相克规律
 - A. 金水相生
 - B. 益火补土
 - C. 抑木扶土
 - D. 滋水涵木
 - E. 培土生金
7. 属于“相侮”的脏病传变是
 - A. 肝病及脾
 - B. 肝病及肾
 - C. 肝病及肺
 - D. 肝病及心
 - E. 脾病及心
8. 具有“主肃降”生理特性的脏是
 - A. 肝
 - B. 心
 - C. 脾
 - D. 肺
 - E. 肾
9. “浊气归心,淫精于脉”中的“浊气”主要靠哪一个脏腑的运化
 - A. 心
 - B. 肺
 - C. 脾
 - D. 肾
 - E. 大肠
10. 促进机体滋润、宁静、成形和制约阳热功能的物质是
 - A. 肾精
 - B. 肾气
 - C. 肾阴
 - D. 肾阳
 - E. 肾血

11. 与维持正常呼吸关系最密切的两脏是
- 心与脾
 - 脾与肾
 - 肾与肝
 - 肝与肺
 - 肺与肾
12. “中精之腑”指
- 胆
 - 胃
 - 大肠
 - 小肠
 - 三焦
13. 具有“喜润恶燥”生理特性的是
- 胆
 - 胃
 - 小肠
 - 大肠
 - 膀胱
14. 何脏在病理状态下会出现“清气在下，则生飧泄”
- 肝
 - 心
 - 脾
 - 肺
 - 肾
15. 脑主司感觉运动，有赖于
- 髓海充养
 - 营血充养
 - 肾精充养
 - 肝血充养
 - 脾精充养
16. “太冲脉衰少，天癸竭，地道不通”指的时间是
- 女子二七
 - 女子七七
 - 女子四七
 - 女子五七
 - 女子六七
17. 灌注于骨节、脏腑、脑髓的是
- 精
 - 气
 - 血
 - 津
 - 液
18. 生命活动的主宰及其总体的外在表现是
- 精
 - 气
 - 血
 - 津液
 - 神
19. 由水谷精微之气中精华部分化生的气是
- 元气
 - 宗气
 - 营气
 - 卫气
 - 脏腑之气
20. 经筋的生理功能是
- 主蓄积渗灌气血
 - 主联络枢机津液
 - 主束骨而利机关
 - 主经气的感应传导
21. 关于体质的特点，说法错误的是
- 先天遗传性
 - 相对稳定性
 - 群类趋同性
 - 后天可调性
22. “从化”是指
- 病情随体质而变化
 - 体质随病情而变化
 - 体质随环境而变化
 - 环境随体质而变化
 - 体质随社会而变化
23. 疾病发生的发病基础是
- 邪气亢盛
 - 正气受损

- C. 正气虚
D. 邪气损正
E. 正气抗邪
24. 劳神过度, 常见临床表现是
A. 腰酸腿软, 精神萎靡
B. 气少力衰, 神疲消瘦
C. 心悸、失眠、纳呆、腹胀、便溏
D. 动则心悸, 气喘汗出
E. 以上均非
25. 风性善动不居, 游走不定, 体现风性
A. 为百病之长
B. 轻扬开泄
C. 善行而数变
D. 主动
E. 以上皆非
26. 除下列哪一项外, 均是《素问·上古天真论》指出的养生的重要原则
A. 法于阴阳
B. 和于术数
C. 起居有节
D. 延年益寿
E. 食饮有节
27. 《素问·评热病论》中“劳风”的治法宜
A. 表里刺之
B. 以救俯仰
C. 饮之服汤
D. 调其虚实
E. 和其顺逆
28. 太阳中风证发热的特点是
A. 蒸蒸发热
B. 翕翕发热
C. 时时发热
D. 或已发热, 或未发热
E. 往来寒热
29. 下列哪项不属于“胃家”的含义
A. 胃
B. 大肠
C. 小肠
D. 膀胱
E. 阳明经
30. 关于通脉四逆汤的加减法, 下列哪项论述是错误的
A. 面色赤加葱九茎
B. 腹中痛, 去甘草加芍药二两
C. 呕者加生姜二两
D. 咽痛者去芍药加桔梗一两
E. 利止脉不出者去桔梗加人参二两
31. 补肝之要妙, 以下哪种方法正确
A. 补用酸, 助用焦苦, 益用甘味之药以调之
B. 补用苦, 助用焦酸, 益用甘味之药以调之
C. 补用辛, 助用焦苦, 益用甘味之药以调之
D. 补用甘, 助用焦苦, 益用辛味之药以调之
E. 补用咸, 助用焦苦, 益用甘味之药以调之
32. 关于桂枝芍药知母汤证的主症, 以下哪项不是
A. 肢节疼痛
B. 头眩短气
C. 温温欲吐
D. 脚肿
E. 口不能言
33. “大逆上气, 咽喉不利, 止逆下气者, 麦门冬汤主之”, 本方主治的脏腑是
A. 心肺
B. 肺肾
C. 肺胃
D. 脾肾
E. 心肾
34. 叶天士《温热论》认为, 伤寒与温病传变的区别是
A. 伤寒之邪恋连在表, 然后化热入里
B. 伤寒之邪流恋在半表半里, 然后化热入里
C. 伤寒之邪流恋在太阳, 然后化热入里
D. 伤寒之邪流恋在里, 然后化热出表
E. 伤寒之邪流恋在阳明经, 然后化热入阳明腑

35. 《温热论》中提到“营分受热”的情况,以下哪项不恰当
- 胃津受劫
 - 心神不安
 - 夜甚无寐
 - 斑疹隐隐
 - 撤去气药
36. 中医诊断的基本原则是
- 整体审察,四诊合参,病证结合
 - 辨证求因,审因论治,脉症合参
 - 证候真假,证候错杂,诊法合参
 - 证候转化,病证结合,辨证求因
 - 司外揣内,见微知著,以常衡变
37. 热极的患者其唇的色泽可表现为
- 唇色深红
 - 唇色青紫
 - 口唇青黑
 - 口唇赤肿而干
 - 口唇呈樱桃红色者
38. 斑与疹的主要区别是
- 是否色红成片
 - 是否时现时隐
 - 是否抚之碍手
 - 是否压之褪色
 - 是否伴有身热
39. 下列哪项不是得神的表现
- 目光精彩
 - 神志清楚
 - 颧赤如妆
 - 面色荣润
 - 呼吸调匀
40. 鼻流浊涕者,多属
- 外感风热
 - 胆经湿热
 - 阳气虚弱
 - 外感风寒
 - 阴虚肺燥
41. 眼窝凹陷多属
- 肺胀
 - 吐泻伤津
 - 肝胆火炽
 - 脾胃虚衰
 - 肾阴不足
42. 舌苔薄白而干者多见于
- 湿浊中阻
 - 食积内停
 - 脾肾阳虚
 - 外感风热
 - 燥热伤津
43. 外感秽浊与热毒之邪相合的舌象是
- 白腻苔
 - 黄腻苔
 - 积粉苔
 - 灰黑苔
 - 腐苔
44. 舌中部点刺者多为
- 肝胆火盛
 - 心火亢盛
 - 肺热壅盛
 - 胃肠热盛
 - 大肠湿热
45. 舌苔脱落处舌面不光滑,仍有新生苔质颗粒者称
- 花剥苔
 - 地图舌
 - 镜面舌
 - 光滑舌
 - 类剥苔
46. 导致出现咳声如犬吠,声音嘶哑,吸气困难的病因是
- 风邪与痰热搏结
 - 久病肺气虚损
 - 燥邪犯肺
 - 寒痰湿浊停肺
 - 阴虚疫毒攻喉
47. 病室中有尸臭气多为
- 患者失血
 - 瘟疫发作
 - 脏腑衰败

- D. 肾衰
E. 消渴病重
48. 病人口气酸腐，脘腹胀满者属
- A. 肝胃蕴热
B. 胃肠蕴热
C. 食积胃肠
D. 内有脓疡
E. 口腔不洁
49. 常见饭后嗜睡，其原因多为
- A. 脾气虚弱
B. 湿邪困脾
C. 心肾阳虚
D. 邪闭心神
E. 以上都不是
50. 大便溏结不调多见于
- A. 脾虚
B. 肾虚
C. 脾肾阳虚
D. 肝郁脾虚
E. 食滞胃肠
51. 下列关于头痛不同性质的内容叙述错误的是
- A. 头痛连项，遇风加重者属风寒头痛
B. 头痛怕热，面红目赤者属风热头痛
C. 头痛如裹，肢体困重者属风湿头痛
D. 头痛绵绵，过劳则盛者属肾虚头痛
E. 头痛眩晕，面色苍白者属血虚头痛
52. 胁痛与下列哪项无关
- A. 饮停胸胁
B. 肝郁气滞
C. 肝胆火盛
D. 寒滞肝脉
E. 肝胆湿热
53. 气滞血瘀的痛证可见哪种脉象
- A. 革脉
B. 紧脉
C. 滑脉
D. 实脉
E. 涩脉
54. 腹部肿块，推之不移，痛有定处者为
- A. 虫积
B. 气鼓
C. 水鼓
D. 积
E. 聚
55. 下列症状哪项不是实证的临床表现
- A. 五心烦热
B. 大便秘结
C. 小便不通
D. 痰涎壅盛
E. 腹痛拒按
56. 下列除哪项外均为苦味药的作用
- A. 清热泻火
B. 泄降逆气
C. 收敛固涩
D. 通泻大便
E. 燥湿坚阴
57. 黄芪与茯苓配伍，茯苓能增强黄芪的补气利尿作用，这种配伍关系是
- A. 相须
B. 相使
C. 相反
D. 相恶
E. 相畏
58. 下列除哪味药物外，均是妊娠禁用药物
- A. 牵牛
B. 桃仁
C. 巴豆
D. 莪术
E. 水蛭
59. 既能发汗解表，又能利水消肿的药物是
- A. 麻黄、荆芥
B. 香薷、紫苏
C. 麻黄、香薷
D. 紫苏、生姜
E. 荆芥、防风
60. 善于鼓舞脾胃清阳之气又可治疗湿热泻

- 痢、脾虚泄泻的药物是
- 芦根
 - 天花粉
 - 葛根
 - 薄荷
 - 桑叶
- 治疗风热、肝热之目赤肿痛的最佳药对是
 - 菊花、木贼
 - 薄荷、柴胡
 - 桑叶、菊花
 - 桑叶、牛蒡子
 - 蝉蜕、乌贼
 - 阴虚火旺、肺肾阴虚所致盗汗、骨蒸潮热、心烦等证，宜选用的药物是
 - 天花粉、沙参
 - 生石膏、黄柏
 - 黄柏、知母
 - 黄芩、地骨皮
 - 牡丹皮、桑白皮
 - 治疗怀胎蕴热、胎动不安者，当选用的药物是
 - 桑寄生
 - 黄芩
 - 紫苏
 - 续断
 - 砂仁
 - 以下哪项是芦根和淡竹叶共有的功效
 - 止呕
 - 利尿
 - 止咳
 - 凉血
 - 以上都不是
 - 鱼腥草的功效是
 - 清热解毒，凉血止血
 - 清热解毒，止痢截疟
 - 清热解毒，息风止痉，清肝明目
 - 清热解毒，消痈排脓，利尿通淋
 - 清热解毒，消痈排脓，祛瘀止痛
 - 既能清热解毒，又能疏散风热的药对是
 - 桑叶、菊花
 - 薄荷、牛蒡子
 - 牛黄、水牛角
 - 金银花、连翘
 - 蒲公英、紫花地丁
 - 善于治疗梅毒或因梅毒服用汞剂而致肢体拘挛的药物是
 - 鱼腥草
 - 土茯苓
 - 败酱草
 - 蒲公英
 - 地肤子
 - 下列关于巴豆的用法及用量叙述正确的是
 - 入丸散，每次 0.1~0.3g
 - 入丸散，每次 0.2~0.5g
 - 入汤剂，每次 0.3~0.5g
 - 入汤剂，每次 0.1~0.5g
 - 入汤剂，每次 0.5~1.5g
 - 下列除哪项外都是主治风湿热痹的药物
 - 桑枝
 - 防己
 - 威灵仙
 - 薏苡仁
 - 络石藤
 - 防己的功效是
 - 祛风湿，舒经络，解表
 - 祛风湿，消骨鲠，解暑
 - 祛风湿，止痛，化湿和胃
 - 祛风湿，止痛，安胎
 - 祛风湿，止痛，利水消肿
 - 可用于养血安胎的药物是
 - 狗脊
 - 砂仁
 - 乌梢蛇
 - 五加皮
 - 桑寄生
 - 既能化湿行气，又能止泻及安胎的药物是
 - 藿香
 - 佩兰

- C. 砂仁
D. 白豆蔻
E. 草果
73. 既能化湿，又能解暑的药物是
A. 藿香、佩兰
B. 苍术、厚朴
C. 砂仁、豆蔻
D. 陈皮、青皮
E. 茯苓、玉竹
74. 既能利水消肿，渗湿健脾，除痹，又能清热排脓的药物是
A. 薏苡仁
B. 车前子
C. 木通
D. 茯苓
E. 滑石
75. 虎杖的功效是
A. 活血调经，清热利湿，解毒消疮，化痰平喘
B. 利湿退黄，清热解毒，散瘀止痛，化痰止咳
C. 活血定痛，清热利湿，解毒通便，化痰止咳
D. 活血通络，祛湿退黄，清热解毒，利尿通便
E. 活血消癥，利湿退肿，解毒疗疮，化痰通便
76. 具有清肺止咳功效的利水渗湿药物是
A. 海金沙
B. 石韦
C. 通草
D. 藜蘆
E. 车前子
77. 既能温中止痛，又能杀虫，可用于蛔虫腹痛、呕吐或吐蛔的药物是
A. 干姜
B. 吴茱萸
C. 砂仁
D. 小茴香
E. 花椒
78. 沉香治疗痰饮喘咳，上盛下虚之证，其作用在于
A. 温肺化饮
B. 燥湿化痰
C. 温肾纳气
D. 益气健脾
E. 补益肺肾
79. 既能消食健胃，又能涩精止遗，还可治疗小儿脾虚疳积的药物是
A. 银柴胡
B. 麦芽
C. 乌梅
D. 莱菔子
E. 鸡内金
80. 川楝子、槟榔皆具有的功效是
A. 杀虫行气
B. 杀虫利水
C. 行气利水
D. 行气疏肝
E. 行气健脾
81. 既能凉血止血，又能清热利尿，清肺胃热的药物是
A. 大蓟
B. 小蓟
C. 白茅根
D. 地榆
E. 槐花
82. 既能收敛止血，止痢，又能截疟，补虚的药物是
A. 苦楝皮
B. 沙苑子
C. 侧柏叶
D. 仙鹤草
E. 三七
83. 桑白皮与葶苈子既能泻肺平喘，又能
A. 利水渗湿
B. 利尿通淋
C. 利水消肿

- D. 利水止泻
E. 利水退黄
84. 具有镇静安神,平肝潜阳,收敛固涩功效的药物是
A. 菊花
B. 夏枯草
C. 龙骨
D. 朱砂
E. 石决明
85. 下列除哪项外,均具有明目功效
A. 菟丝子
B. 金樱子
C. 沙苑子
D. 枸杞子
E. 女贞子

二、A2型选择题(86~90题)

(答题说明:每一道考题是以一个小案例出现的,其下面都有A、B、C、D、E五个备选答案,请从中选择一个最佳答案。)

86. 患者,男,59岁。久病,因精气内伤,肺肾阴虚,虚火灼肺,以致津枯肺损,声音难出,称为
A. 子暗
B. 金破不鸣
C. 金实不鸣
D. 少气
E. 短气
87. 患者头痛且空,每兼眩晕,腰痛酸软,神疲乏力,遗精带下,耳鸣失眠,舌红少苔,脉细无力,此属何种头痛
A. 肝阳头痛
B. 肾虚头痛
C. 气血亏虚头痛
D. 瘀血头痛
E. 痰浊头痛
88. 患儿,男,4岁。因发热,腹泻来诊。脉浮,大小不齐,应考虑为
A. 痰食
B. 风痰
C. 寒湿

- D. 积滞
E. 风热

89. 患者,男,45岁。面色浮红如妆,但非满面通红,口渴但不欲饮,小便清长,舌淡,苔白,脉浮大,按之无力。其病证多为
A. 阴虚火旺
B. 肝胆湿热
C. 实热内炽
D. 真热假寒
E. 真寒假热
90. 患者,男,38岁。近日发热微恶寒,口苦,胁痛,尿短黄,大便粘臭,舌红苔薄白,脉数。其证候是
A. 真寒假热
B. 真热假寒
C. 表热里寒
D. 表寒里热
E. 表里俱热

三、B1型选择题(91~150题)

(答题说明:以下提供若干组考题,每组考题共用在考题前列出的A、B、C、D、E五个备选答案,请从中选择一个与问题最密切的答案,某一个备选答案可能被选择一次、多次或不被选择。)

(91~92题共用备选答案)

- A. 冲脉
B. 任脉
C. 督脉
D. 带脉
E. 阴阳维脉

91. “阳脉之海”指的是
92. “阴脉之海”指的是

(93~94题共用备选答案)

- A. 肝
B. 心
C. 脾
D. 肺
E. 肾

93. “在液为涎”的脏是

94. “在液为泪”的脏是
(95~96 题共用备选答案)
- 脾胃
 - 肝胆
 - 心肾
 - 肝肾
 - 肝肺
95. 与气机调节关系密切的是
96. 气机升降之枢指的是
(97~98 题共用备选答案)
- 胆
 - 胃
 - 小肠
 - 三焦
 - 膀胱
97. 具有受纳水谷功能的是
98. 具有受盛化物功能的是
(99~100 题共用备选答案)
- 精神不集中, 甚则失神狂乱
 - 精神萎靡不振, 气短乏力
 - 二便失禁, 昏厥, 遗精
 - 纳呆, 腹胀
 - 心悸, 惊恐不安
99. 暴喜可引起
100. 过度悲伤可引起
(101~102 题共用备选答案)
- 伏而后发
 - 徐发
 - 继发
 - 感邪即发
 - 复发
101. 感邪后缓慢发病是
102. 疠气致病多为
(103~104 题共用备选答案)
- 眩晕欲仆
 - 目睛上吊
 - 手足蠕动
 - 手足拘挛不伸
 - 咳嗽咽痒
103. 热极生风可见
104. 血虚生风可见
(105~106 题共用备选答案)
- 塞因塞用
 - 寒者热之
 - 热因热用
 - 寒因寒用
 - 通因通用
105. 适用于脾虚腹胀的治则治法是
106. 适用于真热假寒证的治则治法是
(107~108 题共用备选答案)
- 桂枝汤
 - 桂枝加葛根汤
 - 葛根汤
 - 麻黄汤
 - 小青龙汤
107. 太阳病, 项背强几几, 无汗恶风, 治疗宜用
108. 太阳病, 头痛, 发热, 身疼, 腰痛, 骨节疼痛, 无汗而喘, 脉浮紧, 治疗宜用
(109~111 题共用备选答案)
- 理中汤
 - 四逆汤
 - 桂枝人参汤
 - 干姜黄芩黄连人参汤
 - 白头翁汤
109. 太阴病, 见腹满而吐, 腹痛, 食不下, 自利益甚者, 宜选用
110. 少阴病, 见脉微细, 但欲寐, 恶寒蜷卧, 下利清谷者, 选用
111. 厥阴病, 见腹痛, 发热, 口苦, 渴欲饮水, 热利下重者, 治用
(112~114 题共用备选答案)
- 脉浮, 骨节疼痛, 恶风
 - 脉浮, 跗肿, 其腹如鼓
 - 脉沉迟, 喘息
 - 脉沉, 腹满
 - 脉沉迟, 发热, 胸满, 四肢头面肿
112. 皮水的临床表现为

113. 正水的临床表现为
114. 石水的临床表现为
(115~116 题共用备选答案)
- A. 玉女煎
B. 梨皮、蔗浆
C. 金汁
D. 化斑汤
E. 知母、阿胶、龟板
115. 叶天士《温热论》中指出,若斑出热不解,因为胃津亡,轻者治疗可选用
116. 叶天士《温热论》中指出,若斑出热不解,因为胃津亡,重者治疗可选用
(117~118 题共用备选答案)
- A. 胖大舌
B. 瘦薄舌
C. 点刺舌
D. 老舌
E. 强硬舌
117. 气血两虚的舌象是
118. 水湿内停的舌象是
(119~120 题共用备选答案)
- A. 肝风内动
B. 热入心包
C. 阴虚火旺
D. 心脾热盛
E. 中风先兆
119. 歪斜舌多见于
120. 颤动舌多见于
(121~122 题共用备选答案)
- A. 热扰心神
B. 痰热扰心
C. 心气不足
D. 脏气衰微
E. 宗气大虚
121. 导致自言自语,见人便止,首尾不续的病因是
122. 导致语言时有错乱,语后自知言错的病因是
(123~124 题共用备选答案)
- A. 心肾不交
B. 胆郁痰扰
C. 心脾两虚
D. 心阳亏虚
E. 心脉痹阻
123. 睡眠时时惊醒,不易安卧多见于
124. 不易入睡,甚至彻夜不眠,兼心烦不寐多见于
(125~126 题共用备选答案)
- A. 证候相兼
B. 虚实真假
C. 寒热真假
D. 证候错杂
E. 证候转化
125. 麻疹麻毒外透属于
126. 寒包火证属于
(127~128 题共用备选答案)
- A. 气不摄血证
B. 气虚血瘀证
C. 气血两虚证
D. 气随血脱证
E. 气滞血瘀证
127. 症见衄血、面色淡白无华、少气懒言、舌淡白,脉弱属于
128. 症见突然面色苍白、大汗淋漓、脉微欲绝属于
(129~130 题共用备选答案)
- A. 肾虚水泛证
B. 肾阳虚证
C. 肾阴虚证
D. 肾精不足证
E. 肾气不固证
129. 以腰膝酸软,身肿尿少为特征的是
130. 以腰膝酸软,胎动易滑为特征的是
(131~132 题共用备选答案)
- A. 妊娠恶阻,胎动不安证
B. 妊娠胎漏下血,胎动欲坠
C. 妊娠胎热,胎动不安证
D. 妊娠肝肾亏虚,胎动不安证
E. 妊娠脾虚气弱,胎动不安证
131. 白术的主治病证是

132. 桑寄生的主治病证是

(133~134 题共用备选答案)

- A. 开窍醒神, 活血通经, 消肿止痛
- B. 开窍醒神, 清热止痛
- C. 开窍醒神, 清心化痰
- D. 开窍醒神, 化湿和胃, 宁神益智
- E. 开窍醒神, 辟秽止痛

133. 苏合香的功效是

134. 冰片的功效是

(135~136 题共用备选答案)

- A. 金樱子
- B. 覆盆子
- C. 桑螵蛸
- D. 鸡内金
- E. 海螵蛸

135. 既能固精止带, 又能收敛止血的药物是

136. 既能固精缩尿, 又能涩肠止泻的药物是

(137~138 题共用备选答案)

- A. 砒石
- B. 炉甘石
- C. 铅丹
- D. 硼砂
- E. 轻粉

137. 既能治疗咽喉肿痛, 又能治疗肺热咳嗽的药物是

138. 既能治疗瘰疬癰疮, 又能治疗寒痰哮喘的药物是

(139~140 题共用备选答案)

- A. 既能收敛固涩, 又能补肾宁心
- B. 既能敛肺止咳, 又能生津安蛔
- C. 既能敛肺止咳, 又能固精缩尿
- D. 既能敛肺止咳, 又能收敛止血
- E. 既能敛肺止咳, 又能利咽开音

139. 五味子的功效是

140. 诃子的功效是

(141~142 题共用备选答案)

- A. 太子参
- B. 白术
- C. 山药

D. 人参

E. 甘草

141. 治疗脾虚水肿宜选用的药物是

142. 治疗心气虚、脉结代, 宜选用的药物是

(143~144 题共用备选答案)

- A. 滋补肝肾, 养胃生津
- B. 补脾益气, 养胃生津
- C. 滋阴除烦, 养胃生津
- D. 养阴润燥, 清肺生津
- E. 清肺养阴, 益胃生津

143. 北沙参的功效是

144. 天冬的功效是

(145~146 题共用备选答案)

- A. 龟板
- B. 龙骨
- C. 鳖甲
- D. 牡蛎
- E. 代赭石

145. 功效为平肝潜阳, 软坚散结, 收敛固涩的药物是

146. 功效为滋阴潜阳, 软坚散结, 善于治疗阴虚风动的药物是

(147~148 题共用备选答案)

- A. 胃热呕吐
- B. 气逆呕吐
- C. 胃虚呕吐
- D. 胃寒呕吐
- E. 食滞内停呕吐

147. 竹茹可以治疗的病证是

148. 旋覆花可以治疗的病证是

(149~150 题共用备选答案)

- A. 风湿痹痛
- B. 湿热黄疸
- C. 血虚失眠
- D. 肾虚腰痛
- E. 肠燥便秘

149. 川芎可用于治疗的病证是

150. 郁金可用于治疗的病证是

第二单元

一、A1型选择题(1~61题)

(答题说明:每一道考题下面有A、B、C、D、E五个备选答案,请从中选择一个最佳答案。)

- 下列各项中属于“反佐”范畴的是
 - 寒药热服
 - 热因热用
 - 以泻代清
 - 火郁发之
 - 壮水制火
- 败毒散中配伍人参的主要用意是
 - 大补肺脾,以复正气
 - 补脾益肺,培土生金
 - 扶助正气,鼓邪外出
 - 益气生津,以资汗源
 - 益气和中,温阳止痹
- 银翘散中体现去其性而取其用之法的配伍是
 - 银花、连翘
 - 芦根、芥穗
 - 竹叶、薄荷
 - 牛蒡子、苦桔梗
 - 荆芥穗、淡豆豉
- 九味羌活汤的功用是
 - 散寒解表,祛风除湿
 - 发汗解表,疏风止痛
 - 发汗祛湿,兼清里热
 - 宣肺散寒,除湿止痛
 - 散寒除湿,通痹止痛
- 麻子仁丸的组成药物中不含
 - 大黄
 - 枳实
 - 当归
 - 杏仁
 - 芍药
- 半夏泻心汤与小柴胡汤两方组成中均含有

的药物是

 - 人参、生姜、半夏、甘草、大枣
 - 半夏、黄连、黄芩、甘草、大枣
 - 人参、黄芩、半夏、干姜、甘草
 - 柴胡、人参、黄芩、生姜、甘草
 - 半夏、黄芩、人参、炙甘草、大枣
- 青蒿鳖甲汤中青蒿与鳖甲的配伍意义是
 - 除烦坚阴,润燥降火
 - 养血育阴,益气固表
 - 滋阴退热,泻火除烦
 - 益气养血,育阴清热
 - 滋阴清热,内清外透
- 香薷散的功用是
 - 祛湿化浊,理气宽中
 - 散寒解表,化湿和中
 - 解表散寒,理气和中
 - 祛暑解表,化湿和中
 - 祛暑解表,清热化湿
- 四逆汤与当归四逆汤二方组成中均含有的

药物是

 - 当归
 - 附子
 - 桂枝
 - 干姜
 - 甘草
- 防风通圣散的功用是
 - 疏风清热,宣肺止咳
 - 疏风解表,清热通便
 - 和解少阳,内泻热结
 - 辛凉宣肺,清热平喘
 - 解表散寒,温肺化饮
- 当归补血汤原方当归与黄芪的配伍用量比

例是

 - 1 : 1
 - 1 : 2
 - 1 : 5

- D. 2 : 1
E. 5 : 1
12. 炙甘草汤的组成药物中含有
- A. 麦冬、麻仁、枣仁
B. 生地、元参、麦冬
C. 阿胶、当归、芍药
D. 生姜、大枣、黄芪
E. 生地、阿胶、麦冬
13. 左归丸组成中含有而右归丸组成中不含有的药物是
- A. 枸杞子
B. 龟板胶
C. 鹿角胶
D. 山茱萸
E. 菟丝子
14. 桑螵蛸散中配伍龙骨、龟甲的意义是
- A. 补肾助阳，固精缩尿
B. 滋养肾阴，补心安神
C. 收敛固涩，镇心安神
D. 滋阴潜阳，固精缩尿
E. 固涩止遗，补肾益精
15. 苏子降气汤中配伍肉桂的主要用意是
- A. 温阳散寒
B. 温肾纳气
C. 温通经脉
D. 鼓舞气血
E. 散寒止痛
16. 下列何药不是天台乌药散的组成药物
- A. 青皮
B. 槟榔
C. 木香
D. 巴豆
E. 香附
17. 温经汤的组成药物中不包括
- A. 干姜、肉桂
B. 丹皮、麦冬
C. 半夏、甘草
D. 当归、芍药
E. 人参、阿胶
18. 川芎茶调散的组成药物中含有
- A. 牛蒡子
B. 羌活
C. 苍术
D. 当归
E. 蝉蜕
19. 以清宣温燥，润肺止咳为主要功用的方剂是
- A. 杏苏散
B. 增液汤
C. 桑杏汤
D. 养阴清肺汤
E. 清燥救肺汤
20. 猪苓汤与五苓散二方的组成药物中均含有
- A. 白术、茯苓
B. 泽泻、猪苓
C. 滑石、甘草
D. 茯苓、桂枝
E. 滑石、阿胶
21. 肺炎链球菌肺炎抗菌治疗应首选
- A. 红霉素
B. 青霉素 G
C. 复方磺胺甲基异噁唑
D. 氟喹诺酮类
E. 头孢菌素类
22. COPD 急性加重期的重要治疗措施是
- A. 止咳、祛痰
B. 解痉、平喘
C. 控制感染
D. 避免及减少各种诱因
E. 抗过敏
23. 二尖瓣关闭不全的体征，说法不正确的是
- A. 心尖搏动增强呈抬举性
B. 偶可触及收缩期震颤
C. 心浊音界向左下扩大
D. 心尖区可闻及吹风样杂音
E. 心浊音界向左扩大，心腰消失而呈梨形心

24. 心绞痛发作的典型部位是
- 胸骨下段后
 - 剑突下
 - 胸骨上中段之后
 - 心尖部
 - 心前区向颈咽部放射
25. 查体闻及“大炮音”，患者最可能发生的心律失常是
- 二度房室传导阻滞
 - 三度房室传导阻滞
 - 窦房传导阻滞
 - 窦性停搏
 - 一度房室传导阻滞
26. 心绞痛发作时心电图 S-T 段抬高可能是
- 变异型心绞痛
 - 卧位型心绞痛
 - 劳累性心绞痛
 - 稳定型心绞痛
 - 恶化型心绞痛
27. 支气管哮喘的典型表现主要是
- 先兆症状后出现吸气困难
 - 发作性带有哮鸣音的呼气性呼吸困难
 - 伴哮鸣音的混合性呼吸困难
 - 伴哮鸣音的呼吸困难，粉红色泡沫痰
 - 哮喘发作 24 小时以上，伴咯血
28. 肝硬化最常见的并发症是
- 自发性腹膜炎
 - 肝肺综合征
 - 急性上消化道出血
 - 肝性脑病
 - 肝肾综合征
29. 不属溃疡性结肠炎主要临床表现的是
- 里急后重
 - 腹部包块
 - 腹痛
 - 腹泻
 - 黏液脓血便
30. 慢性胃炎最主要的病因是
- 饮食因素
 - 幽门螺杆菌感染
 - 自身免疫反应
 - 十二指肠液反流
 - 遗传因素
31. 慢性肾衰竭时常有的水与电解质紊乱表现是
- 代谢性酸中毒，高钾和低镁血症
 - 代谢性酸中毒，失水和低钠、低钾血症
 - 代谢性酸中毒，低血磷和低钙血症
 - 代谢性碱中毒，低钾和低氮血症
 - 代谢性酸中毒，高磷和低钙血症
32. 关于急性肾盂肾炎临床表现，说法错误的是
- 肉眼血尿
 - 贫血
 - 畏寒、发热
 - 尿频、尿急、尿痛
 - 腰痛
33. 急性型特发性血小板减少性紫癜的特点是
- 多见于女性
 - 无感染病史
 - 多数病程迁延
 - 骨髓幼稚型巨核细胞增多
 - 多见于成人
34. 不属类风湿关节炎关节外表现的是
- 类风湿结节
 - 周围神经病变
 - 贫血
 - 肺间质病变
 - 心脏瓣膜病变
35. 甲亢时最常见的心律失常类型是
- 心房颤动
 - 房室传导阻滞
 - 室性早搏
 - 房性心动过速
 - 交界性早搏
36. 抽搐病因中，属于感染性颅脑疾病的是
- 癫痫
 - 脑外伤
 - 脑肿瘤

- D. 脑寄生虫病
E. 脑血管性疾病
37. 急性心梗患者常有发热,其主要机制是
- A. 变态反应
B. 代谢障碍
C. 体温调节中枢失常
D. 神经功能障碍
E. 吸收热
38. 在非感染性发热中,属抗原-抗体反应性疾病的是
- A. 血清病
B. 中暑
C. 重度安眠药中毒
D. 大面积烧伤
E. 急性心肌梗死
39. 发热 10 天,每天体温最高达 39.6°C ~ 40.1°C ,最低 37.6°C ,试问该热型属于
- A. 波状热
B. 稽留热
C. 弛张热
D. 不规则热
E. 间歇热
40. 脑出血引起发热的主要原因是
- A. 皮肤散热量的减少
B. 感染性发热
C. 植物神经功能紊乱
D. 体温调节中枢的功能失常
E. 无菌性坏死物质的吸收
41. 反复发作的呼气性呼吸困难,主要见于
- A. 气道异物
B. 支气管哮喘
C. 大叶性肺炎
D. 肺不张
E. 气胸
42. 肺气肿时,呼吸困难的主要特点是
- A. 呼气费力
B. 吸气和呼气均感费力
C. 呼吸浅快
D. 吸气费力
E. 呼吸深慢
43. 引起痰分层现象的疾病是
- A. 肺炎链球菌肺炎
B. 心源性哮喘
C. 慢性支气管炎
D. 肺脓肿
E. 肺结核
44. 下列可以表现为局部性水肿的是
- A. 创伤
B. 丝虫病
C. 局部炎症
D. 血栓性静脉炎
E. 以上都是
45. 幽门梗阻时,呕吐物多为
- A. 咖啡色
B. 黄绿色稀薄液
C. 含血液
D. 隔日食物
E. 大量黏液
46. 关于腹痛部位,下列叙述正确的是
- A. 胃、十二指肠溃疡疼痛多在脐周
B. 急性阑尾炎疼痛在右下腹麦氏点
C. 小肠疾病疼痛多在右上腹
D. 胆囊炎疼痛多在左上腹
E. 肝脓肿疼痛多在中下腹
47. 关于黄疸的特点,下列说法正确的是
- A. 溶血性黄疸以非结合胆红素增多为主
B. 肝细胞性黄疸尿胆红素阴性
C. 胆汁淤积性黄疸尿胆原增多
D. 肝细胞性黄疸尿胆原减少
E. 胆汁淤积性黄疸尿胆红素阴性
48. 下列不属于个人史的是
- A. 社会经历
B. 习惯与嗜好
C. 冶游史
D. 职业和生活条件
E. 生育史
49. 下列不符合心包摩擦音特点的是
- A. 收缩期及舒张期均可听到
B. 通常在胸骨左缘 3、4 肋间易听到

- C. 将听诊器胸件向胸部加压时, 可使摩擦音增强
D. 屏住呼吸时摩擦音消失
E. 病人采取坐位稍前倾时, 易于听到
50. 高钾血症见于
A. 肺心病
B. 呼吸性酸中毒
C. 代谢性酸中毒
D. 代谢性碱中毒
E. 以上均不是
51. 突感胸骨后疼痛伴有胸闷、憋气, 急查心电图见各导联 S-T 段均呈水平型下移达 0.1mV, 伴有 T 波倒置, 以往心电图正常。最可能的诊断是
A. 变异型心绞痛
B. 急性心肌梗死
C. 典型心绞痛发作
D. 陈旧性心肌梗死
E. 左心室劳损
52. 不属确立诊断的步骤及原则的是
A. 调查研究
B. 搜集资料
C. 综合分析
D. 患者签名
E. 初步诊断
53. 叩诊肝浊音界下移见于
A. 右肺纤维化
B. 胃肠穿孔
C. 气腹
D. 鼓肠
E. 右侧张力性气胸
54. 尿中不会出现管型的疾病是
A. 慢性肾炎
B. 肾盂肾炎
C. 肾病综合征
D. 狼疮性肾炎
E. 急性膀胱炎
55. 高热 3 天, 体温 39.9℃, 胸痛, 咳嗽, 咯痰。胸片显示肺野出现均匀性密度增高的片状阴影, 病变范围呈大叶性分布, 在大片密实阴影中常可见到透亮的含气支气管影。考虑是
A. 大叶性肺炎
B. 支气管肺炎
C. 右上肺不张
D. 肺结核
E. 中心性肺癌
56. 对医学道德的认识不正确的是
A. 医务人员容易理解、接受
B. 人道主义精神的集中体现
C. 只存在于从事医生职业活动的人们中间
D. 在内容上具有稳定性、连续性
E. 在形式上比较具体、生动
57. 医务人员对患者诚信、宽厚, 潜心医学事业, 对医学科学忠诚, 体现了
A. 仁爱
B. 严谨
C. 诚挚
D. 公正
E. 奉献
58. 医学人道主义的含义包括
A. 认为人的生命是宝贵的
B. 人的生命和尊严具有最高的价值
C. 医学人道主义要求医务人员同情、关心、尊重和爱护患者
D. 是人道主义思想在医学领域中的具体体现
E. 以上皆是
59. 患者的基本权利不包括
A. 基本医疗权
B. 疾病认知权
C. 知情同意权
D. 自主决定权
E. 社会免责权
60. 人体实验类型中, 无需承担道德代价的是
A. 天然实验
B. 自愿实验

- C. 欺骗实验
- D. 强迫实验
- E. 自我实验

61. 国家卫生部关于《人类辅助生殖技术和人类精子库伦理原则》的制定时间是
- A. 1990年
 - B. 1995年
 - C. 2000年
 - D. 2003年
 - E. 2005年

二、A2型选择题(62~90题)

(答题说明:每一道考题是以一个小案例出现的,其下面都有A、B、C、D、E五个备选答案,请从中选择一个最佳答案。)

62. 患者,女,38岁。脘腹绵绵作痛,喜温喜按,呕吐便溏,脘痞食少,畏寒肢冷,口不渴,舌淡苔白润,脉沉细。治宜选用
- A. 小建中汤
 - B. 吴茱萸汤
 - C. 参苓白术散
 - D. 补中益气汤
 - E. 理中丸
63. 患者,男,58岁。近日生气后胸膈痞闷,脘腹胀痛,嗳腐吞酸,恶心呕吐,饮食不消,治疗应首选
- A. 藿香正气散
 - B. 平胃散
 - C. 半夏厚朴汤
 - D. 半夏泻心汤
 - E. 越鞠丸
64. 患者,女,26岁。已婚,产后受寒,瘀血内阻,恶露不行,小腹冷痛。治疗应首选
- A. 生化汤
 - B. 复元活血汤
 - C. 四物汤
 - D. 桃核承气汤
 - E. 血府逐瘀汤
65. 患者,男,48岁。近日寒热如疟,寒轻热重,口苦膈闷,吐酸苦水,或呕黄涎而黏,舌红

苔白腻,脉弦滑数。治疗应首选

- A. 小柴胡汤
 - B. 大柴胡汤
 - C. 半夏泻心汤
 - D. 蒿芩清胆汤
 - E. 逍遥散
66. 张某,60岁。干咳、胸痛、发热、消瘦1个月,经检查诊断为小细胞肺癌,其治疗首选
- A. 化疗
 - B. 手术治疗
 - C. 放射治疗
 - D. 干扰素
 - E. 集落刺激因子
67. 患者高热、胸痛、咳嗽、咳痰,经检查诊断为肺炎链球菌肺炎,其治疗应首选
- A. 青霉素
 - B. 红霉素
 - C. 磺胺药
 - D. 氟喹诺酮类药
 - E. 头孢唑啉钠
68. 患者慢性肝炎病史5年,近1个月来病情恶化,为早期诊断肝硬化,最有价值的检查是
- A. X线检查
 - B. 放射性核素检查
 - C. 肝活检
 - D. B超检查
 - E. AFP检查
69. 患者,男,52岁。胃溃疡病史10年,近1个月来疼痛的节律性消失,食欲减退,体重减轻,粪便隐血试验持续(+++),应首先考虑的诊断是
- A. Hp感染
 - B. 消化道出血
 - C. 癌变
 - D. 慢性穿孔
 - E. 幽门梗阻
70. 患者,男,60岁。冠心病病史6年,体力活动后突然胸骨后疼痛,有压迫感、胸闷,被

- 迫停止原来活动持续约 3~5 分钟疼痛自行缓解。其胸痛最可能的诊断是
- 胃食管反流
 - 心绞痛
 - 肋间神经痛
 - 急性心肌梗死
 - 胆绞痛
71. 患者,女,30岁。风湿热病史6年,现呼吸困难、咳嗽、咳痰、咯血,查体心尖部闻及舒张中晚期杂音,心电图显示左房增大,该患者的诊断是
- 主动脉瓣关闭不全
 - 联合瓣膜病变
 - 二尖瓣狭窄
 - 二尖瓣关闭不全
 - 主动脉瓣狭窄
72. 患者,男,65岁。临床诊断为急性心肌梗死,入院第2天出现三度房室传导阻滞,最恰当的治疗措施是
- 静注阿托品
 - 静注异丙肾上腺素
 - 口服阿托品
 - 安装临时心脏起搏器
 - 安装永久性心脏起搏器
73. 患者,男,60岁。由于情绪激动,突然剧烈头痛、头晕、呕吐,随之出现“三偏征”,诊断为脑出血,其最主要的病因是
- 高血压性动脉硬化
 - 血液病
 - 动脉瘤
 - 脑血管畸形
 - 脑动脉炎
74. 患者胃溃疡病史12年,因上腹痛、呕吐、消瘦就诊,经胃镜检查确诊为进展期胃癌,治疗最好的方法是
- 免疫疗法
 - 放射治疗
 - 手术治疗
 - 内镜下治疗
 - 化疗
75. 患者十二指肠溃疡病史7年,饮酒后突发上腹剧痛,查体呈板状腹,拟诊为急性穿孔,确诊最重要的检查是
- 粪便隐血试验
 - 腹腔穿刺
 - 腹部X线透视
 - 钡餐透视
 - 血常规
76. 下列选项中,以下垂性水肿为主要特点的是
- 心源性水肿
 - 肾源性水肿
 - 肝源性水
 - 营养不良性水肿
 - 内分泌源性水肿
77. 患者王某,因水肿、高血压、蛋白尿就诊,经查拟诊为慢性肾炎,需与慢性肾盂肾炎鉴别,需要做何检查
- 肾功能检测
 - 静脉肾盂造影
 - 尿细菌培养
 - 尿常规
 - 血常规
78. 患者,女,48岁。反复尿频、尿急、尿痛、夜尿增多、低热1年余,近2天来高热,上述症状加剧入院。每次发作抗生素治疗有效。既往有肺结核病史,血压165/95mmHg,尿蛋白(+),白细胞8个/HP,静脉肾盂造影示肾盂肾盏瘢痕狭窄扩张,尿菌培养阴性,诊断最可能的是
- 慢性肾小球肾炎
 - 慢性肾盂肾炎
 - 急性肾盂肾炎
 - 肾结石
 - 肾结核
79. 患者,男,25岁。慢性肾炎病史7年,近日来恶心、呕吐、气喘,血压175/100mmHg,颈静脉怒张,双肺底闻及湿啰音,血尿

- 素氮 30mmol/L, 血肌酐 752 μ mol/L, 血钾 7.2mmol/L, 最宜采用的治疗是
- 5% 碳酸氢钠静滴
 - 硝普钠静滴
 - 葡萄糖酸钙静推
 - 血液透析
 - 50% 葡萄糖静滴
80. 患者, 女, 29 岁。因月经量多 2 年, 出现贫血表现, 拟诊断为缺铁性贫血, 可作为缺铁依据的检查结果是
- 转铁蛋白饱和度 <15%
 - FE_P>4.5 μ g/g
 - 血清铁蛋白 <12 μ g/L
 - 总铁结合力 >64.4 μ mmol/L
 - 血清铁 <8.9 μ mmol/L
81. 患者, 男, 55 岁。患有慢性肾炎, 水肿明显, 血压 160/95mmHg, 控制血压应首选的药物是
- 利血平
 - 降压灵
 - 苯那普利
 - 硝苯地平
 - 呋塞米
82. 患者, 男, 12 岁。发热伴鼻出血 1 周。检查皮肤出血点, 胸骨中下段有压痛。Hb90g/L, WBC $10 \times 10^9/L$, PLT $50 \times 10^9/L$, 血涂片可见幼稚细胞。下列哪项检查对诊断最有意义
- 胸片检查
 - 尿液检查
 - 骨髓检查
 - 酸化血清溶血试验
 - 网织红细胞计数
83. 患者, 男, 50 岁。确诊为慢性髓细胞白血病慢性期。首选治疗是
- 骨髓移植
 - 泼尼松
 - 长春新碱
 - 羟基脲
 - 环磷酰胺
84. 患者, 男, 40 岁。牙龈出血、发热半月。检查: Hb50g/L, WBC $12 \times 10^9/L$, 原始粒细胞 0.30, PLT $7 \times 10^9/L$, 患者贫血的主要原因是
- 出血
 - 红细胞寿命缩短
 - 造血原料缺乏
 - 红细胞生成受到异常增生细胞的干扰
 - 无效性红细胞生成
85. 患者, 女, 50 岁。类风湿关节炎病史 6 年, 可生活自理, 不能参加工作, 活动受限, 其关节功能障碍的分级是
- IV 级
 - V 级
 - I 级
 - II 级
 - III 级
86. 1 型糖尿病患者, 近期由于肺部感染, 原有症状明显加重, 诊断并发酮症酸中毒, 其首要的治疗措施是
- 纠正电解质紊乱
 - 应用胰岛素
 - 补液
 - 纠正酸中毒
 - 控制感染
87. 患者, 女, 29 岁。因手部关节疼痛、肿胀就诊。发病前有病毒性呼吸道感染史, 慢性起病, 逐渐加重。下列检查结果中, 有助于鉴别类风湿关节炎与系统性红斑狼疮的是
- 轻度贫血
 - 血沉增快
 - 反应蛋白升高
 - 心脏超声示少量心包积液
 - 手部 X 线检查未见骨质改变
88. 患者, 女, 21 岁。四肢关节痛 6 个月, 近 2 个月出现面颊部对称性红斑, 口腔溃疡反复发作, 检查白细胞 $2.7 \times 10^9/L$, 血沉

67mm/h, 该患者最可能的诊断是

- A. 类风湿关节炎
- B. 系统性红斑狼疮
- C. 干燥综合征
- D. 白塞病
- E. 风湿性关节炎

89. 患者, 女, 56岁。身高 155cm, 体重 55kg, 体检发现空腹血糖 6.4mmol/L, 下列正确的是

- A. 可诊断糖尿病
- B. 应进行口服葡萄糖耐量试验
- C. 可排除糖尿病
- D. 应进行 100g 口服葡萄糖耐量试验
- E. 应做 24 小时尿糖定量

90. 患者, 女, 28岁。对抗甲状腺药物有过敏反应。治疗宜选择的是

- A. 放射性质碘治疗
- B. 甲状腺次全切除术
- C. 抗甲状腺药联合糖皮质激素
- D. 复方碘液
- E. 普萘洛尔

三、A3 型选择题 (91~100 题)

(答题说明: 以下提供若干个案例, 每个案例下设多道考题。请根据题干所提供的信息, 在每一道考题下面的 A、B、C、D、E 五个备选答案中选择一个最佳答案。)

(91~92 题共用题干)

患者张某, 77岁。患慢性支气管炎病 35年, 两周前因受凉出现胸闷、咳嗽、喘憋加重, 咳白色黏痰, 经治疗咳嗽减轻, 但出现烦躁, 昼睡夜

醒, 精神恍惚。动脉血气分析示 PaO_2 45mmHg, PaCO_2 70mmHg, 血象: 白细胞 $12 \times 10^9/\text{L}$, 中

91. 患者的诊断哪项根据不足

- A. 肺部感染
- B. 呼吸衰竭
- C. 肺性脑病
- D. 支气管哮喘
- E. 慢性支气管炎

92. 目前的治疗, 哪项措施欠妥

- A. 吸氧
- B. 氨茶碱
- C. 抗菌药物
- D. 呼吸机治疗
- E. 氨溴索

(93~94 题共用题干)

患者, 女, 38岁。心慌气短十余年, 加重伴不能平卧 2 小时。查体: 心率 142 次/分, 心音强弱不等, 心律绝对不齐, 心尖区闻及收缩期杂音和舒张期隆隆样杂音, 双肺底闻及细小湿啰音, 心界向左侧扩大, 肝大, 肋下 5cm, 肝-颈静脉反流征阳性, 双下肢水肿。

93. 此患者的诊断为

- A. 二尖瓣狭窄、房颤、右心衰竭
- B. 二尖瓣关闭不全、房颤、右心衰竭
- C. 二尖瓣狭窄、房颤、左心衰竭
- D. 三尖瓣狭窄、房颤、右心衰竭
- E. 三尖瓣关闭不全、房颤、右心衰竭

94. 治疗应首选

- A. 口服地高辛
- B. 静注西地兰
- C. 肌注呋塞米
- D. 皮下注射吗啡
- E. 静注普萘洛尔

(95~96 题共用题干)

患者, 男, 38岁。间歇性左下腹痛 5 个月, 解脓血便 2 个月, 反复抗菌药物治疗无效。查体: 腹平软, 左下腹轻压痛, 未扪及包块。

95. 根据以上资料, 最有可能的诊断是

- A. 克罗恩病
- B. 溃疡性结肠炎
- C. 肠结核
- D. 慢性细菌性痢疾
- E. 慢性阿米巴痢疾

96. 为明确诊断, 最有价值的诊断方法是

- A. 临床症状及体征
- B. 大便常规与培养
- C. X 线钡剂灌肠
- D. 结肠镜检查
- E. 结肠镜活检

- D. 结肠镜检查
E. 血清免疫球蛋白测定
(97~98 题共用题干)

患者张某,男,31岁。无明显诱因面部浮肿、头晕,已1年余,未就医,近两周出现恶心,食欲差。查体:血压175/100mmHg,心率90次/分,双肺呼吸音清,未闻及干湿啰音,心律齐,腹平软,无压痛及反跳痛,双肾区无叩痛。实验室检查:Hb90g/L, BUN29mmol/L, Cr753mmol/L。尿液:蛋白(++),红细胞(++),管型(+).

97. 最可能的诊断是

- A. 急性肾小球肾炎
B. 急性肾炎
C. 肾病综合征
D. 高血压肾病
E. 慢性肾炎急性发作

98. 患者饮食中蛋白质的摄入量哪项为宜

- A. 0.5g/kg
B. 0.7g/kg
C. 1.0g/kg
D. 1.2g/kg

(99~100 题共用题干)

患者,男,1年前出现低热、出汗,逐渐消瘦,左肋下有包块,常伴有左上腹坠痛,食后饱胀感,近1月发热,伴牙龈出血。Hb90g/L, WBC $25 \times 10^9/L$, PLT $70 \times 10^9/L$,血涂片原始粒细胞占0.50。

99. 此患者最有可能的诊断是

- A. 再生障碍性贫血
B. 慢性髓细胞白血病
C. 急性粒细胞白血病
D. 甲状腺功能亢进
E. 慢性乙型肝炎

100. 此患者最有可能用的药物是

- A. 伊马替尼
B. 环磷酰胺
C. 顺铂
D. 长春新碱

E. 阿糖胞苷

四、B1 型选择题 (101~150 题)

(答题说明:以下提供若干组考题,每组考题共用在考题前列出的A、B、C、D、E五个备选答案,请从中选择一个与问题最密切的答案,某一个备选答案可能被选择一次、多次或不被选择。)

(101~102 题共用备选答案)

- A. 保和丸
B. 健脾丸
C. 枳实消痞丸
D. 枳实导滞丸
E. 木香槟榔丸

101. 饮食不节,脘腹痞胀,噎腐吞酸,恶食呕吐,大便泄泻,舌苔厚腻,脉滑者,治宜选用

102. 食积内停,脘腹胀痛,下痢泄泻,小便短赤,舌苔黄腻,脉沉而有力者,治宜选用

(103~104 题共用备选答案)

- A. 芍药、大腹子
B. 白术、炮附子
C. 生姜、草豆蔻
D. 肉桂、炮干姜
E. 桂枝、茯苓皮

103. 真武汤的组成药物中含有

104. 实脾散的组成药物中含有

(105~106 题共用备选答案)

- A. 宣畅气机,清利湿热
B. 清热化湿,理气和中
C. 清热泻火,利水通淋
D. 利湿化浊,清热解毒
E. 利水渗湿,温阳化气

105. 八正散的功用

106. 三仁汤的功用

(107~108 题共用备选答案)

- A. 玉液汤
B. 炙甘草汤
C. 麦门冬汤
D. 养阴清肺汤
E. 清燥救肺汤

107. 治疗肺胃阴虚之肺痿,宜用
108. 治疗气阴两亏之肺痿,宜用
(109~110 题共用备选答案)
- A. 龙骨、牡蛎、鳖甲
B. 龙骨、龟板、鳖甲
C. 牡蛎、鳖甲、石决明
D. 龙骨、牡蛎、龟板
E. 鳖甲、牡蛎、龟板
109. 大定风珠的组成中含有的药物是
110. 镇肝息风汤组成中含有的药物是
(111~112 题共用备选答案)
- A. 丹参饮
B. 温经汤
C. 生化汤
D. 失笑散
E. 桂枝茯苓丸
111. 具有活血祛瘀,散结止痛功用的方剂是
112. 具有养血祛瘀,温经止痛功用的方剂是
(113~114 题共用备选答案)
- A. 十灰散
B. 止嗽散
C. 咳血方
D. 四生丸
E. 小蓟饮子
113. 治疗肝火犯肺所致之咳痰带血,宜选用
114. 治疗下焦瘀热所致之血淋尿血,宜选用
(115~116 题共用备选答案)
- A. 大黄、芒硝、赤芍
B. 桃仁、丹皮、芒硝
C. 大黄、桃仁、甘草
D. 赤芍、丹皮、甘草
E. 大黄、赤芍、丹皮
115. 大黄牡丹汤的组成中含有药物是
116. 桃核承气汤的组成中含有药物是
(117~118 题共用备选答案)
- A. 铁锈色痰
B. 粉红色乳样或脓性痰
C. 大量脓臭痰
D. 粉红色泡沫痰
E. 红棕色胶冻样痰
117. 肺炎链球菌肺炎的特征性痰液是
118. 急性肺脓肿的典型痰液是
(119~120 题共用备选答案)
- A. 下垂性压陷性水肿
B. 脾肿大
C. 劳力性呼吸困难
D. 咳嗽、咳痰
E. 咯血
119. 左心衰竭时最早出现的症状是
120. 右心衰竭时典型的体征是
(121~122 题共用备选答案)
- A. 淋巴转移
B. 种植转移
C. 直接蔓延
D. 血行转移
E. 上行转移
121. 胃癌最早、最常见的转移方式是
122. 原发性肝癌最常见的转移方式是
(123~124 题共用备选答案)
- A. 颗粒管型
B. 透明管型
C. 少量白细胞
D. 畸形红细胞
E. 白细胞管型
123. 尿沉渣检查,肾盂肾炎多见
124. 尿沉渣检查,慢性肾衰竭多见
(125~126 题共用备选答案)
- A. 结核病
B. 急性喉炎
C. 疟疾
D. 败血症
E. 伤寒
125. 稽留热可见于
126. 弛张热可见于
(127~128 题共用备选答案)
- A. 白血病
B. 传染性单核细胞增多症
C. 急性胆囊炎

- D. 钩端螺旋体病
E. 流行性感胃
127. 发热伴寒战常见于
128. 发热伴结膜充血常见于
(129~130 题共用备选答案)
- A. 高血压脑病
B. 有机磷中毒
C. 吗啡中毒
D. 脑外伤
E. 尿毒症
129. 意识障碍伴发热见于
130. 意识障碍伴高血压见于
(131~132 题共用备选答案)
- A. 水肿
B. 甲状腺肿
C. 反甲
D. 爪形手
E. 梭状关节
131. 类风湿性关节炎时出现
132. 贫血时出现
(133~134 题共用备选答案)
- A. 全身性水肿
B. 双下肢非凹陷性水肿
C. 单侧肢体水肿
D. 下肢静脉曲张
E. 足内翻、足外翻
133. 脊髓灰质炎后遗症可见
134. 下肢浅静脉血液回流受阻可见
(135~136 题共用备选答案)
- A. 脓血便
B. 鲜血便
C. 柏油样便
D. 灰白色便
E. 稀糊状便
135. 阻塞性黄疸为
136. 上消化道出血为
(137~138 题共用备选答案)
- A. 高糖血症
B. 尿糖阳性
C. 血糖减低
D. 低糖血症
E. 空腹血糖过高
137. FBG $>$ 9.0mmol/L 时为
138. FBG $<$ 3.9mmol/L 时为
(139~140 题共用备选答案)
- A. 黄色痰
B. 红色痰
C. 黄绿色痰
D. 铁锈色痰
E. 棕褐色痰
139. 呼吸道化脓性感染多见
140. 肺炎链球菌肺炎多见
(141~142 题共用备选答案)
- A. 实变区密度较低呈毛玻璃样
B. 左上缘影呈直线状斜向外下方
C. 右上肺与肺门部形成“S”状影
D. 肺内有多发的薄壁空腔
E. 肺内有多发的肿块影
141. 弥漫性肺癌的征象为
142. 右上中心型肺癌的 X 线表现为
(143~144 题共用备选答案)
- A. 骨骼
B. 软组织与液体
C. 脂肪
D. 气体
E. 胸膜
143. 密度最低, X 线片上呈黑色的是
144. 密度最高, X 线片上呈白色的是
(145~146 题共用备选答案)
- A. 神灵主义医学模式
B. 自然哲学医学模式
C. 机械论医学模式
D. 生物医学模式
E. 生物 - 心理 - 社会医学模式
145. 把人比作机器, 疾病是机器某部分零件失灵, 用机械观解释一切人体现象的医学模式是

146. 认为心理、社会因素与疾病的发生、发展、转化有着密切的联系的医学模式是

(147~148 题共用备选答案)

- A. 对服务对象实施有利的医学行为
- B. 善待生命, 同情、关心、体贴患者
- C. 在医护实践中尊重能够自主的病人的自主性
- D. 在医学服务中公平、正直地对待每一位病人的伦理原则
- E. 在诊治、护理过程中努力避免病人不应有的医疗伤害

147. 尊重原则的含义是

148. 无伤原则的含义是

(149~150 题共用备选答案)

- A. 要有急病人所急的紧迫感
 - B. 要有敢担风险团结协作的使命感
 - C. 要有深厚的同情感
 - D. 抢救前了解诊疗经过
 - E. 要有经济头脑, 保证少花钱多办事
149. 在抢救危重病人时, 保证抢救成功的前提条件是
150. 不属于抢救危重病人时优先考虑的是

第三单元

一、A1 型选择题 (1~60 题)

(答题说明:每一道考题下面有 A、B、C、D、E 五个备选答案,请从中选择一个最佳答案。)

1. 下列哪项不是时行感冒的特征

- A. 传染性大
- B. 病情较重
- C. 发病急
- D. 易于流行
- E. 不传变

2. 治疗咳嗽凉燥证的最佳方剂是

- A. 杏苏散
- B. 桑杏汤
- C. 香苏散
- D. 清金化痰汤
- E. 桑菊饮

3. 哮病的主症是

- A. 咳嗽胸痛痰黏
- B. 呼吸急促困难
- C. 咳吐浊唾涎沫
- D. 发作性痰鸣喘咳
- E. 咳嗽潮热盗汗

4. 清热化痰,宣肺平喘用于喘证的哪一个证型

- A. 风寒袭肺
- B. 表寒里热
- C. 痰热郁肺
- D. 痰浊阻肺
- E. 肺气郁闭

5. 《千金》苇茎汤用于治疗下列哪个病最为适合

- A. 肺痈
- B. 肺痿
- C. 肺胀
- D. 咳嗽

E. 肺癆

6. 肺癆虚火灼肺,咳血较著者,在辨证方中宜加入

- A. 当归、三七
- B. 泽兰、红花
- C. 黑山栀、紫珠草
- D. 冬虫夏草、蛤蚧
- E. 木蝴蝶、诃子

7. 下列各项,不属肺胀实证治疗原则的是

- A. 祛邪宣肺
- B. 降气化痰
- C. 温阳利水
- D. 益肾健脾
- E. 开窍息风

8. 不属于肺痿虚热证的症状是

- A. 气急喘促
- B. 午后潮热
- C. 皮毛干燥
- D. 舌质淡
- E. 舌红而干

9. 下列何项不是惊悸与怔忡的鉴别要点

- A. 致病多由外因或内因引起
- B. 诱因常与惊恐、恼怒或劳累有关
- C. 全身情况较好或较差
- D. 病性属实或属虚
- E. 病位在肝或在心

10. 胸痹心痛发作时,疼痛可以放射到

- A. 右胸
- B. 肩背
- C. 左肋下
- D. 右肋下
- E. 背正中

11. 治疗不寐痰热扰心证,首选的方剂是

- A. 羚角钩藤汤
- B. 黄连温胆汤
- C. 涤痰汤

- D. 礞石滚痰丸
E. 半夏白术天麻汤
12. 外感头痛的致病因素以为主
A. 风邪
B. 寒邪
C. 湿邪
D. 热邪
E. 燥邪
13. 眩晕的特点是
A. 坐立不安
B. 头重如蒙
C. 头痛头胀
D. 头晕眼花
E. 恶心呕吐
14. 下列哪项不是中风中经络的主症
A. 卒然昏仆
B. 半身不遂
C. 口眼歪斜
D. 语言不利
E. 手足拘挛
15. 狂证痰火扰神证治疗方剂宜选
A. 滚痰丸
B. 生铁落饮
C. 清气化痰丸
D. 顺气导痰汤
E. 温胆汤
16. 痫病痰阻脑络证的治法为
A. 理气化痰，活血化痰
B. 行气解郁，化痰通络
C. 活血化痰，息风通络
D. 活血化痰，开窍醒神
E. 理气化痰，醒脑通窍
17. 脾肾两虚型痴呆的治法是
A. 补肾益髓，填精养神
B. 健脾化浊，豁痰开窍
C. 活血化痰，开窍醒脑
D. 益气养血，清心宣窍
E. 补肾健脾，益气生精
18. 胃痛的治疗，主要是
A. 调肝理气止痛
B. 调肝和胃止痛
C. 理气和胃止痛
D. 调理脾胃止痛
E. 调肝理脾止痛
19. 脾胃虚弱，胃痞反复发作者，治法宜首选
A. 疏肝解郁，和胃消痞
B. 清热化湿，和胃消痞
C. 理气宽胸，补泻并用
D. 补气健脾，升清降浊
E. 和胃降气，消痞开结
20. 哪项不是肝气犯胃型呕吐的主症
A. 呕吐吞酸
B. 暖气频作
C. 胸胁胀满
D. 舌红苔薄
E. 脉沉细
21. 噎膈的后期治疗原则以何法为主
A. 补气温阳
B. 理气
C. 化痰
D. 降火
E. 以上皆不是
22. 下列除哪项外，均是胃火上逆型呃逆的主症
A. 呃逆连声，胸胁胀闷
B. 呃声洪亮，冲逆而出
C. 口臭烦渴，多喜冷饮
D. 小便短赤，大便秘结
E. 舌苔黄燥，脉滑数
23. 腹痛拒按，大便溏滞不爽，小便短赤，舌红苔黄腻，应辨为
A. 寒邪内阻
B. 湿热壅滞
C. 中虚脏寒
D. 气滞血瘀
E. 饮食积滞
24. 治疗久泻，不宜过用

- A. 分利
B. 健脾
C. 补肾
D. 升提
E. 固涩
25. 痢下白多赤少，一般多重用
A. 温药
B. 寒药
C. 气药
D. 血药
E. 补药
26. 热秘的特征为
A. 大便干结，小便短赤
B. 大便秘结，欲便不得
C. 虽有便意，努挣乏力
D. 大便艰涩，排出困难
E. 大便不干，小便清长
27. 下列哪一项不是肝郁气滞胁痛的特点
A. 胁肋胀痛
B. 走窜不定
C. 胸膈痞塞
D. 疼痛每因情志变化而增减
E. 黄疸脾虚湿滞证的治法是
28. 黄疸脾虚湿滞证的治法是
A. 温中化湿，健脾和胃
B. 调和肝脾，理气助运
C. 利湿化浊运脾，佐以清热
D. 疏肝泄热，利胆退黄
E. 健脾养血，利湿退黄
29. 下列哪项不是积证的特征
A. 结块有形
B. 结块固定不移
C. 痛有定处
D. 病在气分
E. 病位在脏
30. 中满分消丸主要用于
A. 鼓胀之气滞湿阻证
B. 鼓胀之水热蕴结证
C. 鼓胀之水湿困脾证
D. 鼓胀之阳虚水盛证
E. 鼓胀之阴虚水停证
31. 经络系统中，具有约束骨骼、屈伸关节、维持人体正常运动功能的是
A. 阴阳跷脉
B. 阴阳维脉
C. 十二经别
D. 十二经筋
E. 奇经八脉
32. 下列哪组经脉没有按照气血循行流注顺序排列
A. 胆经、肝经、肺经
B. 心经、小肠经、肾经
C. 大肠经、胃经、脾经
D. 肾经、心包经、三焦经
E. 三焦经、胆经、肝经
33. 手足三阴经在四肢肘膝关节以上的分布规律是
A. 太阴在前，厥阴在中，少阴在后
B. 太阴在前，少阴在中，厥阴在后
C. 厥阴在前，厥阴在中，太阴在后
D. 厥阴在前，少阴在中，太阴在后
E. 不属于经络作用的是
34. 不属于经络作用的是
A. 联系脏腑
B. 沟通内外
C. 营养全身
D. 抗御病邪
E. 蓄积渗灌气血
35. 手少阳三焦经的主治特点是
A. 前头、鼻、口、齿病
B. 前头、口齿、胃肠病
C. 侧头、胁肋病
D. 后头、肩胛病、神志病
E. 后头、背腰痛
36. 以下哪穴不是募穴
A. 中极
B. 关元
C. 神阙

- D. 中腕
E. 臑中
37. 合穴多位于
A. 指、趾末端
B. 肘膝关节附近
C. 掌指、跖趾关节附近
D. 掌指、跖趾关节之前
E. 掌指、跖趾关节之后
38. 肩胛骨内缘(近脊柱侧点)至后正中线的骨度分寸是
A. 1.5寸
B. 3寸
C. 4寸
D. 6寸
E. 8寸
39. 手太阴肺经的起止穴是
A. 少商、中府
B. 中府、少商
C. 商阳、中府
D. 中府、商阳
E. 商阳、迎香
40. 经脉循行中,不与目内眦或目外眦发生联系的是
A. 手少阳三焦经
B. 手太阳小肠经
C. 手阳明大肠经
D. 足太阳膀胱经
E. 足少阳胆经
41. 在胸部,距前正中线4寸循行的经脉是
A. 足太阴脾经
B. 手厥阴心包经
C. 足少阴肾经
D. 足阳明胃经
E. 手太阴肺经
42. 以下哪项不是三阴交穴的主治病证
A. 脾胃虚弱证
B. 妇产科病证
C. 生殖泌尿系统病证
D. 心悸、失眠
E. 阳虚诸证
43. 与腰阳关穴在同一水平线上的腧穴是
A. 胃俞
B. 肾俞
C. 膀胱俞
D. 大肠俞
E. 肝俞
44. 以下哪项不是得气的感觉或反应
A. 针刺部位有酸胀、麻重感
B. 针刺部位出现热、凉、痒、痛、抽搐、蚁行等感觉
C. 患者出现循经性肌肤震颤
D. 医者刺手体会到针下空松、虚滑
E. 医者刺手体会到针体颤动
45. 仰靠坐位适宜取哪些部位的腧穴
A. 头、面、胸背部腧穴和上、下肢部分腧穴
B. 身体侧面腧穴和上、下肢部分腧穴
C. 头、项、脊背、腰骶部的腧穴
D. 前头、颜面和颈前等部位的腧穴
E. 后头和项、背部的腧穴
46. 有关提插法叙述不正确的是
A. 将针刺入腧穴一定深度后,施以上提下插的操作
B. 幅度不宜过大,一般以3~5分为宜
C. 指力一定要均匀一致
D. 频率应较快,每分钟100次左右
E. 保持针身垂直
47. 有关灸法的注意事项,叙述不正确的是
A. 先灸上部,后灸下部
B. 先灸阴部,后灸阳部
C. 壮数应先少后多
D. 艾炷应先小后大
E. 施灸也应注意补泻的操作方法
48. 留罐法的留置时间一般为
A. 3~5分钟
B. 5~10分钟
C. 5~15分钟
D. 15~20分钟

- E. 20~30 分钟
49. 下列哪项不是三棱针的常用操作方法
- 点刺法
 - 散刺法
 - 透刺法
 - 刺络法
 - 挑刺法
50. 位于耳垂正面中央部,即耳垂 5 区的耳穴是
- 舌
 - 颌
 - 牙
 - 眼
 - 内耳
51. 下列哪项不属于同名经配穴
- 耳鸣取中渚、足临泣
 - 头痛取外关、阳陵泉
 - 失眠取神门、三阴交
 - 牙痛取合谷、内庭
 - 便秘取天枢、合谷
52. 治疗内证的腧穴是
- 内关、水沟、太冲、神门、百会、印堂
 - 四神聪透百会、神庭透上星
 - 照海、申脉、神门、印堂、百会
 - 内关、郄门、神门、巨阙、印堂
53. 属于艾炷灸的是
- 温针灸
 - 隔盐灸
 - 回旋灸
 - 温和灸
 - 蒜泥灸
54. 以下腧穴中,治疗痫证有较好作用的是
- 长强
 - 腰阳关
 - 命门
 - 秩边
 - 志室
55. 针灸治疗癱闭,叙述不正确的是
- 可以取足太阳经穴
 - 虚证癱闭,可用温针灸
 - 实证癱闭,毫针用泻法
 - 秩边穴针感要向会阴部放射
 - 下腹部腧穴,应直刺
56. 崩漏的发生主要与哪些经脉有关
- 肝经、肾经
 - 肝经、脾经
 - 任脉、带脉
 - 任脉、冲脉
 - 任脉、督脉
57. 后溪穴是手太阳小肠经的
- 荥穴
 - 输穴
 - 经穴
 - 络穴
 - 郄穴
58. 治疗产后乳少,或见乳房胀满疼痛,或见乳房柔软无胀感,针灸治疗应选用
- 乳根、太冲、期门
 - 膻中、太冲、期门
 - 乳根、脾俞、足三里
 - 中脘、天枢、期门
59. 期门的定位是
- 乳头直下,第 5 肋间隙,前正中线旁开 4 寸
 - 乳头直下,第 6 肋间隙,前正中线旁开 4 寸
 - 乳头直下,第 7 肋间隙,前正中线旁开 4 寸
 - 第 11 肋游离端下际
 - 侧腰部,第 12 肋游离端下际处
60. 落枕病在督脉、太阳经者,针灸治疗配
- 风池、肩井
 - 大椎、束骨
 - 风池、合谷
 - 内关、合谷
 - 肩髃、天宗

二、A2 型选择题 (61~102 题)

(答题说明:每一道考题是以一个小案例出现的,其下面都有 A、B、C、D、E 五个备选答案,请从中选择一个最佳答案。)

61. 患者男性,久居岭南。两个月每日发热,头痛,面红目赤,烦渴欲冷饮,神昏,大便秘结,小便热赤,舌质红绛,舌苔黄厚腻,脉弦数。治法宜
- 解毒除瘴,芳化湿浊
 - 祛邪截疟,和解表里
 - 清热解表,和解祛邪
 - 和解表里,温阳达邪
 - 解毒除瘴,清热保津
62. 患者因皮肤疮痍破溃而引发水肿,肿势自颜面渐及全身,小便不利,恶风发热,咽红,舌红苔薄黄,脉滑数。治疗应首选
- 越婢加术汤合桑白皮汤
 - 麻黄连翘赤小豆汤合五味消毒饮
 - 麻黄连翘赤小豆汤合五皮散
 - 麻黄连翘赤小豆汤合猪苓汤
 - 实脾饮合五味消毒饮
63. 患者,男,40岁。急性发病,发病半日,尿道窘迫疼痛,少腹拘急,腰部绞痛,大便秘结,曾发作二次排尿突然中断。舌质红,苔黄腻,脉弦紧数。应选用的主方为
- 石韦散
 - 八正散
 - 沉香散
 - 四妙丸
 - 大柴胡汤
64. 患者,男,65岁。排尿不畅3年,加重1个月,小便点滴而出,小腹胀痛,腰膝酸痛,神疲乏力,畏寒肢冷,舌质淡,苔白,脉沉细无力,应诊为
- 淋证
 - 关格
 - 少尿
 - 腰痛
 - 癃闭
65. 患者精神恍惚,心神不宁,悲忧善哭,时时欠伸,舌淡苔薄白,脉弦细。其治法是
- 益气养血
 - 补肾宁心
 - 养心安神
 - 解郁化痰
 - 疏肝解郁
66. 患者吐血色红,夹有食物残渣,脘腹胀闷,口臭,便秘,大便色黑,舌红,苔黄,脉滑数,治疗宜选用
- 泻心汤合清胃散
 - 泻心汤合十灰散
 - 玉女煎合左金丸
 - 龙胆泻肝汤合清胃散
 - 清胃散合茜根散
67. 患者烦渴多饮半月余,口干舌燥,尿频量多,舌边尖红,苔黄,脉洪数有力。治则宜用
- 清热润肺,生津止渴
 - 养阴润肺,生津止渴
 - 清胃泻火,养阴保津
 - 滋阴固肾,生津止渴
 - 滋养胃阴,生津止渴
68. 患者夜寐盗汗,五心烦热,两颧色红,口渴,舌红少苔,脉细数。治疗应首选
- 黄连阿胶汤
 - 黄连温胆汤
 - 当归六黄汤
 - 养阴清肺汤
 - 甘麦大枣汤
69. 患者午后或夜间发热,不欲近衣,手足心热,烦躁,少寐多梦,盗汗,口干咽燥,舌质红,苔少,脉细数。辨证应属
- 阴虚发热证
 - 气虚发热证
 - 血虚发热证
 - 血瘀发热证
 - 气郁发热证
70. 患者刘某,男,69岁。平素体弱多病,现

- 症见腰酸背痛，小便失禁，畏寒肢冷，下利清谷，舌质淡胖，苔白，脉沉迟。最佳方剂为
- 附子理中丸
 - 左归饮
 - 左归丸
 - 右归丸
 - 归脾汤
71. 患者由情志异常、精神刺激而发作，突然昏倒，不知人事，或四肢厥冷，呼吸气粗，口噤握拳，舌苔薄白，脉伏或沉弦。证属
- 血厥实证
 - 痰厥
 - 气厥虚证
 - 血厥虚证
 - 气厥实证
72. 患者肢体关节酸楚，重着，疼痛，关节活动不利，麻木不仁，舌苔白腻，脉濡缓。治疗应首选
- 独活寄生汤
 - 蠲痹汤
 - 薏苡仁汤
 - 乌头汤
 - 白虎加桂枝汤
73. 患者，男，64岁。身热已退而见肢体软弱无力，肌肉瘦削，口干咽干较甚，小便黄赤，大便干燥。舌质红，苔黄，脉细数。宜选用
- 清燥救肺汤
 - 玉女煎
 - 胃苓汤
 - 益胃汤
 - 桑杏汤
74. 腰痛患者，腰部冷痛重着，转侧不利，静卧痛不减，遇阴雨天疼痛加重，舌苔白腻，脉沉缓。其证候是
- 寒湿腰痛
 - 风寒腰痛
 - 瘀血腰痛
 - 湿热腰痛
 - 肾虚腰痛
75. 患者咳嗽频剧，咯痰不爽，痰黏稠而黄，咳声嘶哑，喉燥咽痛，身热恶风，头痛肢楚，鼻流黄涕，口渴，小便黄，苔薄黄，脉浮数。
- 治法宜
- 疏风清肺，润肺止咳
 - 疏风散寒，宣肺止咳
 - 疏风清热，宣肺止咳
 - 滋阴润肺，化痰止咳
 - 清热肃肺，豁痰止咳
76. 患者症见呼吸急促，喉中哮鸣有声，胸膈满闷如塞，面色晦青，形寒肢冷，苔白滑，脉弦紧者。选用下列何方
- 定喘汤
 - 温胆汤
 - 控涎丹
 - 射干麻黄汤
 - 葶苈大枣泻肺汤
77. 患者肺癆迁延9年余，咳嗽痰白质稀，声低气怯，午后潮红，面颧红赤，神疲，纳少，大便溏薄，自汗，盗汗，偶有痰中带血，面色少华，舌光，边有齿印，脉细弱。
- 方选
- 百合固金汤加减
 - 补天大造丸加减
 - 月华丸加减
 - 参苓白术散加减
 - 秦艽鳖甲散加减
78. 患者肺胀病史20年，呼吸浅促难续，声低气怯，倚息不能平卧，胸闷如窒，心慌，咳痰不爽，脉沉数无力。治疗应首选
- 金匱肾气丸
 - 平喘固本汤
 - 真武汤
 - 大补元煎
 - 七味都气丸
79. 王某，男性，75岁。反复咳喘30年多。现症：咳吐涎沫，其质清稀量多，不渴，短气不足以息，头眩，神疲乏力，食少，形寒，小便数，舌质淡，脉虚弱。其治疗应首选

- A. 麻黄升麻汤
B. 生姜甘草汤
C. 清燥救肺汤
D. 七味都气丸
E. 麦门冬汤
80. 患者眩晕, 头重昏蒙, 或伴视物旋转, 胸闷恶心, 呕吐痰涎, 食少多寐, 舌苔白腻, 脉濡滑。治宜选用
- A. 天麻钩藤饮
B. 黄连温胆汤
C. 藿香正气散
D. 半夏厚朴汤
E. 半夏白术天麻汤
81. 刘某, 女, 34岁。有痫证病史16年。近1年来, 痫证发作日益频繁, 自觉发作后神疲乏力, 平素头晕目眩, 心悸, 失眠多梦, 纳呆, 大便溏薄, 舌苔腻, 脉细弱无力。治法当为
- A. 补益气血, 健脾宁心
B. 补益心肾, 健脾化痰
C. 健脾祛脾, 健脑宁神
D. 平肝息风, 健脾补肾
E. 健脾化痰, 健脑宁神
82. 患者胸膈疼痛, 食不得下而不复吐出, 甚至水饮难下, 大便坚如羊粪, 或吐出物如赤豆汁, 形体消瘦, 肌肤枯燥, 舌红少津, 或舌质紫暗, 脉细涩, 其治法为
- A. 开郁化痰, 润燥降气
B. 滋养津液, 泻热散结
C. 破结行瘀, 滋阴养血
D. 温补脾肾, 益气回阳
E. 以上都不是
83. 患者, 男, 42岁。哮喘反复发作5年, 本次发作喘促不能平卧, 咳痰清稀, 无汗, 头痛, 脉浮紧。治疗应首选
- A. 中府、列缺、肺俞、尺泽
B. 肺俞、风门、丰隆、太渊
C. 膻中、太渊、太溪、肾俞
D. 天突、定喘、尺泽、膻中
E. 膏肓、肾俞、太溪、丰隆
84. 患者, 女, 30岁。腹泻3天。便稀有黏液, 肛门灼热, 舌红, 苔黄腻, 治疗应选取哪组经脉为主
- A. 手阳明、足太阴经
B. 足阳明、足太阴经
C. 手阳明、足阳明经
D. 手太阳、足阳明经
E. 任脉、足阳明经
85. 患者, 男, 63岁。头晕目眩, 甚则昏眩欲仆, 伴耳鸣, 腰膝酸软, 遗精, 舌淡, 脉沉细。除风池、百会外, 应加用
- A. 内关、太冲、行间、侠溪、太溪
B. 内关、太冲、头维、丰隆、中脘
C. 肝俞、肾俞、足三里、脾俞、胃俞
D. 肝俞、肾俞、足三里、太溪、悬钟、三阴交
E. 头维、血海、膈俞、内关、足三里、太溪
86. 患者, 男, 37岁。最近工作压力较大, 出现心慌心跳, 头晕目眩, 少寐, 腰酸, 盗汗, 舌红, 脉细数。治疗除主穴外, 宜加取
- A. 肾俞、中渚
B. 肾俞、大陵
C. 膻中、气海
D. 膻中、大陵
E. 膻中、大陵
87. 患者, 男, 22岁。发热恶寒, 寒重热轻, 头痛身痛, 鼻塞流涕, 咳嗽, 咯痰清稀, 舌苔薄白, 脉浮紧。治疗应首选
- A. 手太阴、手阳明、督脉经穴
B. 手少阴、手太阳、手太阴经穴
C. 手太阴、足太阳、手少阳经穴
D. 手太阴、手少阳、足少阳经穴
E. 手阳明、足阳明、手太阴经穴
88. 患者, 女, 26岁。月经周期提前10天左右, 月经量多, 色淡质稀, 神疲肢倦, 纳少便溏, 舌淡, 脉细, 针灸治疗在关元、三阴交基础上, 应加取
- A. 足三里、脾俞

- B. 血海、太冲
C. 肝俞、肾俞
D. 归来、子宫
E. 归来、命门
89. 患者，女，20岁。食海鲜后皮肤出现大小不等，形状不一的风团，高起皮肤，边界清楚，色红，瘙痒，伴恶心，肠鸣泄泻，舌红，苔黄腻，脉滑数。除曲池、合谷、血海、膈俞、三阴交外，应加取
- A. 外关、风池
B. 足三里、天枢
C. 三阴交、天枢
D. 足三里、大横
E. 三阴交、风池
90. 患者，男，75岁。咽喉微感疼痛，色暗红，入夜尤甚。针灸治疗主穴选取
- A. 尺泽、合谷、少商、照海
B. 关冲、合谷、少商、列缺
C. 关冲、厉兑、鱼际、内庭
D. 太溪、照海、鱼际、列缺
E. 太溪、曲池、鱼际、合谷
91. 患者，女，53岁。右上齿痛半年，隐隐作痛，时作时止，脉沉。针灸治疗在合谷、颊车、下关的基础上，应加取
- A. 外关、风池
B. 内庭、二间
C. 太溪、行间
D. 风池、侠溪
E. 风池、太冲
92. 患者，男，35岁。目赤肿痛，羞明，流泪，眵多。伴头痛发热，苔微黄，脉浮数。治疗除取主穴外，还应选用的是
- A. 少商、外关
B. 行间、侠溪
C. 太渊、风池
D. 太溪、鱼腰
E. 外关、四白
93. 患者，男，43岁。两耳轰鸣，按之不减，听力减退，兼见烦躁易怒，咽干，便秘，脉弦。治疗应首选
- A. 手、足太阴经穴
B. 手、足少阴经穴
C. 手、足少阳经穴
D. 手阳明经穴
E. 足太阳经穴
94. 患者，男，24岁。长期在电脑前工作，近来出现颈项强痛，活动受限，昨日因感受风寒后，症状加重，疼痛更加明显。治疗除取主穴外，还应选用的穴位是
- A. 膈俞、合谷
B. 合谷、列缺
C. 合谷、手三里
D. 百会、四神聪
E. 肝俞、肾俞
95. 患者，女，45岁。2天前感觉胸部皮肤灼热疼痛，皮色发红，继则出现簇集性粟粒状大小丘状疱疹，呈带状排列，兼见口苦，心烦，易怒，脉弦数。治疗除取主穴外，还应选用的穴位是
- A. 行间、侠溪
B. 阴陵泉、内庭
C. 大椎、曲池、合谷
D. 血海、三阴交
E. 内庭、曲池、太白
96. 患者，女，50岁。月经紊乱，潮热出汗，心悸，情绪不稳定，兼头晕耳鸣，失眠多梦，心烦易怒，烘热汗出，五心烦热，腰膝酸软，口干，小便黄，舌红，苔少，脉数者，治疗除取主穴外，还应选用的穴位是
- A. 行间、侠溪
B. 太溪、太冲
C. 膻中、期门
D. 照海、阴谷
E. 三阴交、太溪
97. 患儿，女，8岁。遗尿3个月余，每隔3~5夜1次，面色萎黄，纳食不多，舌淡苔薄，脉细弱。治疗应首选
- A. 中极、关元、三阴交、膀胱俞

- B. 中极、天枢、足三里、阴陵泉、太冲
 C. 关元、太溪、三阴交、至阴
 D. 气海、太冲、行间、昆仑、曲池
 E. 曲骨、内庭、太溪、肾俞、气海
98. 患儿，男，10岁。上课时小动作多，注意力涣散，自我控制能力差，情绪不稳定。针灸治疗应选取的经脉是
- A. 督脉、手少阴、手厥阴经
 B. 任脉、手少阴、足少阴经
 C. 任脉、手少阴、手厥阴经
 D. 督脉、足少阴、足厥阴经
 E. 手少阴、足少阴经
99. 患者，男，45岁。关节肌肉疼痛，屈伸不利，疼痛较剧，痛有定处，遇寒痛增，得热痛减，局部皮色不红，触之不热，舌苔薄白，脉弦紧。治疗除选用阿是穴、局部经穴外，还应选用的穴位是
- A. 肾俞、关元
 B. 阴陵泉、足三里
 C. 大椎、曲池
 D. 膈俞、关元
 E. 膈俞、血海
100. 患者，男，65岁。早晨外出散步时，突然昏仆不省人事，伴口噤不开，两手握固，牙关紧闭，肢体强痉。治疗应首选
- A. 督脉、足太阳经穴
 B. 督脉、手厥阴经穴
 C. 督脉、任脉经穴
 D. 任脉、手厥阴经穴
 E. 任脉、足太阳经穴
101. 患者，女，45岁。失眠2个月，近日来入睡困难，有时睡后易醒，醒后不能再睡，甚至彻夜不眠，舌红，苔少，脉细数。治疗应在主穴的基础上，首选的配穴为
- A. 太溪、肾俞
 B. 心俞、胆俞
 C. 神门、三阴交
 D. 心俞、脾俞
 E. 足三里、内关

102. 患者，男，45岁。大便秘结不通，排便艰难，伴腹胀痛，身热，口干口臭，喜冷饮，舌红，苔黄，脉滑数。治疗除取主穴外，还应选用的穴位是
- A. 中脘、太冲
 B. 神阙、关元
 C. 足三里、脾俞
 D. 合谷、曲池
 E. 气海、脾俞

三、A3型选择题(103~120题)

(答题说明：以下提供若干个案例，每个案例下设多道考题。请根据题干所提供的信息，在每一道考题下面的A、B、C、D、E五个备选答案中选择一个最佳答案。)

(103~105题共用题干)

患者，男，37岁。阳痿不举，心悸，失眠多梦，神疲乏力，面色萎黄，食少纳呆，腹胀便溏，舌淡，苔薄白，脉细弱。

103. 该病诊断为阳痿什么证型

- A. 心脾亏虚
 B. 肝郁不舒
 C. 命门火衰
 D. 肺肾亏虚
 E. 脾肾亏虚

104. 治法是

- A. 温肾壮阳
 B. 补脾益肾
 C. 益肾宁神
 D. 疏肝解郁
 E. 补益心脾

105. 代表方剂是

- A. 赞育丸
 B. 归脾汤
 C. 启阳娱心丹
 D. 济生肾气丸
 E. 无比山药丸

(106~108题共用题干)

患者，女，52岁。情绪不宁，急躁易怒，咽中梗塞，胸胁胀满，口苦而干，或头痛，目赤，耳鸣，或嘈杂吞酸，大便秘结，舌质红，苔黄，

脉弦数。

106. 该病诊断为

- A. 噎膈
- B. 郁证
- C. 癭病
- D. 癥瘕
- E. 聚证

107. 证型为

- A. 肝气郁结
- B. 肝阳上亢
- C. 痰气郁结
- D. 气郁化火
- E. 肝郁不舒

108. 选方为

- A. 柴胡疏肝散
- B. 龙胆泻肝汤
- C. 丹栀逍遥散
- D. 半夏厚朴汤
- E. 泻白散

(109~111 题共用题干)

患者，男，43岁。头后颞疼痛，牵连至项，常有拘急收紧感，或伴恶风畏寒，遇风加剧，口不渴，苔薄白，脉浮紧。

109. 该病治则为

- A. 活血祛风通络
- B. 散寒通窍止痛
- C. 散寒胜湿通络
- D. 疏风散寒和络
- E. 疏散风寒止痛

110. 该病治疗可选择以下哪项药物

- A. 葛根、白芷
- B. 柴胡、川芎
- C. 羌活、蔓荆子
- D. 羌活、葛根
- E. 吴茱萸、藁本

111. 该病针灸治疗选择配穴为

- A. 印堂、内庭
- B. 天柱、后溪、昆仑
- C. 率谷、外关、足临泣

D. 四神聪、太冲、内关

E. 印堂、后溪、足临泣

(112~114 题共用题干)

患者，女，35岁。偶然发现结块肿大，质软不痛，颈部觉胀，胸闷，喜太息，或兼胸胁窜痛，病情常随情志波动，苔薄白，脉弦。

112. 属中医的

- A. 梅核气
- B. 癭病
- C. 癥瘕
- D. 郁证
- E. 失荣

113. 辨证为

- A. 肝郁气滞证
- B. 肝肾不足证
- C. 痰结血瘀证
- D. 气郁痰阻证
- E. 冲任失调证

114. 治疗应选代表方剂为

- A. 一贯煎
- B. 梅子清肝汤
- C. 开郁散
- D. 四海舒郁丸

(115~118 题共用题干)

患者，女，65岁。咳嗽5天。咳嗽声重，气急，咽痒，咳痰稀薄色白，鼻塞，流清涕，头痛，肢体酸楚，舌苔薄白，脉浮。

115. 其病证候是

- A. 风燥伤肺证
- B. 痰热伤肺证
- C. 肝火犯肺证
- D. 风寒袭肺证
- E. 风热犯肺证

116. 其治法是

- A. 疏风清肺，润燥止咳
- B. 疏风散寒，宣肺止咳
- C. 疏风清热，宣肺止咳
- D. 清肺泻肝，顺气降火

- E. 清热肃肺, 豁痰止咳
117. 治疗应首选
- 三拗汤合止嗽散加减
 - 黛蛤散合黄芩泻白散加减
 - 桑杏汤加减
 - 清金化痰汤加减
 - 桑菊饮加减
118. 若素有寒饮伏肺, 兼见咳嗽上气, 痰液清稀, 胸闷气急, 舌淡红, 苔白而滑, 脉浮紧者, 可改投
- 沙参麦冬汤
 - 二陈平胃散
 - 桑杏汤
 - 清金化痰汤加减
 - 小青龙汤

(119~120 题共用题干)

患者, 女, 43 岁。小便不畅或点滴不通, 咽干, 烦渴欲饮, 呼吸急促, 或有咳嗽, 舌红, 苔薄黄, 脉数。

119. 该病治法为
- 升清降浊, 化气行水
 - 清泄肺热, 通利水道
 - 疏利气机, 通利小便
 - 行瘀散结, 通利水道
 - 清利湿热, 通利小便
120. 若出现肺阴不足者, 可加哪些药
- 生地黄、车前子、牛膝
 - 黄芪、丹参、当归
 - 丹皮、山栀
 - 沙参、黄精、石斛
 - 车前子、通草、制大黄

四、B1 型选择题 (121~150 题)

(答题说明: 以下提供若干组考题, 每组考题共用在前列出的 A、B、C、D、E 五个备选答案, 请从中选择一个与问题最密切的答案, 某一个备选答案可能被选择一次、多次或不被选择。)

(121~123 题共用备选答案)

- A. 风寒感冒

- B. 风热感冒
C. 暑湿感冒
D. 气虚感冒
E. 阴虚感冒

121. 身热, 微恶风, 汗少, 肢体酸重或疼痛, 头昏重胀痛, 咳嗽痰黏, 鼻流浊涕, 心烦口渴, 渴不多饮, 胸闷脘痞, 泛恶, 腹胀, 大便或溏, 小便短赤, 舌苔薄黄而腻, 脉濡数。证属
122. 恶寒重, 发热轻, 无汗, 头痛, 肢节酸疼, 鼻塞声重或鼻痒喷嚏, 时流清涕, 咽痒, 咳嗽, 痰吐稀薄色白, 口不渴或渴喜热饮, 舌苔薄白而润, 脉浮紧。证属
123. 身热, 微恶风寒, 少汗, 头昏, 心烦, 口干, 干咳少痰, 舌红少苔, 脉细数。证属

(124~125 题共用备选答案)

- A. 二陈汤合三子养亲汤
B. 清金化痰汤
C. 桑杏汤
D. 黛蛤散合黄芩泻白散
E. 三拗汤合止嗽散

124. 治疗肝火犯肺型咳嗽的代表方剂是
125. 治疗痰湿蕴肺型咳嗽的代表方剂是
- (126~128 题共用备选答案)
- 养血祛风通络
 - 平肝潜阳, 活血通络
 - 息风化痰, 活血通络
 - 化痰息风, 宣郁开窍
 - 回阳救阴, 益气固脱

126. 中风中脏腑脱证的治法是
127. 中风中脏腑风痰瘀阻证的治法是
128. 中经络风阳上扰证的治法是

(129~130 题共用备选答案)

- 生铁落饮
- 癫狂梦醒汤
- 顺气导痰汤
- 二阴煎合琥珀养心丹
- 天王补心丹

129. 狂证痰热瘀结证的代表方是

130. 狂证火盛阴伤证的代表方是
(131~132 题共用备选答案)

- A. 痢病
- B. 眩晕
- C. 厥证
- D. 昏迷
- E. 中风

131. 突然昏仆, 并伴有口眼喎斜、偏瘫等症, 神昏时间较长, 苏醒后有偏瘫、口眼喎斜及失语等后遗症。此为

132. 头晕目眩, 视物旋转不定, 甚则不能站立, 耳鸣, 但无神志异常的表现。此为

133. 突然昏仆, 不省人事, 但发作时间短暂, 且发作时常伴有嚎叫、抽搐、口吐涎沫、两目上视、小便失禁等。常反复发作, 每次症状均相类似, 苏醒缓解后可如常人。此为

(134~135 题共用备选答案)

- A. 肺卫不固证
- B. 心血不足证
- C. 阴虚火旺证
- D. 邪热郁蒸证
- E. 脾胃虚弱证

134. 汗证, 汗出恶风, 稍劳汗出尤甚, 易于感冒, 体倦乏力, 面色少华, 苔薄白, 脉细弱。辨证应属

135. 汗证, 自汗或盗汗, 神疲气短, 面色不华, 舌质淡, 脉细。辨证应属

(136~137 题共用备选答案)

- A. 心阳虚证
- B. 心气虚证
- C. 肾气虚证
- D. 肾阳虚证
- E. 阴虚证

136. 七福饮治疗虚劳的证型为

137. 大补元煎治疗虚劳的证型为

(138~140 题共用备选答案)

- A. 病起发热, 皮肤干燥, 咳呛少痰

B. 肢体困重, 手足麻木, 喜凉恶热

C. 神疲肢倦, 肌肉萎缩, 少气懒言

D. 腰膝酸软, 眩晕耳鸣, 舌咽干燥

E. 手足麻木不仁, 四肢青筋显露, 舌痿不能伸缩

138. 痿证之湿热浸淫证症见

139. 痿证之脉络瘀阻证症见

140. 痿证之脾胃虚弱证症见

(141~142 题共用备选答案)

A. 头面部

B. 胸中

C. 心中

D. 腹中

E. 手足末端

141. 同名的阳经与阳经的交接部位是

142. 相互衔接的阴经与阴经的交接部位是

(143~144 题共用备选答案)

A. 大陵

B. 太渊

C. 阳溪

D. 神门

E. 阳池

143. 在腕掌侧横纹桡侧, 桡动脉的桡侧凹陷中的穴位是

144. 在腕横纹尺侧端, 尺侧腕屈肌腱的桡侧凹陷处的穴位是

(145~146 题共用备选答案)

A. 先深后浅, 轻插重提, 提插幅度大, 频率快, 操作时间长

B. 先浅后深, 重插轻提, 提插幅度小, 频率慢, 操作时间短

C. 病人吸气时进针, 呼气时出针

D. 出针时摇大针孔而不按压

E. 出针后迅速按压针孔

145. 属于提插补法操作的是

146. 属于开阖补法操作的是

(147~148 题共用备选答案)

- A. 瘰疬、初起的肿疡

- B. 哮喘、肺癆、癰疽
C. 吐瀉并作、中風脫證
D. 因寒而致的嘔吐、腹痛
E. 命門火衰而致的陽痿、早泄
147. 隔蒜灸的適應病證是
148. 隔姜灸的適應病證是
(149~150 題共用備選答案)
- A. 陷下則灸之
B. 熱則疾之
C. 寒則留之
D. 標本同治
E. 三因制宜
149. 以上哪項屬於補虛瀉實的治疗原則
150. 以上哪項屬於治病求本的治疗原則

第四单元

一、A1 型选择题 (1~54 题)

(答题说明:每一道考题下面有 A、B、C、D、E 五个备选答案,请从中选择一个最佳答案。)

1. 产后红恶露的持续天数是
 - A. 3~4
 - B. 5~6
 - C. 7~8
 - D. 9~10
 - E. 11~12
2. 治崩三法是
 - A. 塞流、澄源、复旧
 - B. 塞流、澄源、求因
 - C. 止血、求因、固本
 - D. 塞流、止血、澄源
 - E. 健脾、调肝、补肾
3. 气滞血瘀所致经行浮肿的最佳选方是
 - A. 逍遥散
 - B. 八物汤
 - C. 调肝汤
 - D. 乌药汤
 - E. 柴胡疏肝散
4. 经行泄泻主要责之于
 - A. 肝脾虚弱
 - B. 脾胃虚弱
 - C. 脾肾虚弱
 - D. 肝胃虚弱
 - E. 肝肾虚弱
5. 带下过少的治疗原则重在
 - A. 除湿
 - B. 益气养血
 - C. 滋补肝肾之阴精
 - D. 疏肝养肝
 - E. 调理冲任
6. 患者人流术后 10 天,间断阴道出血。近 1 天阴道出血大于月经量,夹有黑血块,B 超示宫腔内有组织残留。其诊断是
 - A. 人流综合征
 - B. 子宫穿孔
 - C. 人流不全
 - D. 宫腔或颈管内口粘连
 - E. 人流术后感染
7. 经行乳房胀痛胃虚痰滞证治法为
 - A. 健胃祛痰,和胃通络
 - B. 健胃祛痰,活血止痛
 - C. 燥湿化痰,和胃通络
 - D. 理气化痰,化瘀止痛
 - E. 养胃益阴,活血止痛
8. 妊娠病的常见发病机理除外哪一项
 - A. 阴血虚
 - B. 脾肾虚
 - C. 冲气上逆
 - D. 气滞
 - E. 瘀血内阻
9. 作为调经的具体原则,哪项是错误的
 - A. 扶脾
 - B. 调理气血
 - C. 疏肝
 - D. 清热凉血
 - E. 补肾
10. 《邯郸遗稿》的学术观点是
 - A. 重视调理气血,补益脾肾
 - B. 强调阴阳相互作用
 - C. 妊娠期以养胎、保胎为要
 - D. 重视脾肾,倡命门学说
 - E. 胎前善养血健脾、清热疏气
11. 产后三急是指
 - A. 产后血晕、产后痉病、产后腹痛
 - B. 产后病痉、产后大便难、产后郁冒
 - C. 产后小便不通、产后恶露不绝、产后小

- 便淋痛
- D. 产后呕吐、泄泻、盗汗
E. 产后冲心、冲肺、冲胃
12. 一般认为月经量超过多少为月经过多
- A. 80ml
B. 120ml
C. 150ml
D. 100ml
E. 60ml
13. 诊断小儿疾病, 特别重要的诊查方法是
- A. 按诊
B. 脉诊
C. 问诊
D. 闻诊
E. 望诊
14. 从出生后至满 1 周岁, 称为
- A. 胎儿期
B. 围生期
C. 新生儿期
D. 婴儿期
E. 幼儿期
15. 新生儿中药用量应为成人量的
- A. 1/6
B. 1/3
C. 1/2
D. 2/3
E. 等量
16. 下列关于添加辅食原则的说法中, 不正确的是
- A. 由少到多
B. 由稀到稠
C. 由稠到稀
D. 由细到粗
E. 品种渐增
17. 下列属于病理性黄疸的是
- A. 生后 24h 以内出现黄疸
B. 生后第 2~3 日出现黄疸, 第 4~6 日达高峰
C. 足月儿在生后 2 周消退, 早产儿可延迟至 3~4 周消退
- D. 足月儿血清总胆红素 $\leq 221 \mu\text{mol/L}$, 早产儿 $\leq 257 \mu\text{mol/L}$
E. 小儿一般情况良好, 除偶有轻微食欲不振外, 不伴有其他临床症状
18. 治疗鹅口疮心脾积热证的首选方剂是
- A. 导赤散
B. 泻黄散
C. 泻心汤
D. 清胃散
E. 清热泻脾散
19. 治疗脾虚泻的首选方是
- A. 保和丸
B. 平胃散
C. 参苓白术散
D. 藿香正气散
E. 附子理中汤
20. 患儿, 1 岁 6 个月。体重 9kg, 纳呆, 面色少华, 性急易怒, 大便干稀不调, 舌质淡, 苔薄微腻, 指纹淡。其诊断是
- A. 厌食
B. 疳气
C. 疳积
D. 干疳
E. 积滞
21. 病毒性心肌炎急性期应卧床休息的时间为
- A. 1 周
B. 1~3 周
C. 3~6 周
D. 6~12 周
E. 6~12 个月
22. 下列哪项不属于五迟的范畴
- A. 坐迟
B. 立迟
C. 行迟
D. 齿迟
E. 语迟
23. 治疗麻疹逆证邪毒攻喉证的首选方剂是

- A. 定喘汤
B. 清咽下痰汤
C. 银翘散
D. 黄连解毒汤
E. 麻杏石甘汤
24. 治疗蛲虫病首选方剂为
A. 化虫丸
B. 驱虫粉
C. 使君子散
D. 追虫丸
E. 贯众汤
25. 下列各项中不属劳伤虚损的是
A. 过度劳力
B. 食伤
C. 过度劳神
D. 妇女生育过多
E. 房事过度
26. 阳证的皮肤颜色主要是
A. 红赤
B. 晦暗
C. 青紫
D. 苍白
E. 皮色不变
27. 下列关于辨脓的方法, 错误的是
A. 接触法
B. 透光法
C. 切开法
D. 穿刺法
E. 点压法
28. 具有腐蚀性的膏药是
A. 千捶膏
B. 太乙膏
C. 咬头膏
D. 阳和解凝膏
E. 红油膏
29. 生于下列哪一部位的有头疽易致内陷
A. 项后
B. 四肢
C. 颜面
D. 少腹部
E. 臁中
30. 对单发的乳核宜采用何种治疗方法
A. 手术切除
B. 中药治疗
C. 放射治疗
D. 抗癆治疗
E. 以上都不是
31. 肉瘤的西医病名是
A. 脂肪肉瘤
B. 骨骼肌肉瘤
C. 脂肪瘤
D. 纤维肉瘤
E. 平滑肌肉瘤
32. 以下哪一项为淋病临床特点
A. 龟头红肿, 包皮内有多量脓性分泌物
B. 外生殖器有多个痛性溃疡, 表面有脓性分泌物, 尿道口红肿
C. 尿道分泌物少, 为黏液状
D. 尿道口刺痛, 尿道口排出脓性分泌物
E. 外生殖器多为单个无痛性溃疡
33. 鹅掌风相当于西医的
A. 足癣
B. 手癣
C. 体癣
D. 股癣
E. 阴癣
34. 下列哪种疾病无脱垂症状
A. II期内痔
B. 肛裂
C. 混合痔
D. 息肉痔
E. 脱肛
35. 精浊之气滞血瘀证的代表方剂是
A. 前列腺汤
B. 八正散
C. 龙胆泻肝汤
D. 抵当丸
E. 知柏地黄汤
36. 破伤风前驱期不应有的症状是

- A. 头痛、头晕
B. 乏力、多汗
C. 烦躁、打呵欠
D. 咀嚼无力
E. 张口困难
37. 某种传染病在某一地区的近几年发病率的一般水平称为
A. 散发
B. 暴发
C. 流行
D. 流行性
E. 大流行
38. 下述哪项不是艾滋病的传播途径
A. 性接触
B. 注射及输血和血制品
C. 母婴传播
D. 器官移植
E. 消化道
39. 慢性乙型肝炎的治疗关键是
A. 休息
B. 保肝
D. 抗病毒
E. 调节免疫
40. 流行性出血热的“三痛”是
A. 头痛、全身痛和腰痛
B. 头痛、关节痛和腰痛
C. 头痛、腓肠肌痛和腰痛
D. 头痛、眼眶痛和腰痛
E. 头痛、腹痛和腰痛
41. 狂犬病的传播途径不包括
A. 眼结膜
B. 肛门粘膜
C. 胃肠粘膜
D. 角膜移植
E. 呼吸道
42. 霍乱的典型临床表现是
A. 先泻后吐
B. 先吐后泻
C. 只泻不吐
D. 腹泻伴腹痛
E. 吐泻同时发生
43. 普通型流脑败血症期重要的体征是
A. 高热
B. 剧烈头痛
C. 全身中毒症状
D. 皮肤黏膜瘀斑
E. 脑膜刺激征
44. 伤寒第一次菌血症相当于临床上的哪一期
A. 潜伏期
B. 初期
C. 极期
D. 缓解期
E. 恢复期
45. 下列哪项不是急性菌痢的典型表现
A. 里急后重
B. 发热
C. 呕吐
D. 腹痛
E. 白细胞增多
46. 下列哪项不符合中毒型菌痢脑型的诊断
A. 急性高热, 惊厥, 昏迷
B. 迅速出现呼吸衰竭
C. 肠道症状不明显
D. 大便常规正常
E. 脑脊液检查正常
47. 有关隔离的描述, 错误的是
A. 是控制传染病流行的重要措施
B. 便于管理传染源
C. 可防止病原体向外扩散给他人
D. 根据传染病的平均传染期来确定隔离期限
E. 某些传染病患者解除隔离后还应进行追踪观察
48. 有关医院感染的概念, 错误的是
A. 是指在医院内获得的感染
B. 出院之后的感染有可能是医院感染
C. 与上次住院有关的感染是医院感染

- D. 入院时处于潜伏期的感染不一定是医院感染
- E. 婴幼儿经胎盘获得的感染属医院感染
49. 下列各项中, 在整个卫生法律体系中享有最高法律效力的规范性文件是
- A. 《中华人民共和国刑法》
- B. 《中华人民共和国宪法》
- C. 《中华人民共和国民法通则》
- D. 《中华人民共和国食品安全法》
- E. 以上均不是
50. 卫生法所涉及的民事责任主要形式是
- A. 赔偿损失
- B. 行政处罚
- C. 刑事处罚
- D. 财产责任
- E. 损害责任
51. 受吊销医师执业证书行政处罚, 自处罚决定之日起至申请注册之日止不满多长时间的不给予注册
- A. 6个月
- B. 12个月
- C. 18个月
- D. 24个月
- E. 36个月
52. 下列关于假药的情形叙述正确的是
- A. 变质的药品
- B. 被污染的药品
- C. 国务院药品监督管理部门规定禁止使用的药品
- D. 所标明的适应证或者功能主治超出规定范围的药品
- E. 以上均是
53. 关于突发公共卫生事件的应急预案措施中, 有关部门及医疗卫生机构应当对传染病做到下列哪“四早”
- A. 早发现、早报告、早隔离、早治疗
- B. 早发现、早隔离、早诊断、早治疗
- C. 早发现、早报告、早诊断、早治疗
- D. 早发现、早报告、早诊断、早治疗

- E. 早发现、早报告、早观察、早治疗
54. 下列各项中, 属于发生医疗事故争议时, 应在医患双方在场的情况下封存和启封的材料是
- A. 会诊意见
- B. 手术同意书
- C. 特殊检查同意书
- D. 手术及麻醉记录单
- E. 医学影像检查资料

二、A2型选择题(55~87题)

(答题说明: 每一道考题是以一个小案例出现的, 其下面都有A、B、C、D、E五个备选答案, 请从中选择一个最佳答案。)

55. 患者, 女, 26岁。多次发生经间期出血, 此次阴道出血量稍多, 色深红, 质黏腻, 无血块, 平素带下量多色黄, 时现异味, 小腹隐痛, 神疲乏力, 胸闷烦躁, 纳呆腹胀, 小便短赤, 舌红苔黄腻, 脉滑数, 辨属何证
- A. 脾虚证
- B. 血瘀证
- C. 肝郁证
- D. 血热证
- E. 湿热证
56. 患者, 女, 30岁。月经停闭半年未行, 形体肥胖, 胸脘满闷, 泛恶, 带下量多、色白, 苔腻, 脉滑。首选
- A. 启宫丸合四君子汤
- B. 苍附导痰丸合四君子汤
- C. 丹溪治痰方合四君子汤
- D. 萆薢渗湿汤
- E. 化痰燥湿通经汤
57. 田某, 女, 27岁。结婚三年, 孕3产0, 自然流产3次, 均在孕50天时自然殒堕。现停经7周, 尿妊娠试验阳性, 伴有恶心, 呕吐, 夜尿频多等早孕反应, 2天前出现阴道少量流血, 但无腰酸腹痛。B超提示: 宫内早孕。妇科检查: 宫口未开, 子宫增大, 符合停经月份。此病案诊断为

- A. 堕胎
B. 小产
C. 胎堕不全
D. 滑胎
E. 胎动难留
58. 一孕妇, 孕6月余, 小便频数, 艰涩刺痛, 尿少色黄, 伴面赤心烦, 喜冷饮, 舌上溃疡, 舌红欠润, 少苔, 脉细数, 治疗首选
A. 五苓散
B. 导赤散
C. 保阴煎
D. 龙胆泻肝汤
E. 知柏地黄丸
59. 妊娠8个月, 腹部异常增大, 胸膈满闷, 呼吸短促, 神疲倦怠, 小便短少, 喘不得卧, 舌质淡苔白, 脉沉滑动。最佳治法是
A. 逐水消肿, 养血安胎
B. 疏肝健脾, 逐水消肿
C. 滋肾健脾, 温阳利水
D. 温肾健脾, 泻肺利水
E. 健脾利水, 养血安胎
60. 患者, 女, 已婚, 34岁。经期或经后, 午后潮热, 月经量少, 色红; 两颧红赤, 五心烦热, 烦躁少寐; 舌红而干, 脉细数。其辨证分型是
A. 血气虚弱证
B. 瘀热壅阻证
C. 血瘀型
D. 脾虚型
E. 肝肾阴虚证
61. 患者江某, 新产后一周小腹隐隐作痛, 数日不止, 喜按喜揉, 恶露量少, 色淡红, 质稀无块, 面色苍白, 头晕, 眼花, 心悸怔忡; 舌质淡, 苔薄白, 脉细弱。最佳治法是
A. 补血益气, 缓急止痛
B. 补血养血, 化瘀止痛
C. 补血益气, 温经止痛
D. 补血益气, 暖宫止痛
E. 温经散寒, 化瘀止痛
62. 陈某, 女, 婚后5年未怀孕, 月经多推后几天, 经来小腹胀痛, 经色紫, 有血块, 块下痛减, 有时经行不畅; 伴见肛门坠痛, 性交痛; 舌质紫暗, 脉弦细。最佳治法是
A. 逐瘀荡胞, 调经助孕
B. 活血化瘀
C. 疏肝理气
D. 理气活血化瘀
E. 补肾活血, 调经助孕
63. 急性盆腔炎患者, 下腹部疼痛拒按, 寒热往来, 带下量多、色黄、质稠、味臭秽, 经量增多, 经期延长, 淋漓不止, 大便燥结, 小便短赤; 舌红有瘀点, 苔黄厚, 脉弦滑。治疗首选
A. 五味消毒饮
B. 清营汤
C. 大黄牡丹汤
D. 仙方活命饮
E. 犀角地黄汤
64. 一妇人产后遍身关节酸楚, 疼痛, 肢体麻木, 面色萎黄, 头晕, 心悸, 舌淡, 苔薄, 脉细弱。最佳治法是
A. 养血活血, 温阳通络
B. 疏肝养血, 通络止痛
C. 养血益气, 温经通络
D. 养血温中, 通络止痛
E. 养血滋阴, 通络止痛
65. 患者, 女, 25岁。月经提前九天而至, 连续两月, 量多, 色深红, 质黏稠; 伴心烦, 口干, 面赤, 大便干, 小便黄; 舌质红, 苔黄, 脉滑数。最佳选方是
A. 清热固经汤
B. 清经散
C. 保阴煎
D. 两地汤
E. 丹栀逍遥散
66. 患儿, 2岁。发热3~4天出疹, 疹形细小, 状如麻粒, 口腔黏膜出现“麻疹黏膜斑”者, 应诊断为

- A. 口疮
B. 鹅口疮
C. 麻疹
D. 疔腮
E. 发颐
67. 患儿, 出生 32 天。症见面目皮肤发黄, 色泽晦暗, 持久不退, 精神萎靡, 四肢欠温, 纳呆, 大便溏薄色灰白, 小便短少, 舌质淡, 苔白腻。其证候是
- A. 寒湿阻滞
B. 气滞血瘀
C. 湿热郁蒸
D. 胎黄动风
E. 胎黄虚脱
68. 患儿, 3 岁。平素反复外感。面白少华, 形体消瘦, 肌肉松软, 鸡胸龟背, 腰膝酸软, 形寒肢冷, 发育落后, 动则气喘, 少气懒言, 多汗易汗, 食少纳呆, 大便稀溏, 舌质淡, 苔薄白, 脉沉细无力。其治法是
- A. 调和营卫, 益气固表
B. 温补肾阳, 健脾益气
C. 养阴润肺, 益气健脾
D. 补肺固表, 健脾益气
E. 健脾益气, 养阴益胃
69. 患儿, 4 岁。高热 3 天, 持续不退, 咳嗽剧烈, 气急鼻煽, 烦躁不安, 忽见神昏谵语, 四肢抽搐, 双目上视, 舌红绛, 指纹直达命关。其治法是
- A. 辛凉宣肺, 清热化痰
B. 清热解毒, 泻肺开闭
C. 清热涤痰, 开肺定喘
D. 温补心阳, 救逆固脱
E. 平肝熄风, 清心开窍
70. 患儿, 7 岁。反复咳嗽喘促 3 年余。证见咳嗽喘促, 动则喘甚, 胸闷气短, 面色欠华, 神疲乏力, 畏寒肢冷, 舌质淡, 苔白, 脉细弱。治疗首选方
- A. 苏葶丸
B. 华盖散
C. 苏子降气汤
D. 小青龙汤
E. 金匱肾气丸
71. 痫证患儿, 发作时突然仆倒, 神志不清, 颈项及全身强直, 继而四肢抽搐, 两目上视, 牙关紧闭, 口吐白沫, 口唇及面部色青, 舌苔白, 脉弦滑。治疗应首选方剂是
- A. 定痫丸
B. 远志丸
C. 定魄丸
D. 镇惊丸
E. 涤痰汤
72. 患儿, 7 岁, 面红耳赤, 烦躁易怒, 皱眉眨眼, 张口歪嘴, 摇头耸肩, 发作频繁, 抽动有力, 日出异声秽语, 大便秘结, 小便短赤, 舌红苔黄, 脉弦数。应诊断为
- A. 惊风
B. 癫痫
C. 抽动障碍
D. 注意力缺陷多动症
E. 痉挛症
73. 患儿, 女, 5 岁。因右侧腮部肿痛 5 天就诊。现证见腮部漫肿, 灼热疼痛, 咀嚼时尤甚, 精神倦怠, 高热头痛, 咽喉红肿, 大便干结, 小便短赤, 舌质红, 苔黄腻, 脉滑数。治疗首选方剂是
- A. 仙方活命饮
B. 普济消毒饮
C. 黄连解毒汤
D. 三仁汤
E. 荆防败毒散
74. 患儿, 女, 5 岁。发热 1 天, 颜面、躯干见丘疹及水疱疹。现低热, 恶寒, 鼻塞流涕, 疹色红润, 疱浆清亮, 疹粒稀疏, 舌质红, 苔薄白, 脉浮数。其病证诊断为
- A. 幼儿急疹, 邪郁肌表
B. 风疹, 邪犯肺卫证
C. 麻疹, 邪犯肺卫证
D. 水痘, 毒炽气营证
E. 水痘, 邪伤肺卫证

75. 患儿, 2岁。高热7天, 昼轻夜重, 咽红目赤, 唇干赤裂, 烦躁不宁, 肌肤斑疹, 手足硬肿, 随后指趾端脱皮, 舌质红绛, 状如草莓, 苔薄黄, 脉数有力。治疗应首选的方剂是
- 桑杏汤
 - 银翘散
 - 桃花煎
 - 清瘟败毒饮
 - 沙参麦冬汤
76. 患儿, 7个月, 因持续发热2周于8月上旬就诊, 体温波动于 $38^{\circ}\text{C}\sim 39^{\circ}\text{C}$, 气温高时体温较高, 无汗, 口渴, 无咳嗽流涕, 口唇干燥, 烦躁喜哭, 尿频, 舌红, 苔薄黄, 指纹紫滞。治疗首选方剂
- 六一散
 - 甘露消毒丹
 - 王氏清暑益气汤
 - 竹叶石膏汤
 - 温下清上汤
77. 患者一侧臀部结块, 肿胀疼痛, 皮肤灼热, 红肿以中心为著, 边界不清, 步行困难, 身热头痛, 病前有局部肌肉注射史。应诊断为
- 丹毒
 - 流注
 - 臀疖
 - 环跳疽
 - 附骨疽
78. 患者, 女, 26岁。产后第三周出现恶寒发热, 右乳肿胀疼痛, 体温 38.7°C , 检查见右乳红肿, 无波动感, 口渴, 舌红, 苔薄黄, 脉数。此时的治疗方法是
- 切开引流
 - 疏肝理气, 化痰散结
 - 疏肝清胃, 通乳消肿
 - 清热解毒, 托里透脓
 - 泻火解毒利湿
79. 患者白疔初起, 皮损遍身, 多呈点滴状, 颜色鲜红, 层层银屑, 瘙痒剧烈, 抓之有点状出血, 伴口干舌燥, 便干溲黄, 舌质红, 苔薄黄, 脉弦滑。证属
- 火毒炽盛证
 - 湿毒蕴阻证
 - 气血瘀滞证
 - 血热内蕴证
 - 以上均不是
80. 患者, 女, 40岁。慢性肾病, 病程日久, 平素头发焦黄, 发病时呈大片均匀脱落; 伴头昏, 耳鸣, 目眩, 腰膝酸软; 舌质淡, 舌苔薄, 脉细。治疗宜选用
- 八珍汤
 - 大补阴丸
 - 通窍活血汤
 - 六味地黄汤
 - 七宝美髯丹
81. 患者, 女, 26岁。平素喜食辛辣刺激食物, 在暑夜吃了火锅之后, 两手突起丘疱疹, 灼热瘙痒无休, 抓破渗液流脂水; 伴心烦口渴, 身热不扬, 大便干, 小便短赤; 舌红, 苔薄黄, 脉滑。其治法为
- 健脾利湿止痒
 - 清热利湿止痒
 - 凉血清火止痒
 - 清热解毒止痒
 - 清暑利湿解毒
82. 患者肛旁肿痛1周, 近3天加重, 伴发热恶寒, 坐卧不宁。检查肛门左侧饱满, 高于右侧, 压痛明显, 有波动感, 最可能的诊断是
- 直肠后间隙脓肿
 - 骨盆直肠间隙脓肿
 - 肛门旁皮下脓肿
 - 坐骨直肠间隙脓肿
 - 坐骨直肠间隙脓肿传向肛提肌
83. 患者, 男, 38岁。患急性子痈2天, 恶寒发热, 左侧睾丸肿大疼痛, 疼痛引及子系(精索), 舌红苔黄腻, 脉滑数。证属湿热下注, 气血壅滞, 经络阻隔为患。治宜清热解毒,

利湿消肿，应首选

- A. 透脓散
B. 滋阴除湿汤
C. 萆薢化毒汤
D. 柴胡疏肝散
E. 枸橼汤
84. 患者，男，32岁。右下肢麻木、发凉、怕冷2年，每行走约1km需停下休息。体格检查：右下肢皮温较对侧低，色泽苍白，右足背动脉搏动减弱。诊断考虑为
- A. 血栓闭塞性脉管炎
B. 大动脉炎
C. 右下肢动脉硬化性闭塞症
D. 右下肢深静脉血栓形成
E. 右下肢血栓性浅静脉炎
85. 瘦癯患者，肿块坚实，轻度作胀，重按才感疼痛，其痛牵引耳后枕部，有喉间梗塞感，痰多，苔黄腻，脉弦滑。其辨证为
- A. 肝郁气滞证
B. 气滞痰凝证
C. 血瘀化热证
D. 痰瘀内结证
E. 冲任失调证
86. 8月上旬，一男性儿童前额部出现2个红肿结块，约2cm×2cm，中央有一个脓头未溃，疼痛拒按，伴口渴便秘，尿短赤。应选用
- A. 五味消毒饮
B. 仙方活命饮
C. 清暑汤
D. 防风通圣散
E. 黄连解毒汤
87. 患者，女，40岁。双乳肿胀疼痛，月经前加重，经后缓减，肿块大小不等，形态不一，伴乳头溢液，月经不调，腰酸乏力，舌淡苔白，脉弦细。其证候是
- A. 肝郁痰凝
B. 肝气郁结
C. 冲任失调

- D. 肝郁火旺
E. 肝郁脾虚

三、A3型选择题(88~114题)

(答题说明：以下提供若干个案例，每个案例下设多道考题。请根据题干所提供的信息，在每一道考题下面的A、B、C、D、E五个备选答案中选择一个最佳答案。)

(88~90题共用题干)

患者经期或经后小腹冷痛，喜按，得热则舒，经量少，经色暗淡，腰腿酸软，小便清长。舌淡胖，苔白润，脉沉。

88. 其证是

- A. 寒凝血瘀证
B. 阳虚内寒证
C. 脾肾阳虚证
D. 气血虚弱证
E. 肾气亏损证

89. 其治法是

- A. 理气行滞，化瘀止痛
B. 温经散寒，化瘀止痛
C. 益气养血，调经止痛
D. 温经扶阳，暖宫止痛
E. 补肾益精，养血止痛

90. 治疗应选的方剂是

- A. 温经汤(《金匮要略》)
B. 艾附暖宫丸
C. 温经汤(《妇人大全良方》)
D. 少腹逐瘀汤
E. 膈下逐瘀汤

(91~93题共用题干)

王某，停经44天，曾做妊娠试验为阳性，近五天出现恶心呕吐，逐渐加剧，呕吐酸水、苦水，口干口苦，头胀而晕，胸胁胀满，喜叹息，舌淡红，苔黄，脉弦滑。

91. 其证是

- A. 脾胃虚弱证
B. 痰滞证
C. 胃火亢盛证
D. 肝胃不和证

- E. 脾阳虚证
92. 其治法是
- A. 化痰除湿, 降逆止呕
- B. 健脾和胃, 降逆止呕
- C. 健脾除湿, 降逆止呕
- D. 健脾清火, 降逆止呕
- E. 清肝和胃, 降逆止呕

93. 治疗应选的方剂是

- A. 橘皮竹茹汤
- B. 香砂六君子汤
- C. 左金丸
- D. 小半夏加茯苓汤
- E. 加味温胆汤

(94~96 题共用题干)

李某, 新产后, 突然出现高热寒战, $T39.5^{\circ}\text{C}$, 伴小腹疼痛, 拒按, 恶露量多, 色紫暗如败酱, 气臭秽, 心烦口渴, 大便秘结, 小便黄。舌红, 苔黄, 脉数有力。

94. 其证是

- A. 感染邪毒证
- B. 外感证
- C. 血瘀证
- D. 血虚证
- E. 肾虚证

95. 其治法是

- A. 清热解毒, 化瘀止血
- B. 清热解毒, 凉血化瘀
- C. 清热解毒, 泻下逐攻
- D. 清热解毒, 凉血养阴
- E. 清热解毒, 清心开窍

96. 治疗应选的方剂是

- A. 荆防四物汤
- B. 血府逐瘀汤
- C. 生化汤
- D. 大黄牡丹皮汤
- E. 五味消毒饮

(97~99 题共用题干)

患儿, 3 岁。体重 10kg, 身高 80cm。其形体消瘦, 面色无华, 毛发干枯, 精神萎靡不振,

不思饮食, 腹膨如鼓, 一身浮肿, 双踝肿甚, 按之凹陷, 舌质淡, 苔薄白, 指纹淡。

97. 其治法是

- A. 补益气血, 佐以运脾
- B. 养血柔肝, 活血化痰
- C. 滋阴生津, 养血安神
- D. 健脾温阳, 利水消肿
- E. 调脾健运, 开胃进食

98. 其选方是

- A. 防己黄芪汤合五苓散
- B. 黄芪桂枝五物汤合真武汤
- C. 五皮饮合胃苓汤
- D. 实脾饮合五苓散
- E. 麻黄连翘赤小豆汤

99. 根据材料分析, 判断该患儿的生长发育状况

- A. 体重正常, 身高正常
- B. 体重偏低, 身高偏低
- C. 体重偏低, 身高正常
- D. 体重偏高, 身高偏低
- E. 体重偏低, 身高偏高

(100~102 题共用题干)

患儿, 5 岁。因反复发热遂于医院检查, 血象检查提示: 病毒感染; 心肌酶提示: cTnl (+)。

现症见: 低热绵延, 鼻塞流涕, 咽红肿痛, 咳嗽有痰, 肌痛肢楚, 头晕乏力, 心悸气短, 胸闷胸痛, 舌质红, 舌苔薄, 脉结代。

100. 根据题干内容进行分析, 其诊断为

- A. 感冒
- B. 乳蛾
- C. 中毒性心肌炎
- D. 病毒性心肌炎
- E. 弥漫性心肌炎

101. 根据题干内容进行分析, 其诊断证型

- A. 时邪感冒证
- B. 风热犯心证
- C. 风热搏结证
- D. 风热咳嗽证
- E. 风热乘脾证

102. 根据以上诊断, 首选方剂为

- A. 银翘散
- B. 炙甘草汤合生脉散
- C. 银翘散合普济消毒饮
- D. 银翘散合五味消毒饮
- E. 桑菊饮

(103~105 题共用题干)

患儿,男,4岁。大便秘结,脘腹胀满,不思饮食,恶心呕吐,口臭,手足心热,小便黄少,舌质红,苔黄厚,脉沉有力。

103. 其诊断是
- A. 食积便秘
 - B. 燥热便秘
 - C. 气滞便秘
 - D. 气虚便秘
 - E. 血虚便秘
104. 其治法是
- A. 消积导滞通便
 - B. 清热润肠通便
 - C. 理气导滞通便
 - D. 益气润肠通便
 - E. 养血润肠通便

105. 治疗应首选
- A. 黄芪汤
 - B. 麻子仁丸
 - C. 六磨汤
 - D. 枳实导滞丸
 - E. 润肠丸

(106~108 题共用题干)

患者,女,43岁。颈部呈弥漫性肿大3年,表面平坦,质软不痛,边缘不清,随喜怒消长,皮色如常,肿块随吞咽上下移动;伴急躁易怒,善太息。舌质淡红,苔薄白,脉沉弦。

106. 根据题干分析,其诊断是
- A. 肉瘰
 - B. 瘰疬
 - C. 石瘰
 - D. 肉瘤
 - E. 气瘰
107. 根据题干分析,该病治法是

- A. 解郁安神,化痰软坚
- B. 补益气血,解毒化痰
- C. 清肝泻火,祛瘀解毒
- D. 益气养阴,软坚散结
- E. 疏肝解郁,化痰软坚

108. 其首选方剂是

- A. 四海舒郁丸
- B. 逍遥散
- C. 柴胡疏肝散
- D. 四七汤
- E. 逍遥散合海藻玉壶汤

(109~111 题共用题干)

患儿,男。右下肢出现局限性柔软肿块,局部色泽鲜红,触之如海绵状,大小不一,边界不清,不痛不痒,伴五心烦热,面赤口渴,尿黄便干,易口舌生疮。舌质红,苔薄黄,脉细数。

109. 诊断为

- A. 脂瘤
- B. 血管瘤
- C. 血瘤
- D. 肉瘤
- E. 脂肪瘤

110. 其首选方剂是

- A. 五味消毒饮合化坚二陈丸
- B. 阳和汤
- C. 顺气归脾丸
- D. 芩连二母丸合凉血地黄汤
- E. 丹栀逍遥散合清肝芦荟丸

111. 该病的治则是

- A. 健脾益气,化湿解毒
- B. 温阳散寒,化痰散结
- C. 清心泻火,凉血解毒
- D. 清肝泻火,祛瘀解毒
- E. 清热解毒,化痰散瘀

(112~114 题共用题干)

患者,男,31岁。突发剑突下疼痛,6小时后疼痛转移到右下腹,恶心纳差,轻度发热。右下腹有压痛,无反跳痛,舌苔白腻,脉弦滑。

112. 根据题干分析, 该证型首选方剂是

- A. 复方大柴胡汤
- B. 阑尾化瘀汤
- C. 藿香正气散加减
- D. 大承气汤加减
- E. 大黄牡丹汤合红藤煎

113. 根据题目分析, 其治则是

- A. 行气活血, 通腑泄热
- B. 通腑泻热, 利湿透脓
- C. 通腑排脓, 养阴清热
- D. 温阳散寒, 活血通络
- E. 清热利湿, 解毒活血

114. 根据题干分析, 关于该病的外治法说法正确的是

- A. 无论脓已成或未成, 均可选用金黄散、玉露散或双柏散
- B. 脓未成者可选用冲和膏、红灵丹油膏外敷
- C. 早期直接采取手术治疗
- D. 用 6%~8% 的明矾溶液注射入直肠黏膜下层
- E. 以上说法均属于正确

四、B1 型选择题 (115~150 题)

(答题说明: 以下提供若干组考题, 每组考题共用在前列出的 A、B、C、D、E 五个备选答案, 请从中选择一个与问题最密切的答案, 某一个备选答案可能被选择一次、多次或不被选择。)

(115~116 题共用备选答案)

- A. 痛经
- B. 带下过少
- C. 胎动不安
- D. 子晕
- E. 滑胎

115. 肝气郁结, 血为气滞, 冲任不畅, 可发生

116. 肝阴不足, 肝阳偏亢, 可发生

(117~118 题共用备选答案)

- A. 归脾丸
- B. 大补阴丸
- C. 四君子汤

D. 大补元煎

E. 补中益气汤

117. 气虚型阴挺首选

118. 肾虚型阴挺首选

(119~120 题共用备选答案)

- A. 胎元饮
- B. 寿胎丸
- C. 温土毓麟汤
- D. 长胎白术散
- E. 四君子汤

119. 气血虚弱胎萎不长的首选方是

120. 血寒宫冷胎萎不长的首选方是

(121~122 题共用备选答案)

- A. 补肾祛瘀方
- B. 桂枝茯苓丸
- C. 香棱丸
- D. 大黄牡丹汤
- E. 桃核承气汤

121. 气滞血瘀癥瘕的首选方是

122. 湿热瘀阻癥瘕的首选方是

(123~124 题共用备选答案)

- A. 脾
- B. 肝
- C. 肺
- D. 大肠
- E. 肾

123. 感冒夹滞的病位在肺和

124. 感冒夹惊的病位在肺和

(125~126 题共用备选答案)

- A. 黄芪桂枝五物汤
- B. 生脉散
- C. 玉屏风散合牡蛎散
- D. 清营汤
- E. 桂枝汤

125. 治疗肺卫不固型汗证的首选方为

126. 治疗营卫失调型汗证的首选方为

(127~128 题共用备选答案)

- A. 虚证
- B. 实证

- C. 寒证
D. 热证
E. 虚实夹杂证
127. 紫癜起病急, 病程短, 紫癜颜色鲜明者辨证属
128. 紫癜起病缓, 病程长, 紫癜颜色暗淡者辨证属
(129~130 题共用备选答案)
A. 厌恶进食, 多食饱胀, 精神尚可
B. 不欲饮食, 脘腹胀满, 烦躁多啼
C. 不思进食, 食而不化, 形瘦肢倦
D. 不思进食, 食少饮多, 便干烦躁
E. 食欲不振, 大便稀溏, 完谷不化
129. 厌食脾胃气虚证证见
130. 厌食脾胃阴虚证证见
(131~132 题共用备选答案)
A. 热肿
B. 寒肿
C. 风肿
D. 湿肿
E. 痰肿
131. 发病急骤, 漫肿宣浮的是
132. 皮肉重垂胀急, 深按凹陷的是
(133~134 题共用备选答案)
A. 内发丹毒
B. 赤游风
C. 流火
D. 抱头火丹
E. 类丹毒
133. 患者躯干部皮肤突然发红成片, 色如丹涂的急性感染性疾病称
134. 患者头面部皮肤突然发红成片, 色如涂丹的急性感染性疾病称
(135~136 题共用备选答案)
A. 脓疱疮
B. 疥疮
C. 蛇串疮
D. 湿疮
E. 以上均不是
135. 侧腰部皮肤有成簇状的丘疱疹, 呈带状分布, 疼痛剧烈。应诊断为
136. 皮损对称分布, 多形损害, 剧烈瘙痒, 易转为慢性。应诊断为
(137~138 题共用备选答案)
A. 三金排石汤加减
B. 八正散加减
C. 知柏地黄汤加减
D. 济生肾气丸加减
E. 金铃子散合石苇散加减
137. 尿石症之气血瘀滞证的主治方剂是
138. 尿石症之肾气不足证的主治方剂是
(139~140 题共用备选答案)
A. 体液传播
B. 土壤传播
C. 飞沫传播
D. 水、食物、苍蝇传播
E. 蚊虫传播
139. 流感传播途径主要是
140. 流脑传播途径主要是
(141~142 题共用备选答案)
A. 病程超过 2 周
B. 病程超过 1 月
C. 病程超过 2 月
D. 病程超过半年
E. 病程超过 1 年
141. 慢性肝炎
142. 慢性菌痢
(143~144 题共用备选答案)
A. 发热, 腹痛, 腹泻, 洗肉水样大便
B. 发热, 腹痛, 腹泻, 脓血便, 里急后重
C. 腹泻, 呕吐, 水样大便
D. 发热, 腹痛, 腹泻, 水样大便
E. 低热, 腹痛, 腹泻, 果酱样大便
143. 急性菌痢典型表现为
144. 霍乱典型表现为
(145~146 题共用备选答案)
A. 超声波
B. 洗手

- C. 碘类消毒
D. 电离辐射
E. 紫外线
145. 属高效消毒法的是
146. 属灭菌法的是
(147~148 题共用备选答案)
A. 严谨细致
B. 紧张有序
C. 及时准确
D. 依靠科学
E. 预防为主
147. 属于突发公共卫生事件应急工作方针的是
148. 属于突发公共卫生事件应急工作原则的是
(149~150 题共用备选答案)
A. 以人为本, 践行宗旨
B. 遵纪守法, 依法执业
C. 尊重患者, 关爱生命
D. 廉洁自律, 恪守医德
E. 优质服务, 医患和谐
149. 弘扬高尚医德, 严格自律, 不索取和非法收受患者财物所属的行为规范范畴是
150. 坚持救死扶伤、防病治病的宗旨, 以病人为中心, 全心全意为人民健康服务所属的行为规范范畴是