

诊断学基础

习题课

1、大量腹水而肝、脾难以触及时最适用

- A. 浅部触诊
- B. 深部滑行触诊
- C. 双手触诊
- D. 深压触诊
- E. 冲击触诊

2、肺部叩诊呈过清音的是

- A. 肺气肿
- B. 大量胸腔积液
- C. 气胸
- D. 支气管肺炎
- E. 肺不张

3、叩诊移动性浊音阳性，腹水量至少是

- A. 100ml
- B. 300ml
- C. 500ml
- D. 1000ml
- E. 3000ml

4、下列各项除哪项外视诊能观察到全身一般状态和许多全身或局部的体征

- A. 发育营养
- B. 年龄
- C. 肝大
- D. 表情
- E. 体位及步态

5、面色潮红，兴奋不安，口唇干燥，呼吸急促，表情痛苦，有时鼻翼扇动，口唇疱疹见于

- A. 急性热病面容
- B. 慢性病面容
- C. 苦笑面容
- D. 伤寒面容
- E. 二尖瓣面容

6、肺炎链球菌性肺炎患者可见面容为

- A. 苦笑面容
- B. 急性热病面容
- C. 无欲貌
- D. 面具面容
- E. 满月面容

7、患者因病不能自行调节自己的体位，属于

- A. 自动体位
- B. 被动体位
- C. 翻转体位
- D. 强迫体位
- E. 以上都不是

8、震颤麻痹患者常采取的步态是

- A. 醉酒步态
- B. 步态稳健
- C. 慌张步态
- D. 跨阈步态
- E. 共济失调步态

9、关于紫癜下列说法正确的是

- A. 皮下出血直径在 $<2\text{ mm}$
- B. 皮下出血直径在 $>3\text{ mm}$
- C. 皮下出血直径在 $3\sim 5\text{ mm}$
- D. 皮下出血直径 $>5\text{ mm}$
- E. 片状出血并伴有皮肤显著隆起

10、下列各项对蜘蛛痣有诊断意义的是

- A. 肝硬化
- B. 麻疹
- C. 猩红热
- D. 伤寒
- E. 药物过敏

11、关于扁桃体肿大，叙述正确的是

- A. I度肿大为刚超过咽腭弓
- B. II度肿大为达到中线
- C. 扁桃体肿大共分四度
- D. 超过咽腭弓而未达到中线是III度肿大
- E. 达到并超过中线为扁桃体III度肿大

12、下列各项对蜘蛛痣有诊断意义的是

- A. 肝硬化
- B. 麻疹
- C. 猩红热
- D. 伤寒
- E. 药物过敏

13、以下不引起颈静脉怒张的疾病是

- A. 左心功能不全
- B. 右心衰竭
- C. 缩窄性心包炎
- D. 上腔静脉梗阻
- E. 心包积液

14、下列疾病，常使气管推向健侧的是

- A. 胸膜粘连
- B. 支气管肺炎
- C. 大量胸腔积液
- D. 肺不张
- E. 肺硬化

15、胸骨明显压痛或叩击痛常见的疾病是

- A. 上呼吸道感染

- B. 肺炎
- C. 慢性支气管炎
- D. 肺结核
- E. 白血病

16、乳腺皮肤呈“橘皮样”改变，乳头有血性分泌物提示

- A. 乳腺炎
- B. 乳腺增生
- C. 乳腺萎缩
- D. 乳腺癌
- E. 乳腺囊肿

17、可出现上腹部明显胃蠕动波的是

- A. 幽门梗阻
- B. 胰头癌
- C. 急性胃炎
- D. 慢性胃炎
- E. 贲门癌

18、库瓦济埃征阳性可见于

- A. 胰头癌
- B. 急性阑尾炎
- C. 急性肠炎
- D. 腹膜炎
- E. 急性胆囊炎

19、腹部触诊出现反跳痛，提示的病变是

- A. 肠梗阻
- B. 腹膜壁层有炎症
- C. 腹部脏器有炎症
- D. 胃肠痉挛
- E. 肠系膜动脉栓塞

20、自肺开始叩诊肝脏相对浊音界时其叩诊音应是

- A. 由清音转为鼓音
- B. 由清音转为浊音
- C. 由清音转为实音
- D. 由过清音转为实音
- E. 由浊音变为实音

21、胸腔大量积气患者触觉语颤表现的是

- A. 增强
- B. 减弱或消失
- C. 稍增强
- D. 正常
- E. 无变化

22、在肺部叩出实音见于

- A. 气胸
- B. 胸腔积液
- C. 腹腔内脏下垂

D. 肺气肿

E. 肺空洞

23、常人支气管呼吸音可听到的部位为

A. 左锁骨上窝

B. 右锁骨上窝

C. 胸骨角周围

D. 胸骨上窝

E. 肩胛间区

24、方颅可见于

A. 先天性梅毒

B. 呆小症

C. 小儿营养不良

D. 脑积水

E. 脑膜炎

25、可见匙状甲的疾病是

A. 支气管扩张症

B. 发绀型先天性心脏病

C. 肝硬化

D. 支气管扩张

E. 缺铁性贫血

26、心包摩擦音和胸膜摩擦音的鉴别要点是

A. 有无心脏病史

B. 呼吸是否增快

C. 改变体位后摩擦音是否消失

D. 咳嗽后摩擦音是否消失

E. 屏住呼吸后摩擦音是否消失

27、患者，28岁。腹痛9小时。饱食后重体力劳动1小时开始出现腹部阵发性绞痛，伴呕吐，呕吐后腹痛稍减轻，无排气排便。查体：腹部膨隆，脐周明显压痛，无反跳痛，无肌紧张，肠鸣音亢进，移动性浊音(-)，X线腹透可见阶梯状含气液平面。临床最可能的诊断是

A. 胃肠穿孔

B. 急性胰腺炎

C. 机械性肠梗阻

D. 麻痹型肠梗阻

E. 急性胆囊炎

28、腹部叩诊鼓音范围缩小见于

A. 肝、脾极度肿大

B. 胃肠穿孔

C. 肠梗阻

D. 胃肠高度胀气

E. 人工气腹

29、肝硬化腹水的腹部外形常呈

A. 舟状腹

B. 尖腹

C. 气腹

- D. 蛙腹
- E. 球状腹

(30~31 题共用选项)

- A. 氨味
- B. 腥臭味
- C. 血腥味
- D. 刺激性蒜味
- E. 烂苹果味

30、糖尿病酮症酸中毒患者可出现的呼气味是

31、尿毒症患者可出现的呼气味是

(32~33 题共用选项)

- A. 颈部淋巴结
- B. 右锁骨上窝淋巴结
- C. 腋下淋巴结
- D. 左锁骨上窝淋巴结
- E. 腹股沟淋巴结

32、胃癌出现淋巴结转移常见的部位是

33、肺癌出现淋巴结转移常见的部位是

34、判断成年女性贫血的血红蛋白含量应低于

- A. 120 g/L
- B. 115 g/L
- C. 105 g/L
- D. 100 g/L
- E. 90 g/L

35、嗜酸性粒细胞增多见于

- A. 副伤寒
- B. 感染早期
- C. 寄生虫疾病
- D. 应用肾上腺皮质激素
- E. X线照射后

36、作为诊断痛风主要依据的试验是

- A. 内生肌酐清除率测定
- B. 昼夜尿比重试验
- C. 微球蛋白测定
- D. 血尿酸测定
- E. 血清尿素氮测定

37、引起尿淀粉酶明显增高的疾病是

- A. 急性胆囊炎
- B. 胰腺癌
- C. 流行性腮腺炎
- D. 急性胃肠炎
- E. 急性胰腺炎

38、由于维生素 B<sub>12</sub> 缺乏所引起的贫血是

- A. 缺铁性贫血

- B. 巨幼细胞贫血
- C. 再生障碍性贫血
- D. 溶血性贫血
- E. 失血性贫血

39、出现小细胞低色素性贫血的是

- A. 缺铁性贫血
- B. 巨幼细胞贫血
- C. 失血性贫血
- D. 溶血性贫血
- E. 再生障碍性贫血

40、提示病毒复制，传染性强，且可转为慢性乙型肝炎的指标是

- A. HBsAg
- B. HBeAg
- C. HBcAg
- D. 抗-HBs
- E. 抗-HB41、下列各项，属于保护性抗体的是

- A. 抗-HBc-IgA 阳性
- B. 抗-HBs 阳性
- C. 抗-HBe 阳性
- D. 抗-HBc-IgG 阳性
- E. 抗-HBc-IgM 阳性

42、表现为稽留热，肥达反应阳性的疾病是

- A. 风湿热
- B. 伤寒
- C. 艾滋病
- D. 梅毒
- E. 肾综合征出血热

43、下列关于内生肌酐清除率的叙述，正确的是

- A. 高于 80 mL/min 提示预后不良
- B. 肾功能严重损害时，开始升高
- C. 肾功能损害愈重，其清除率愈低
- D. 肾功能损害愈重，其清除率愈高
- E. 其测定与肾功能损害程度无关

44、正常人尿中出现的管型是

- A. 细胞管型
- B. 颗粒管型
- C. 透明管型
- D. 蜡样管型
- E. 脂肪管型

45、渗出液的特点是

- A. 外观淡黄色
- B. 不能自凝
- C. 比重小于 1.0
- D. 黏蛋白定性阳性

E. 无致病菌

46、常用于肝细胞癌和滋养细胞癌诊断的实验室检查是

- A. 血清甲胎蛋白 (AFP)
- B. 癌胚抗原 (CEA)
- C. 血清癌抗原 125 (CA125)
- D. 血清前列腺特异抗原 (PSA)
- E. 糖链抗原 19-9 (CA19-9)

47、常用于诊断结肠癌的实验室项目是

- A. AFP
- B. 癌胚抗原
- C. CA19-9
- D. PSA
- E. CA1

48、脑脊液外观呈毛玻璃样混浊的疾病是

- A. 结核性脑膜炎
- B. 化脓性脑膜炎
- C. 病毒性脑膜炎
- D. 蛛网膜下腔出血
- E. 流行性乙型脑炎

49、腹泻患者，粪便以黏液和脓血为主，镜检发现大量白细胞。最可能的诊断是

- A. 急性胃肠炎
- B. 阿米巴痢疾
- C. 细菌性痢疾
- D. 急性阑尾炎
- E. 甲状腺功能亢进

50、下列疾病出现粪便隐血试验持续性阳性的是

- A. 胃溃疡
- B. 十二指肠溃疡
- C. 消化道癌症
- D. 阻塞性黄疸
- E. 慢性肠炎

51、尿沉渣镜检每高倍视野多少个白细胞即视为异常

- A. >10 个
- B. >8 个
- C. >5 个
- D. >3 个
- E. >1 个

52、前间壁心肌梗死特征性心电图改变的是

- A.  $V_1$ 、 $V_2$ 、 $V_3$
- B.  $V_1$ 、 $V_2$ 、 $V_3$ 、 $V_4$ 、 $V_5$
- C.  $V_3$ 、 $V_4$ 、 $V_5$
- D. II、III、aVF
- E.  $V_5$ 、I、aVL

53、心电图检查中代表心室除极、复极时间的是

- A. S-T 段
- B. T-P 段
- C. QRS 波群
- D. Q-T 间期
- E. P-R 间期

54、典型心绞痛发作时，心电图的改变是

- A. P 波高尖
- B. 异常 Q 波
- C. ST 段水平压低 0.1mV 以上
- D. P-R 间期延长
- E. 完全性右束支传导阻滞

55、引起心电图 ST 段上抬超过正常范围且弓背向上的疾病是

- A. 急性心肌梗死
- B. 急性心包炎
- C. 陈旧性心肌梗死
- D. 慢性心包炎
- E. 心室肥厚

56、下列描述，不属于房颤的心电图特点的是

- A. P 波消失，代之以一系列大小、形态及间距不等的 f 波
- B. f 波频率 250~350 次/分
- C. RR 间期绝对不规则
- D. QRS 波群与窦性 QRS 波群相同
- E. 伴三度房室传导阻滞时，心室率可规整

57、下列描述，不属于高钾血症的心电图特点的是

- A. ST 段下降  $\geq 0.05\text{mv}$
- B. 出现“帐篷状” T 波
- C. U 波增高
- D. 可出现房室传导阻滞
- E. 可出现 QRS 波增宽、振幅下降

58、胃溃疡的主要 X 线表现是

- A. 黏膜破坏
- B. 黏膜中断
- C. 龛影
- D. 充盈缺损
- E. 痉挛性切迹

59、急性肺脓肿的典型 X 线表现是

- A. 两上肺多发纤维空洞，周围纤维索条，斑片状密度较高阴影
- B. 中下野大团片状致密阴影内见液平呈厚壁空洞
- C. 肺野边缘部可见甚细的薄壁空洞
- D. 团块边缘有毛刺或呈分叶状，中心有空洞，内壁不光整，有结节
- E. 大片状密度均匀、边缘模糊阴影

60、脑血管疾病的影像检查方法目前最常用的是

- A. 头颅平片
- B. 体层摄影



