

---

终极押题卷临床执业第四单元

A1/A2 型选择题

0. 早期妊娠的确诊依据是

- A. 停经史
- B. 早孕反应
- C. 尿妊娠试验
- D. 黑加征
- E. B 型超声检查

答案:E

解析:B 型超声检查是诊断早期妊娠快速、准确的方法。超声最早确定妊娠的依据是妊娠囊。在增大的子宫轮廓内,见到圆形或椭圆形光环,边界清楚,其内为无回声区。妊娠五周时通过超声可显现出妊娠囊的影像,在囊内可见到有节律的胎心搏动,可确诊为早期妊娠,选项 E 正确。停经史不是妊娠的特有症状,产后哺乳期也可能有停经现象,选项 A 不正确。停经 6 周左右出现头晕乏力、食欲不振、喜食酸物或厌油腻、恶心、晨起呕吐等一系列症状,称为早孕反应,消化系统疾病也可引起恶心呕吐等症状,所以早孕反应不是妊娠的特有症状,选项 B 不正确。尿妊娠试验有可能出现假阳性或假阴性,确诊早孕不应单纯依靠尿妊娠试验阳性,选项 C 不正确。黑加征出现在妊娠 6~7 周,在第 8 周后消失,不能做为诊断早期妊娠的准确依据,选项 D 不正确。

标签:

记忆

精华

简单

1. 确定胎儿安危最简便的方法是

- A. 催产素激惹试验
- B. 胎动计数
- C. 尿雌三醇测定
- D. 胎儿电子监护
- E. 羊膜镜检查

答案:B

解析:通过胎动计数,可了解胎儿在宫内的安危,若胎动计数 $>30$ 次/12 小时为正常, $<10$ 次/12 小时,提示胎儿缺氧。

标签:

记忆

精华

简单

2. 了解胎儿成熟度最常用的检查项目是

- A. 检测羊水中卵磷脂/鞘磷脂比值
- B. 检测羊水中肌酐值
- C. 检测羊水中胆红素类物质
- D. 检测羊水中淀粉酶值
- E. B 型超声检查胎儿双顶径值

答案:E

解析:B 型超声检查胎儿双顶径值  $> 8.5\text{cm}$ , 提示胎儿成熟, 大脑成熟真正意义上表明胎儿已成熟, 选项 E 正确。检测羊水中卵磷脂/鞘磷脂比值, 该值大于 2 仅提示胎儿肺成熟, 选项 A 不正确。检测羊水中肌酐值主要监测胎儿肾成熟度, 不能全面反映胎儿成熟情况, 选项 B 不正确。检测羊水中胆红素类物质监测胎儿肝成熟度, 选项 C 不正确。检测羊水中淀粉酶值反应胎儿唾液腺成熟度, 选项 D 不正确。

标签:

精华

困难

理解

3. 孕妇尿中与胎儿胎盘单位功能关系密切的激素是

- A. 雌酮
- B. 雌二醇
- C. 雌三醇
- D. 孕酮
- E. 睾酮

答案:C

解析:测定孕妇尿中雌三醇值, 24h 尿  $> 15\text{mg}$  为正常值,  $10\sim 15\text{mg}$  为警戒值,  $< 10\text{mg}$  为危险值。于妊娠晚期多次得尿中 E3 值  $< 10\text{mg}$ , 表示胎盘功能低下。选项 C 正确。其他选项不能用来测定胎盘功能, 选项 A、B、D、E 不正确。

标签:

记忆

精华

困难

4. 造成宫颈粘液涂片干后镜下见羊齿状结晶的激素是

- A. 雌激素
- B. 孕激素
- C. 雄激素
- D. 催乳激素
- E. 甲状腺素

答案:A

解析:雌激素可刺激分泌细胞的分泌功能,随着雌激素水平不断提高,至排卵期粘液分泌量增加,粘液稀薄、透明,拉丝度可达 10cm 以上。若将粘液作涂片检查,干燥后可见羊齿状结晶,这种结晶在月经周期第 6~7 日开始出现,到排卵期最为清晰而典型,选项 A 正确。孕激素造成宫颈粘液涂片干后镜下见椭圆体,选项 B 不正确。雄激素、催乳激素、甲状腺素不参与宫颈粘液的周期变化,选项 C、D、E 不正确。

标签:

记忆

中等

5. 子宫脱垂患者,宫颈及部分宫体脱出阴道口,应属

- A. I 度轻
- B. I 度重
- C. II 度轻
- D. II 度重
- E. III 度

答案:D

解析:以患者平卧用力向下屏气时子宫下降的最低点为分度标准。(将子宫脱垂分为 3 度:(I 度 轻型:宫颈外口距处女膜缘 < 4cm,未达处女膜;重型:宫颈外口已达处女膜缘,在阴道口可见到宫颈。)(II 度 轻型:宫颈已脱出阴道口外,宫体仍在阴道内;重型:宫颈及部分宫体已脱出于阴道口外。)(III 度 宫颈及宫体全部脱出至阴道口外。

标签:

记忆

精华

简单

6. 分娩中协助胎先露在盆腔中内旋转的肌肉是

- A. 子宫平滑肌
- B. 会阴浅横肌
- C. 会阴深横肌
- D. 肛门括约肌
- E. 盆底肛提肌

答案:E

解析:胎儿围绕骨盆纵轴旋转,使其矢状缝与中骨盆及骨盆出口前后径相一致的动作成为内旋转。内旋转从中骨盆开始至骨盆出口平面完成,以适应中骨盆及骨盆出口前后径大于横径的特点,有利于胎头下降。以枕左前位为例,枕先露时,胎头枕部到达骨盆底位置最低,盆底肛提肌收缩力将胎头在枕部推向阻力小、部位宽的前方,枕左前位的胎头向前旋转 45°。胎头向前向中

线旋转 45°时，后凶转至耻骨弓下。胎头于第一产程末完成内旋转动作。选项 E 正确。其他选项与内旋转无关，故选项 A、B、C、D 不正确。

标签：

中等

理解

7. 新生儿娩出后首先应

- A. 断脐
- B. 擦洗新生儿面部
- C. 清理呼吸道
- D. 刺激新生儿足部
- E. 抓紧娩出胎盘及胎膜

答案:C

解析:对于新生儿的处理步骤如下: 1 清理呼吸道, 以免发生吸入性肺炎, 当确认呼吸道通畅但未啼哭时, 可用手轻拍新生儿足底。新生儿大声啼哭后即可处理脐带。2 处理脐带 3 阿普加评分 4 擦洗新生儿。这些完成后, 再协助胎盘娩出。选项 C 正确。其它选项都在清理呼吸道后完成, 选项 A、B、D、E 不正确。

标签：

记忆

精华

简单

8. 哺乳期妇女避孕应在产后

- A. 6 周
- B. 12 周
- C. 18 周
- D. 24 周
- E. 30 周

答案:A

解析:考核产后避孕特点。产褥期内禁止性交, 于产后 42 日内起应采取避孕措施, 原则是哺乳者应以工具避孕为宜, 不哺乳者可以选用药物避孕。产褥期六周, 产褥期禁止性生活。

标签：

记忆

精华

简单

9. 妊娠高血压综合征的基本病变为

- A. 肾素-血管紧张素-前列腺素系统平衡失调
- B. 慢性弥散性血管内凝血

- C. 血液高度浓缩
- D. 水钠严重潴留
- E. 全身小动脉痉挛

答案:E

解析:妊娠高血压综合征的基本病理生理变化是全身小动脉痉挛,选项 E 正确。肾素-血管紧张素-前列腺素系统平衡失调、慢性弥散性血管内凝血、血液高度浓缩水、钠严重潴留都是在全身小动脉痉挛这个基本病理生理变化上发生的,选项 A、B、C、D 不正确。

标签:

记忆

精华

简单

10. 与前置胎盘的发生无关的是

- A. 妊娠高血压综合征
- B. 双胎妊娠
- C. 多次刮宫
- D. 胎盘面积过大
- E. 受精卵滋养层发育迟缓

答案:A

解析:妊娠高血压综合征不会导致前置胎盘,选项 A 正确。前置胎盘病因可能与以下因素有关:1 子宫内膜病变或损伤 2 胎盘面积过大 3 胎盘异常 4 受精卵滋养层发育迟缓,选项 B、C、D、E 不正确。

标签:

记忆

简单

11. 羊水过少是指妊娠晚期羊水量少于

- A. 500ml
- B. 400ml
- C. 300ml
- D. 200ml
- E. 100ml

答案:C

解析:妊娠晚期羊水量少于 300ml 者,称为羊水过少。选项 C 正确,选项 A、B、D、E 不正确。

标签:

超纲

记忆

简单

12. 抢救羊水栓塞的首要措施是

- A. 纠正 DIC 及继发纤溶
- B. 纠正呼吸循环衰竭
- C. 纠正肾功衰竭
- D. 立即终止妊娠
- E. 切除子宫

答案:B

解析:羊水栓塞发生时,可引起急性呼吸循环衰竭,致命。一旦出现羊水栓塞应立即进行抢救,重点是针对过敏和急性肺动脉高压所致低氧血症及急性呼吸循环衰竭,选项 B 正确。其他选项是在纠正呼吸循环衰竭后所做的措施,选项 A、C、D、E 不正确。

标签:

记忆  
精华  
简单

13. 属于癌前病变的外阴白色病变是

- A. 增生型营养不良
- B. 硬化苔癣型营养不良
- C. 混合型营养不良
- D. 营养不良伴有上皮不典型增生
- E. 白癜风

答案:D

解析:增生性营养不良主要症状为外阴奇痒难忍。病变主要发生在大阴唇及阴唇沟内,有时波及肛门周围,皮肤颜色成暗红色,夹杂有白斑,成花斑样。同时病区皮肤增厚,似皮革,隆起有皱襞,或有鳞屑、湿疹样变,选项 A 不正确。硬化苔癣型营养不良可发生在任何年龄,主要症状是病损部位发痒。病变可侵犯阴蒂、大小阴唇、后联合、肛门周围。开始为小白点丘疹,边界不整齐,表面平坦,而后逐渐溶合成白色花斑。进一步发展,病区皮肤菲薄皱缩似卷烟纸,形成整个外阴萎缩,阴道口挛缩狭窄,出现性交困难。幼女患此病者多在大、小便后感外阴和肛周不适,一般至青春期时,病变自行消失,选项 B 不正确。混合型混合型外阴营养不良是上述两种类型的混合,可见外阴萎缩,并伴有隆起的白色斑片,选项 C 不正确。外阴白色病变伴不典型增生,不典型增生无特殊的临床表现,诊断主要依靠局部活体组织检查。如在外阴局部出现溃疡,或界限清楚的白色隆起,在该处活检发现非典型增生,其癌变可能性较大,选项 D 正确。选项 E 为干扰选项。

标签:

超纲  
中等

理解

14. 外阴硬化苔癣型营养不良的治疗，目前不主张采用的方法是

- A. 口服脱敏药物
- B. 手术治疗
- C. 禁用刺激性药物擦洗
- D. 激光治疗
- E. 局部用药

答案:B

解析:外阴硬化苔癣型营养不良恶变机会极少，故很少采用手术治疗。选项 B 正确。外阴硬化苔癣型营养不良的治疗原则：1 一般治疗 2 药物治疗 3 局部用药 4 激光治疗。选项 A、C、D、E 不正确。

标签:

超纲

记忆

精华

中等

15. 滴虫阴道炎的白带性状呈

- A. 稠厚豆渣样
- B. 血性
- C. 脓性
- D. 稀薄泡沫状
- E. 白色均匀稀薄

答案:D

解析:滴虫阴道炎的白带性状呈稀薄脓性、黄绿色、泡沫状、有臭味，选项 D 正确。外阴阴道假丝酵母菌病的白带性状是稠厚豆渣样，选项 A 不正确。老年阴道炎严重感染时呈脓血性，选项 B、C 不正确。细菌性阴道炎白带性状呈白色均匀稀薄，选项 E 不正确。

标签:

记忆

精华

简单

16. 滴虫阴道炎的治愈标准是

- A. 临床症状消失
- B. 局部用药 3 个疗程
- C. 连续 3 次月经后检查滴虫阴性
- D. 连续 3 次月经前检查滴虫阴性
- E. 治疗后悬滴法检查滴虫阴性

答案:C

解析:滴虫性阴道炎常于月经后复发,故治疗后应连续 3 次在月经干净后复查白带,均为阴性才可称为治愈。选项 C 正确。临床症状消失、局部用药 3 个疗程、连续 3 次月经前检查滴虫阴性、治疗后悬滴法检查滴虫阴性都不能作为治愈标准,选项 A、B、D、E 不正确。

标签:

记忆

精华

简单

17. 老年性阴道炎的治疗可在阴道内放置少量

- A. 孕激素
- B. 雌激素
- C. 雄激素
- D. 糖皮质激素
- E. 促性腺激素

答案:B

解析:老年性阴道炎的治疗原则:1 抑制细菌生长:用酸性洗液冲洗,再用抗生素局部用药。2 增加阴道抵抗力:给予雌激素制剂局部给药或全身用药。选项 B 正确。其他选项无治疗效果,选项 A、C、D、E 不正确。

标签:

记忆

精华

简单

18. 女性生殖器结核的病理变化,正确的是

- A. 输卵管结核多为双侧性,由子宫内膜结核蔓延而来
- B. 卵巢结核通常是卵巢深部形成结节和干酪样坏死
- C. 子宫内膜结核可使子宫腔粘连、变形、缩小
- D. 宫颈结核在生殖道结核中最常见
- E. 盆腔腹膜结核分粘连型和渗出型,粘连型不易形成瘘管

答案:C

解析:子宫内膜结核早期病变出现在宫腔两侧角,子宫大小,形状无明显变化,随着病情发展,子宫内膜受到不同程度结核病变破坏,最后代以瘢痕组织,可是宫腔粘连变形、缩小。选项 C 正确。子宫内膜结核由输卵管结核蔓延而来,选项 A 不正确。少部分卵巢结核是由血循环传播而致,可在卵巢深部形成结节和干酪样坏死,选项 B 不正确。输卵管结核在生殖道结核中最常见,选项 D 不正确。粘连型盆腔腹膜结核,粘连间的组织常发生干酪样坏死,易形成瘘管,选项 E 不正确。

标签:

记忆

中等

19. 淋病的临床表现，正确的是

- A. 急性淋病在淋菌侵入 14 天后发病
- B. 急性淋病包括上生殖道和下生殖道感染
- C. 上生殖道感染半数通过血行传播
- D. 妇女感染淋病后多无症状
- E. 急性淋菌性盆腔炎多在月经期或经后 1 周内发病

答案:E

解析:淋菌感染引起的盆腔炎，多在月经期或经后 1 周内发病，选项 E 正确。淋菌感染潜伏期为 1~14 天，选项 A 不正确。急性淋病不包括上生殖道和下生殖道感染，选项 B 不正确。淋病传染主要通过性接触传播，选项 C 不正确。60%妇女感染淋病后无症状或症状轻微，选项 D 不正确。

标签:

记忆

中等

20. 新生儿期保健的重点时间是

- A. 生后 1 小时内
- B. 生后 1 天内
- C. 生后 3 天内
- D. 生后 1 周内
- E. 生后 2 周内

答案:D

解析:新生儿期发病率及死亡率高，尤以早期新生儿(第一周新生儿)最高，应加强护理，注意保暖，细心喂养，预防各种感染。

标签:

记忆

简单

21. 智力发展的关键期在

- A. 3 岁前
- B. 4 岁前
- C. 5 岁前
- D. 6 岁前
- E. 7 岁前

答案:E

解析:7 岁前小儿脑的发育基本完成，智力发育很快，早期教育智力开发至关重要，可塑性很强。

标签:

22. 幼儿期年龄的划分应是

- A. 出生到 1 岁
- B. 出生到 2 岁
- C. 1~3 岁
- D. 1~4 岁
- E. 2~4 岁

答案:C

解析:幼儿期是 1 周岁后至满 3 周岁之前,同时通过此题要掌握小儿年龄分期:①胎儿期:受孕到分娩,约 40 周(280 天);②新生儿期:出生后脐带结扎开始到足 28 天;③婴儿期(又称乳儿期):出生后到满 1 周岁;④幼儿期:1 周岁后到满 3 周岁;⑤学龄前期:3 周岁后到 6~7 周岁;⑥学龄期:从入学起(6~7 岁)到青春期(13~14 岁)开始之前;⑦青春期:女孩从 11、12 岁到 17、18 岁,男孩从 13、14 岁到 18~20 岁。

标签:

23. 死亡率最高的时期是

- A. 新生儿期
- B. 婴儿期
- C. 幼儿期
- D. 学龄前期
- E. 青春期

答案:A

解析:

标签:

24. 新生儿期的保健重点不包括

- A. 注意保温
- B. 细心喂养
- C. 加强护理
- D. 预防各种感染
- E. 预防传染病

答案:E

解析:新生儿期保健重点是:①保暖:维持新生儿体温 36.5℃,相对湿度 50%~60%。室内适中温度,必要时用热水袋、暖箱。②喂养:鼓励母乳喂养,正确哺乳方法。③加强护理:保护皮肤清洁,脐带消毒,衣服与尿布选择。④早教:练习俯卧,抬头,听优美音乐,看红色球。由于新生儿有母体内的抗体,与外界接触少,基本不患传染病。

标签:

记忆

25. 不符合小儿生长发育的一般规律的是

- A. 由上到下

- B. 由远到近
- C. 由粗到细
- D. 由低级到高级
- E. 由简单到复杂

答案:B

解析:小儿生长发育遵循由上到下、由近到远、由粗到细、由低级到高级、由简单到复杂的规律。

标签:

精华

中等

理解

26. 小儿前囟闭合的时间在

- A. 3~4 个月
- B. 4~6 个月
- C. 6~12 个月
- D. 1~1.5 岁
- E. 2.5 岁

答案:D

解析:出生时前囟大小为 1.5~2cm, 后继颅骨增大而变化, 6 个月后逐渐骨化缩小, 12~18 个月时闭合。

标签:

记忆

中等

27. 乳牙开始萌出的月龄是

- A. 3~4 个月
- B. 4~10 个月
- C. 10~12 个月
- D. 12~15 个月
- E. 15~18 个月

答案:B

解析:乳牙共 20 颗。乳牙开始萌出的月龄是 4~10 个月。

标签:

记忆

精华

28. 2 岁以内乳牙的数目为

- A. 月龄减 2~4
- B. 月龄减 4~6
- C. 月龄减 6~8

D. 月龄减 8~10

E. 月龄减 10~12

答案:B

解析:2 岁内乳牙数目约等于其月龄减 4~6

标签:

记忆

精华

29. 小儿语言发育三个阶段的顺序是

A. 发音、理解、表达

B. 理解、表达、发音

C. 表达、理解、发音

D. 听觉、发音、理解

E. 模仿、表达、理解

答案:A

解析:语言发育要经过发音、理解、表达

标签:

记忆

精华

中等

30. 小儿腕部骨化中心出全的年龄是

A. 5 岁

B. 6 岁

C. 8 岁

D. 10 岁

E. 12 岁

答案:D

解析:长骨干骺端骨化中心 10 岁时出齐,共 10 个,故 1~9 岁儿童腕部骨化中心的数目约为小儿的岁数加 1。

标签:

记忆

精华

31. 7 岁小儿,腕部骨化中心的数目为

A. 6 个

B. 7 个

C. 8 个

D. 9 个

E. 10 个

答案:C

解析:1~9 岁腕部骨化中心的数目约为小儿的岁数加 1。

标签:

应用

中等

32. 出生时新生儿的头围约为

A. 35cm

B. 34cm

C. 30cm

D. 25cm

E. 55cm

答案:B

解析:正常新生儿初生时头围约 34cm。

标签:

33. 正常儿, 已会爬, 扶着栏杆能站起来, 懂“再见”, 尚不能独站, 最可能的年龄是

A. 7 个月

B. 5 个月

C. 9 个月

D. 11 个月

E. 2 个月

答案:C

解析:已会爬, 扶着栏杆能站起来, 符合 8 个月小儿表现, 懂“再见”, 尚不能独站, 为 9 个月小儿表现, 故选 C。

标签:

精华

困难

理解

34. 小儿体格发育正常, 体重 9kg, 头围 46cm, 身高 75cm, 其胸围最可能是

A. 32cm

B. 34cm

C. 46cm

D. 48cm

E. 50cm

答案:C

解析:小儿体重 9kg, 头围 46cm, 身高 75cm 是 1 周岁。1 岁时胸围=头围 46cm。1 岁以后胸围>头围, 每年增长 1cm。

标签:

精华

中等  
理解

35. 女孩，会用勺子吃饭，能双脚跳，会翻书，会说 2~3 个字的短句。最可能的年龄是

- A. 2 岁
- B. 4 岁
- C. 1.5 岁
- D. 3.5 岁
- E. 3 岁

答案:A

解析:2 岁小儿动作语言发育:可以达到, 双脚跳, 会用勺子吃饭, 会翻书。故综合分析小儿最可能的年龄是 2 岁。

标签:

中等  
理解

36. 初种麻疹减毒活疫苗最适合的年龄是

- A. 出生后 1 周
- B. 出生后 1 个月
- C. 出生后 2~4 个月
- D. 出生后 2~6 个月
- E. 满 8 个月

答案:E

解析:小儿时期免疫特点存在双重性, 一方面体液免疫、细胞免疫不健全, 防御力差, 另一方面新生儿可通过胎盘自母体获得抗体(IgG), 故 6 个月内对一些传染病(尤其是麻疹)患病率较低, 6 个月后, 来自母体的 IgG 浓度下降, 自行合成 IgG 能力不足, 此时对麻疹易感, 故初种的年龄应在 8 个月, 只有 E 选项能满足。

标签:

精华

37. 新生儿期计划免疫应接种的疫苗是

- A. 脊髓灰质炎糖丸与百白破三联混合疫苗
- B. 卡介苗与百白破三联混合疫苗
- C. 卡介苗与乙肝疫苗
- D. 乙肝疫苗与麻疹疫苗
- E. 脊髓灰质炎糖丸与麻疹疫苗

答案:C

解析:我国婴儿期计划免疫接种的疫苗包括卡介苗、脊髓灰质炎疫苗、百白破疫苗、麻疹疫苗、乙脑疫苗、流脑疫苗、乙肝疫苗。乙肝疫苗应在出生时

接种第一针，此后1个月时和6个月时再次接种。流感疫苗不属于计划免疫内容，可自行接种，可于6个月时接种，此后按需接种。麻疹疫苗应在8个月时初种，7岁时加强。脊髓灰质炎疫苗在小儿2个月初服，3个月各复服1次。百白破疫苗应于第3个月、第4个月和第5个月时各接种1次。

标签:

记忆

中等

38. 4个月婴儿，已经完成计划免疫和预防接种包括

- A. 卡介苗、乙肝疫苗、脊髓灰质炎三价混合疫苗、百白破混合制剂
- B. 脊髓灰质炎减毒糖丸活疫苗、乙肝疫苗
- C. 百白破三联针、脊髓灰质炎三价混合疫苗、百白破混合制剂
- D. 卡介苗、脊髓灰质炎三价混合疫苗、乙肝疫苗
- E. 卡介苗、脊髓灰质炎三价混合疫苗

答案:E

解析:注意本题题干“已经完成”。(出生乙肝卡介苗, 234 骨灰, 456 百白破, 8 麻疹 (6月乙肝第三针, 18月百白破第四针)

标签:

记忆

中等

39. 小儿计划免疫实施程序中, 乙肝疫苗初种年龄是

- A. 出生时、1个月、3个月
- B. 出生时、1个月、6个月
- C. 出生时、3个月、6个月
- D. 1个月、2个月、3个月
- E. 2个月、3个月、4个月

答案:B

解析:小儿计划免疫巧记:乙肝016, 脊灰23, 百白破345, 麻疹8。

标签:

记忆

简单

40. 人工喂养的婴儿估计每日奶量的计算是根据

- A. 能量需要量
- B. 胃容量
- C. 身高
- D. 体表面积
- E. 年龄

答案:A

解析:人工喂养的婴儿估计每日奶量的计算是根据每天能量的需要量来估计

的, 如婴儿能量推荐摄入量约为  $100\text{kcal}/(\text{kg}\cdot\text{d})$  [ $418.4\text{kJ}/(\text{kg}\cdot\text{d})$ ], 配方奶粉  $100\text{g}$  供能约  $500\text{kcal}$  ( $2092\text{kJ}$ ), 故需婴儿配方奶粉  $20\text{g}/(\text{kg}\cdot\text{d})$  可满足需要。

标签:

精华

41. 小儿营养中最主要的能量来源是

- A. 矿物质
- B. 糖类
- C. 脂类
- D. 膳食纤维
- E. 蛋白质

答案:B

解析: 婴儿饮食中糖类所产的能量占总能量的  $50\%\sim 60\%$ , 蛋白质占  $8\%\sim 15\%$ , 脂肪占  $35\%\sim 50\%$ 。

标签:

42. 维生素 D 缺乏性佝偻病初期的临床表现是

- A. 免疫力低下
- B. 语言发育落后
- C. 运动减少
- D. 非特异性神经精神症状
- E. 肌肉松弛

答案:D

解析: 维生素 D 缺乏性佝偻病初期的临床表现是非特异性神经精神症状。

标签:

43. 小儿蛋白质-能量营养不良最早期的临床表现是

- A. 体重减轻
- B. 皮下脂肪消失
- C. 体重不增
- D. 肌肉松弛
- E. 身高增长停滞

答案:C

解析: 小儿蛋白质-能量营养不良最早期的临床表现是体重不增。

标签:

44. 母乳喂养适宜的断奶时间是

- A. 出生后  $4\sim 5$  个月
- B. 出生后  $6\sim 9$  个月
- C. 出生后  $10\sim 12$  个月左右
- D. 出生后  $13\sim 15$  个月
- E. 出生后 18 个月

答案:C

解析:母乳喂养的断奶时间一般于12个月左右可完全断奶。

标签:

中等

45. 母乳与牛乳相比, 营养丰富, 易于消化, 是因为母乳中

- A. 蛋白质含量高
- B. 含酪蛋白多
- C. 含白蛋白、球蛋白较多
- D. 含饱和脂肪酸多
- E. 含甲型乳糖高

答案:C

解析:母乳营养丰富, 比例适当, 易消化吸收。人乳含必需氨基酸比例适宜; 人乳中白蛋白多而酪蛋白少, 酪蛋白和乳白蛋白的比例为1:4, 与牛乳(4:1)有明显差别; 酪蛋白为 $\beta$ -酪蛋白, 含磷少, 凝块小, 易被消化吸收; 所含白蛋白为乳白蛋白, 促乳糖蛋白形成。①含不饱和脂(肪酸的脂肪较多, 供给丰富的必需脂肪酸, 有利于脑发育; 脂肪颗粒小, 又含较多解脂酶, 有利于消化吸收。乙型乳糖(B-双糖)含量丰富, 有利于脑发育; 有利于促进肠道乳酸杆菌、双歧杆菌生长, 产生B族维生素; 有利于肠蠕动; 有利于小肠钙吸收。②含微量元素如锌、铜、碘较多; 母乳铁含量虽与牛乳相似, 但其铁吸收率达49%, 而牛乳中仅4%, 故母乳喂养者缺铁性贫血发生率低。钙磷比例适宜(2:1), 易于吸收, 故较少发生佝偻病。含较多的消化酶, 如淀粉酶、乳脂酶等, 有助于食物消化。

标签:

精华

46. 重度营养不良突然死亡的原因最可能是由于

- A. 低钾血症
- B. 低钙血症
- C. 心肌变性, 心功能不全
- D. 自发性低血糖
- E. 免疫功能低下, 金黄色葡萄球菌感染

答案:D

解析:自发性低血糖可突然发生, 表现为面色灰白、神志不清、脉搏减慢、呼吸暂停、体温不升, 但一般无抽搐, 若未及时诊治, 可因呼吸麻痹而死亡。

标签:

记忆

47. 对1~2个月婴儿, 下列选项不可作为辅食的是

- A. 鲜果汁
- B. 青菜汁

- C. 米汤
- D. 代乳粉
- E. 蛋黄

答案:E

解析:过早引入固体食物影响母乳铁吸收,增加食物过敏肠道感染的机会。对于1~2个月婴儿不宜引入蛋黄作辅食。4~6个月龄的婴儿体内贮存铁消耗已尽,需补充铁营养如蛋黄等。

标签:

48. 不属于蛋白质-热能营养不良常见并发症的是

- A. 维生素A缺乏症
- B. 呼吸道感染
- C. 腹泻病
- D. 佝偻病
- E. 缺铁性贫血

答案:D

解析:蛋白质-热能营养不良常见并发症有:①营养性贫血。最多见为营养性缺铁性贫血,亦可见营养性巨幼红细胞性贫血或二者兼有。②各种维生素缺乏。常见者为维生素A缺乏,也有维生素B、C的缺乏。③感染。由于非特异性及特异性免疫功能均低下,易继发各类细菌、病毒、真菌的感染,如呼吸道感染、肠道感染、尿路感染、败血症等。特别是腹泻病,可迁延不愈加重营养不良,形成恶性循环。④自发性低血糖。可突然发生,表现为面色灰白、神志不清、脉搏减慢、呼吸暂停、体显不升但无抽搐,若不及时诊治,可至死亡。

标签:

49. 内囊出血所致的对侧肢体运动障碍(偏瘫)主要是损伤了

- A. 皮质脊髓束
- B. 皮质红核束
- C. 顶枕颞桥束
- D. 皮质核束
- E. 额桥束

答案:A

解析:本题为理解分析题。题目要求考生掌握内囊内的主要结构和各结构的功能与损伤。皮质红核束、顶枕颞桥束和额桥束属于锥体外系,因此对考生的干扰很小。某些考生对皮质脊髓束和皮质核束的管理范围掌握不好,因此错选了选项D。

标签:

50. 治疗急性面神经麻痹的有证据支持的方法是

- A. 皮质类固醇

- B. 抗病毒治疗
- C. 维生素
- D. 神经营养剂
- E. 针灸

答案:A

解析:本题考查考生在急性面神经麻痹的各种治疗中是否能选择最有证据支持的方法,学会实践循证医学。迄今唯一的证据是皮质类固醇,也被国内外指南所推荐。虽然其他治疗方法多种多样,也常被使用,但缺乏好的证据支持。

标签:

51. 吉兰-巴雷综合征少见的临床表现为

- A. 视盘水肿
- B. 双侧面神经麻痹
- C. 腱反射消失
- D. 脑脊液蛋白细胞分离现象
- E. 周围神经传导异常

答案:A

解析:本题是记忆理解题,考查考生对吉兰-巴雷综合征常见、重要的临床表现的熟悉程度。本病的重要且有诊断价值的临床表现是急性起病,四肢对称性弛缓性瘫痪;有脑神经损害,其中以双侧面神经麻痹为常见;常有脑脊液蛋白细胞分离现象以及运动神经传导速度减慢等电生理异常。这些常见临床表现就是本题迷惑性的选项 B、C、D、E。本病中存在视盘水肿,但属于少见的表现,因此正确答案为 A。不要认为视盘水肿是颅内压增高和颅内占位病变的专有临床表现。

标签:

52. 下列属于皮层复合感觉的是

- A. 痛觉
- B. 重量觉
- C. 运动觉
- D. 位置觉
- E. 触觉

答案:B

解析:本题是记忆题,考核皮层复合感觉的基本概念。感觉分为特殊感觉(视、听、嗅、味等)和一般感觉,后者又包括浅感觉(痛觉、温度觉和触觉)、深感觉(运动觉、位置觉和振动觉)以及复合感觉(实体觉、图形觉、两点辨别觉、定位觉和重量觉等)。临床上作出中央后回皮层损害的定位诊断时,皮层复合感觉损害的检查十分重要。重量觉为皮层复合感觉,因此正确答案是 B。其余选项均为迷惑选项。选项 C 运动觉和选项 D 位置觉属于深感觉。选

项 A 痛觉和选项 E 触觉属于浅感觉。

标签:

53. 节段性放射性疼痛的病损部位多位于

- A. 皮层感觉区
- B. 丘脑
- C. 三叉神经
- D. 脊髓前根
- E. 脊髓后根

答案:E

解析:本题考核感觉障碍的定位诊断原则。脊髓后根受刺激损害后出现其支配区皮肤的节段性放射性疼痛,亦称根性疼痛。正确答案为 E。迷惑性选项分别为 A、B、C、D。选项 A 皮层感觉区损害特点为皮层感觉区范围广,病变只损害其中一部分,故常表现为对侧的一个上肢或下肢分布的感觉减退或消失,其特点为复合性感觉障碍。选项 B 丘脑损害引起对侧偏身感觉减退或缺失或对侧偏身的自发性疼痛。选项 C 三叉神经损害为周围神经损害,表现为其周围支配区内的疼痛,常见为三叉神经第 1、2 支区域内疼痛,而非节段性。选项 D 脊髓前根为运动神经的组成,只影响节段性支配肌的瘫痪,而不造成疼痛等感觉障碍。

标签:

54. 脑出血后出现明显脑水肿的天数为

- A. 15~17 天
- B. 12~14 天
- C. 9~11 天
- D. 6~8 天
- E. 3~5 天

答案:E

解析:脑出血是一个十分危重的疾病,其致病原因主要是颅内的血肿及继发出现的脑水肿。所以考生必须熟知脑出血后脑水肿最明显的时间,以积极处理。指南中明确指出,脑出血后第 2 天即开始出现脑水肿,3~5 天明显,因此选项 E 为正确答案,其余均为迷惑性选项。

标签:

55. 治疗脑脊液鼻漏,以下错误的处理是

- A. 注射抗生素
- B. 鼻腔填塞
- C. 卧床休息
- D. 抬高头位
- E. 应用镇静剂

答案:B

解析:本题属于以理解记忆题,主要考核脑脊液鼻漏的治疗原则。脑脊液鼻漏多发生于颅底骨折时,其治疗要点是在急性期内预防颅内感染,争取使瘘口自行闭合;如病程迁延1个月以上,则考虑手术治疗。急性期的处理包括头高卧位防止脑脊液反流,避免诱发颅内压增高的动作及预防性应用抗生素等,切忌堵塞冲洗鼻腔。大多数考生掌握了本知识点从而选择正确答案B,选择其他选项说明对脑脊液鼻漏的治疗缺乏基本了解。

标签:

56. 下列不属于枕骨大孔疝常见症状的是

- A. 剧烈头痛、呕吐
- B. 颈项强直
- C. 早期出现一侧瞳孔散大
- D. 意识障碍
- E. 呼吸骤停发生早

答案:C

解析:本题属于理解记忆题,主要考核枕骨大孔疝的临床特点。小脑扁桃体和延髓经枕骨大孔被挤向椎管内,称为枕骨大孔疝,因脑干受压和脑脊液循环受阻,临床特点是剧烈头痛、颈项强直、反复呕吐和生命体征紊乱。意识改变和瞳孔变化出现较晚而呼吸骤停发生较早。本题中选项C(早期出现一侧瞳孔散大)是小脑幕切迹疝的临床特点,而且是它和枕骨大孔疝的鉴别点之一,因而是正确答案。其他选项中最具有迷惑性的是选项D,因在枕骨大孔疝时意识障碍发生较晚,但是在实际考试中其选择率远低于选项B与E,原因是枕骨大孔疝的临床特征没有印象。

标签:

57. 颅脑对冲伤最常见的部位是

- A. 枕叶
- B. 额颞叶
- C. 小脑
- D. 顶叶
- E. 脑干

答案:B

解析:本题属病理解剖知识题,难度适度。要求考生掌握中枢神经正常解剖与对冲性损伤的发生机制。在闭合性脑损伤中,外力作用下,由于脑和颅骨运动的速度不一致,前者落后于后者的运动,产生了局限颅内压变化,使脑被高压冲击到受力点对侧的颅腔内壁,此后又被负压吸引回到受力点同侧并与同侧颅骨相碰,从而使脑两处同时受伤。发生在受力侧的损伤称冲击伤,发生在受力对侧的损伤称对冲伤。又由于前颅窝底、中颅窝底和中颅窝侧壁的骨质凹凸不平,当受力后脑在颅腔内移位时,与这些不平骨质相互摩擦或撞击即可导致额极、额底、颞极和颞底的挫裂伤。而后颅窝、小脑幕和枕部

颅骨内壁相对光滑平缓，因此外力作用下较少出现直接或对冲性脑挫裂伤。因此选项 B 为正确答案。

标签：

58. 脊髓半横断(Brown-Sequard)综合征常见于

- A. 吉兰-巴雷综合征
- B. 急性脊髓炎
- C. 急性硬脊膜外脓肿
- D. 脊髓髓外肿瘤
- E. 脊髓空洞症

答案:D

解析:本题属记忆理解题,但难度较大。要求考生掌握脊髓传导功能、脊髓结构与毗邻关系和椎管内各种疾病的性质。选项 A 发病有感觉异常,双下肢无力并进展至躯干和上肢,应可排除。选项 B 最为常见的为横贯性脊髓炎,首先出现病变水平以下脊髓休克,感觉、运动皆丧失,故可排除。选项 C 表现为三期,有脊椎痛及神经根痛期、脊髓早期功能障碍期和完全瘫痪期,应可排除。题干为脊髓半横断综合征,系脊髓半侧局限性病变所致,最常见的病因有外伤和脊髓外硬膜下肿瘤等,故选项 D 为正确答案。选项 E 的症状呈阶段性分布,空洞水平以下传导束功能障碍,表现为感觉分离、手部及前臂小肌群萎缩和神经营养障碍等,亦可排除。

标签:

59. 下列慢性颅内压增高所引起头颅 X 线改变,错误的是

- A. 脑回压迹增多加深
- B. 颅缝增宽
- C. 蛛网膜压迹扩大加深
- D. 枕大孔扩大
- E. 蝶鞍扩大,前后床突及鞍背的骨质吸收

答案:D

解析:本题多处提及“扩大”,对考生产生干扰,因此有一定难度。要求考生了解颅内压增高的病理生理学知识,并掌握头颅 X 线平片的阅片基础知识。①2~12 岁的儿童,有脑回压迹属于正常现象。成人脑回压迹很少,如增多,是颅内压增高的征象,故可排除选项 A。②7 岁以前的儿童颅缝尚未闭合,当颅内压增高时,出现颅缝代偿性增宽、颅缝哆开以及头围增大,故可排除选项 B。③头颅 X 线正位片上矢状窦两侧可见蛛网膜压迹,当慢性颅内压增高时这些压迹明显显现,亦能排除选项 C。④慢性颅内压增高以及第三脑室对蝶鞍产生压迫致使蝶鞍扩大、前后床突及鞍背的骨质吸收,故可排除选项 E。⑤选项中除 D 外皆为慢性颅内压增高的 X 线表现,利用排除法均可排除,选项 D 为正确答案。

标签:

60. 下面最容易引起颅内压增高的肿瘤是

- A. 额、顶部肿瘤
- B. 侧脑室肿瘤
- C. 脑干肿瘤
- D. 第三、第四脑室及导水管附近的肿瘤
- E. 垂体区肿瘤

答案:D

解析:本题属于理解记忆题,主要考核颅内各部位肿瘤对颅内压的影响。第三、第四脑室及导水管附近的肿瘤由于更容易引起脑脊液循环障碍而最易引起颅内压增高。

标签:

61. 不提示为小脑病变的体征是

- A. 眼震
- B. 静止性震颤
- C. 辨距不良
- D. 意向性震颤
- E. 吟诗状言语

答案:B

解析:本题考查考生对小脑损害临床表现的记忆。小脑损害的表现主要为肢体共济失调、躯干共济失调(站立不稳、Romberg 征阳性)、眼震、发声肌共济失调(暴发言语、吟诗状言语)、意向性震颤、肌张力下降等。静止性震颤是锥体外系损害的表现。

标签:

62. 对明确单纯疱疹脑炎诊断最有价值的检查是

- A. 脑脊液的单纯疱疹病毒 PCR 检测
- B. 血常规中 WBC 以中性粒细胞为主
- C. 头 MRI-DWI 见高信号灶
- D. 脑电图示颞部慢波和三相波
- E. 头 CT 见颞叶低密度灶

答案:A

解析:本题是记忆题,主要考核单纯疱疹脑炎的诊断与鉴别诊断。

标签:

63. 32 岁,女性,妊娠 31 周,少量阴道流血,以往曾有 3 次早产史。主要处理应是

- A. 抑制宫缩,促进胎儿肺成熟
- B. 左侧卧位
- C. 注意休息,并给以镇静剂
- D. 任其自然

E. 氧气吸入，给予止血剂

答案:A

解析:根据孕 31 周有早产史，现阴道少量出血考虑先兆早产，故予以上治疗延长 孕周。

标签:

应用

中等

64. 28 岁，女性，风湿性心脏病、二尖瓣狭窄病史 5 年。平时不用药，登三楼无明显不适。孕 5 月起活动时常有轻度心慌、气促。现孕 38 周，因心悸，咳嗽，夜间不能平卧，心功能Ⅲ级而急诊入院。在制定治疗计划时，最佳的方案是

- A. 积极控制心衰后选择流产
- B. 积极控制心衰，同时行剖宫产术
- C. 积极控制心衰，同时行引产术
- D. 适量应用抗生素后继续妊娠
- E. 纠正心功能，等待自然临产

答案:B

解析:心功能Ⅲ级不宜妊娠，该产妇应终止妊娠。凡不宜妊娠的心脏病孕妇，应在妊娠 12 周前行人工流产。妊娠超过 12 周时，终止妊娠须较复杂的手术，其危险性不亚于继续妊娠和分娩，因此应密切监护，积极防治心力衰竭，使之渡过妊娠与分娩。选项 B 正确。其他措施不妥，故选项 A、C、D、E 不正确。

标签:

精华

应用

中等

65. 患者，25 岁，女性，停经 3 个月，阴道淋漓流血 2 个月，阴道前壁有胡桃大紫蓝色结节，子宫软，如孕 4 个半月大小，尿妊娠试验(+)，应考虑为

- A. 葡萄胎
- B. 侵蚀性葡萄胎
- C. 双胎妊娠
- D. 妊娠合并子宫肌瘤
- E. 先兆流产

答案:B

解析:凡有停经后不规则阴道流血、腹痛、妊娠呕吐严重且出现时间较早，体检时有子宫体积大于停经月份，变软，子宫 5 月大小时尚不能触及胎体，不能听到胎心，无胎动，应怀疑葡萄胎，阴道前壁有胡桃大紫蓝色结节，考虑为葡萄胎恶变发生阴道转移，选项 B 正确，而选项 A、C、D、E 不正确。

标签:

应用

中等

66. 28 岁女性，产后 6 个月，月经周期缩短，妇科检查无异常。基础体温曲线呈双相型，提示为

- A. 无排卵型功血
- B. 子宫内膜不规则脱落
- C. 黄体功能不足
- D. 早期妊娠
- E. 不能确定诊断

答案:C

解析:根据月经周期缩短、妇科检查无引起功血的生殖器官器质性病变，基础体温曲线呈双相型，提示为黄体功能不足，选项 C 正确。基础体温曲线呈双相型，提示有排卵，选项 A 不正确。月经周期正常为子宫内膜不规则脱落，选项 B 不正确。早期妊娠会出血闭经，选项 D、E 不正确。

标签:

精华

应用

中等

67. 妊娠 8 周行吸宫术后半月，阴道持续流血，量时多时少。妇科检查：宫口松，子宫如 40 天妊娠大小，较软，尿妊娠试验阳性，应考虑的诊断

- A. 绒毛膜癌
- B. 侵蚀性葡萄胎
- C. 子宫内膜炎
- D. 吸宫不全
- E. 子宫复旧不良

答案:D

解析:吸宫不全是人工流产后部分胎盘残留，也可能部分胎儿残留。术后阴道持续出血超过 10 日，血量过多或流血停止后又多量流血，应考率吸宫不全，选项 D 正确，选项 C、E 不正确。绒毛膜癌、侵蚀性葡萄胎有潜伏期，选项 A、B 不正确。

标签:

精华

应用

中等

68. 29 岁女性，人工流产术中突感胸闷、头晕、恶心。查体：面色苍白、大汗淋漓，血压 70 / 50mmHg，脉搏 50 次 / 分。此时应首先给予

- A. 输血补液

- B. 阿托品静脉注射
- C. 苯巴比妥钠肌注
- D. 迅速消除宫腔内容物
- E. 阿拉明静脉滴注

答案:B

解析:在术中或术毕时部分患者出现心动过缓,心律不齐、血压下降、面色苍白、头昏、胸闷、大汗淋漓,严重者甚至出血昏厥、抽搐等迷走神经虚脱的症状,称为人工流产综合反应,此时应给阿托品静脉注射,兴奋迷走神经,选项B正确,故选项A、C、D、E不正确。

标签:

精华

简单

应用

69. 初孕妇, 26 岁。妊娠 38 周, 规律宫缩 8 小时, 宫口开大 6cm, S+1, 胎膜已破, 胎儿体重估计 3000g, 血压 130 / 80mmHg, 胎心 144 次 / 分。2 小时后肛查: 宫口仍 6cm, 边薄, 先露 S+1, 宫缩力弱, 20 秒/5~6 分, 胎心好。应诊断为

- A. 潜伏期延长
- B. 活跃期延长
- C. 活跃期停滞
- D. 第二产程延长
- E. 滞产

答案:B

解析:第一产程分为潜伏期和活跃期。超过 8 小时, 而宫口扩张速度初产妇 <1.2cm/h 为活跃期延长。若进入活跃期后, 宫口不再扩张达 4 小时以上, 为活跃期停滞。故选 B。

标签:

精华

应用

中等

70. 女, 28 岁。停经 68 天, 阵发腹痛伴多量阴道流血 1 天, 妇科检查: 子宫 6 周妊娠大小, 宫口开, 有血液不断流出, 处理首选的是

- A. 立即清宫
- B. 立即抗感染
- C. 按摩子宫
- D. 输血
- E. 剖腹探查

答案:A

解析:难免流产,指流产不可避免,在先兆流产的基础上,阴道流血量增多,阵发性下腹痛加剧,妇科检查宫颈口已扩张,有时可见胚胎组织或胎囊堵塞于宫颈口内,子宫大小与停经周数相符或略小,故此病例为难免流产。难免流产一旦确诊,应尽早使胚胎及胎盘组织完全排出,故选项 A 正确。

标签:

精华

应用

中等

71. 女, 28 岁。停经 43 天, 阴道少量流血 2 天, 突感下腹部剧痛, 伴肛门坠胀, 恶心呕吐。查体: 面色苍白, BP80 / 40mmHg, 后穹隆穿刺抽出不凝血 5ml, 诊为异位妊娠, 出血性休克。最佳处理是

- A. 静脉输液, 输血
- B. 纠正休克同时手术
- C. 待血压正常手术
- D. 自体输血
- E. 保守治疗

答案: B

解析: 输卵管妊娠破裂, 输卵管肌层血管丰富, 短期内可发生大量腹腔内出血使患者出现休克, 腹腔内出血最易积聚于直肠子宫陷凹, 即使血量不多, 也能经阴道后穹隆穿刺抽出血液。发生休克时应立即补充血容量, 同时进行手术治疗, 故选项 B 正确。

标签:

精华

简单

应用

72. 初孕妇, 26 岁。妊娠 34 周。因腹部直接受撞击出现轻微腹痛, 伴少量阴道流血, 胎心 142 次/分。恰当处理应是

- A. 静脉滴注止血药物
- B. 卧床休息, 给予镇静药观察病情变化
- C. 立即肛查, 了解宫口扩张情况
- D. 立即阴道检查, 根据宫口扩张程度决定分娩方式
- E. 立即行剖宫产结束妊娠

答案: B

解析: 外伤尤其是腹部直接受到撞击或者挤压易发生胎盘早剥。主要症状为突然发生不同程度的腹痛, 阴道流血等, 故此病例为胎盘早剥。胎盘早剥根据病情严重程度分为 3 度。I 度胎盘剥离面积小, 患者常无腹痛或腹痛轻微, 贫血体征不明显, 胎位清楚, 胎心率正常, 故此病例为 I 度胎盘早剥, 可以卧床休息, 观察病情变化, 故选项 B 正确, 选项 E 不正确。I 度胎盘早剥出

血少，无需静脉滴注止血药物，避免对母婴造成影响，选项 A 不正确。胎盘早剥或者前置胎盘时避免肛检和阴道检查，选项 C、D 不正确。

标签：

困难

应用

73. 女，23 岁。妊娠 26 周，腹胀 2 天入院。体格检查：血压 130 / 90mmHg，痛苦表情，发绀，不能平卧。产科检查：宫高 36cm，腹围 102cm，胎位不清，胎心未听到。最可能的诊断是

- A. 妊娠合并心脏病
- B. 妊娠高血压综合征
- C. 死胎
- D. 羊水过多
- E. 双胞胎妊娠

答案：D

解析：急性羊水过多多发生在妊娠 20~24 周，由于羊水急速增多，数日内子宫急剧增大，并产生一系列压迫症状，腹腔脏器向上推移，横膈上举，出现呼吸困难，甚至发绀，孕妇行走不便，不能平卧仅能端坐，表情痛苦，测量宫高及腹围大于同期孕妇，胎位不清，有时扪及胎儿部分由浮沉胎动感，胎心遥远或听不清，此病例中妊娠 26 周，正常宫高在 24cm~26cm 之间，故选项 D 正确。妊娠合并心脏病可出现一系列酷似心脏病的症状和体征，如心悸，气短，心动过速等，心脏检查有轻度扩大，心脏杂音等，选项 A 不正确。妊娠期高血压疾病是妊娠期特有疾病，通常发生于妊娠 20 周以后，主要表现为高血压，蛋白尿和水肿，选项 B 不正确。死胎孕妇自觉胎动停止，子宫停止增长，检查时听不到胎心，子宫大小与停经月份不符，选项 C 不正确。

标签：

超纲

应用

中等

74. 女，60 岁。绝经 5 年，反复阴道流血 3 次，量中等，平时白带少许。首先考虑的诊断是

- A. 输卵管癌
- B. 子宫内膜癌
- C. 子宫颈癌
- D. 子宫内膜炎
- E. 老年性阴道炎

答案：B

解析：子宫内膜癌的临床表现为绝经后再现不规则阴道流血或绝经过渡期妇女月经紊乱，量一般不大，大量出血者少见，或者为持续性或为间歇性流血，

尚未绝经者则经量增多，经期延长或经间期出血，故选项 B 正确。输卵管癌早期无症状，体征常不典型，临床上常表现为阴道排液，腹痛，盆腔肿块，称输卵管“三联症”，选项 A 不正确。子宫颈癌表现为接触性出血，发生在性生活后或妇科检查后，选项 C 不正确。子宫内膜炎阴道有大量脓性分泌物且有臭味，可有全身中毒症状，表现为高热，寒颤等，选项 D 不正确。老年性阴道炎主要为阴道分泌物增多及外阴瘙痒，灼热感，选项 E 不正确。

标签：

精华

应用

中等

75. 女，30 岁。7 个月前孕 48 天行人工流产术，术后未来月经，雌、孕激素试验均阴性，闭经的原因应是

- A. 卵巢性闭经
- B. 垂体性闭经
- C. 下丘脑性闭经
- D. 子宫性闭经
- E. 难以确定

答案：D

解析：子宫性闭经的原因在子宫，月经调节功能正常，由于子宫内膜受破坏或对卵巢激素不能产生正常的反应出现闭经。雌、孕激素序贯试验适用于孕激素试验阴性的闭经者，停药后发生撤药性出血为阳性，提示子宫内膜功能正常，可排除子宫性闭经，引起闭经的原因是患者体内雌激素水平低落，为 II 度闭经，应进一步寻找原因。无撤药性出血者为阴性，应重复一次试验，若仍无出血，提示子宫内膜有缺陷或被破坏，可诊断为子宫性闭经，故选项 A 正确。卵巢性闭经原因在卵巢，卵巢分泌的性激素水平低下，子宫内膜不发生周期性变化而导致闭经，雌、孕激素试验呈阳性，选项 A 不正确。垂体性闭经，主要病变在垂体，腺垂体器质性病变或功能失调可影响促性腺激素的分泌，继而影响卵巢功能而引起闭经，选项 C 不正确。

标签：

精华

应用

中等

76. 女，30 岁。继发不孕伴痛经 2 年。妇科检查：宫颈光滑，子宫后位，正常大小，粘连固定，经阴道后穹隆扪及触痛结节。应诊断为

- A. 慢性盆腔炎
- B. 子宫内膜异位症
- C. 卵巢癌
- D. 子宫腺肌病

#### E. 盆腔瘀血症

答案:B

解析:凡育龄妇女有继发性痛经进行性加重和不孕史,盆腔检查扪及内有触痛性结节或子宫旁有不活动囊性包块,即可初步诊断为内异症。继发性痛经是内异症的典型症状,内异症患者不孕率高达40%,典型盆腔内异症可发现子宫多后倾固定,故选项B正确。慢性盆腔炎一般有急性盆腔炎史,选项A不正确。卵巢肿瘤症状常表现为腹胀,腹部肿块及腹水等,三合诊检查在阴道后穹窿触及盆腔内散在质硬结节,肿块多为双侧,表面高低不平,固定不动,常伴有腹水,选项C不正确。子宫腺肌症子宫呈均匀性增大或有局限性结节隆起,质硬而有压痛,选项D不正确。

标签:

精华

应用

中等

77. 女, 39 岁。子宫 II 度脱垂伴阴道前后壁轻度膨出, 张力性尿失禁。妇检: 宫颈长约 6cm, 子宫后位, 正常大小, 附件未扪及块物, 要求手术治疗。首选手术应是

- A. 阴道前后壁修补术
- B. 子宫切除+阴道前后壁修补术
- C. 曼市手术
- D. 阴道纵隔形成术
- E. 子宫悬吊术

答案:C

解析:曼氏手术指阴道前后壁修补,主韧带缩短及宫颈部分切除术,适用于年龄较轻,宫颈延长,希望保留子宫的II、III度子宫脱垂伴阴道前后壁脱垂患者,故选项C正确。阴道前后壁修补术适合I、II度阴道前后壁脱垂患者,选项A不正确。子宫切除+阴道前后壁修补术适用于II、III度子宫脱垂伴阴道前后壁脱垂,年龄较大,不须保留子宫的患者,选项B不正确。阴道纵隔形成术适用于老年体弱不能耐受较大手术,不须保留性交功能者,选项D不正确。子宫悬吊术可采用缩短圆韧带,通过腹腔镜把吊带一端缝于子宫,另一端固定于骶前组织,达到悬吊子宫和阴道的目的,选项E不正确。

标签:

精华

应用

中等

78. 初孕妇, 25 岁。妊娠 38 周。骨盆外测量: 骶耻外径 18.5cm, 髂嵴间径 27cm, 坐骨结节间径 7.5cm。本例孕妇的骨盆应诊断为

- A. 单纯扁平骨盆

- B. 佝偻病性扁平骨盆
- C. 均小骨盆
- D. 漏斗型骨盆
- E. 男型骨盆

答案:D

解析:正常骶耻外径 18~20cm, 正常髂嵴间径 25~28cm, 正常坐骨结节间径 8.5~9.5cm。题中除坐骨结节间径小于正常值外其余均正常, 故为漏斗型骨盆, 选项 D 正确。

标签:

应用

中等

79. 初产妇, 足月妊娠, 宫口开全 1 小时 30 分尚未分娩。阴道检查: 头先露, 宫口开全, 胎头位于坐骨棘水平下 3cm, 枕左横位(LOT), 胎膜已破, 羊水清, 胎心率 140 次 / 分, 估计胎儿重 3200g。本例正确处理应是

- A. 行剖宫产术
- B. 缩宫素静脉滴注
- C. 等待阴道自然分娩
- D. 徒手将胎头枕部转向前方, 然后阴道分娩
- E. 行产钳助产术

答案:D

解析:第二产程初产妇需 1~2 小时, 故题中孕妇为正常产程。但胎儿为枕左横位(LOT), 需用手或行胎头吸引术将胎头转成枕前位娩出, 故选项 D 正确。

标签:

困难

应用

80. 26 岁经产妇, 停经 8 周, 下腹阵发性剧烈疼痛 10 小时伴多量阴道流血, 超过月经量, 检查宫口开大近 2cm。本例最恰当的处置应是

- A. 静脉滴注止血药物
- B. 口服硫酸舒喘灵
- C. 肌注硫酸镁
- D. 肌注黄体酮
- E. 行负压吸宫术

答案:E

解析:根据停经 8 周, 阵发性腹痛, 阴道流血, 宫口开大可以初步诊断为难免流产。此时应尽早使胚胎及胎盘组织完全排出, 可行刮宫术或负压吸宫术, 并对妊娠物仔细检查, 并送病理检查。故选项 E 正确。

标签:

精华

简单  
应用

81. 初孕妇, 26 岁。于妊娠 34 周出现头痛、眼花。血压 180 / 100mmHg, 尿蛋白(++), 眼底动静脉比为 1: 2, 视网膜水肿。本例诊断应是

- A. 中度妊高征
- B. 先兆子痫
- C. 子痫
- D. 妊娠合并原发性高血压
- E. 妊娠合并肾性高血压

答案: B

解析: 先兆子痫: 轻度: BP $\geq$ 140 / 90mmHg, 尿蛋白 $\geq$ 300mg/24 小时或 $\geq$ (+), 伴头痛、上腹部不适等; 重度: BP $\geq$ 160 / 100mmHg, 尿蛋白 $\geq$ 2.0g/24 小时或 $\geq$ (++), 伴持续性头痛、持续性上腹部不适及视神经障碍等, 根据题中所给信息判断此患者为先兆子痫, 故选项 B 正确。妊娠期高血压: 妊娠期首次出现 BP $\geq$ 140 / 90mmHg, 无蛋白尿, 产后 12 周内 BP 降至正常, 故选项 A 不正确。子痫: 子痫前期孕妇发生抽搐, 故选项 C 不正确。妊娠合并原发性高血压时, 患者在未怀孕之前已有高血压史, 故选项 D 不正确。妊娠合并肾性高血压, 患者既往应有肾病史, 故选项 E 不正确。

标签:

精华

简单

应用

82. 女, 27 岁。妊娠 38 周, 伴头痛、头晕、视物不清 1 天。体格检查 BP180 / 110mmHg, 尿蛋白(+), 浮肿(+), 胎心 140 次/分。肛诊子宫颈管未消失。NST 为无反应型, 最恰当的处理是

- A. 静脉滴注硫酸镁, 继续妊娠
- B. 降压利尿
- C. 治疗 4 天无好转行剖宫产术
- D. 促宫颈成熟
- E. 治疗同时立即剖宫产

答案: E

解析: 妊娠期高血压疾病终止妊娠的指征: ①子痫前期经积极治疗 24~48 小时仍无好转②子痫前期孕周已超过 34 周③子痫前期孕龄不足 34 周, 胎盘功能减退, 胎儿成熟④子痫前期孕龄不足 34 周, 胎盘功能减退, 胎儿未成熟, 用地塞米松促胎肺成熟后终止妊娠⑤子痫控制后 2 小时。终止方法有①引产: 适用于宫颈条件成熟②剖宫产: 适用于宫颈条件未成熟, 引产失败或已有胎儿窘迫征象者。根据题中所给信息, 选项 E 正确。

标签:

精华  
应用  
中等

83. 妇女，54 岁。白带增多，均匀稀薄，有臭味，阴道粘膜无明显充血，阴道 pH 值 5。最可能的诊断是

- A. 急性淋病
- B. 细菌性阴道病
- C. 滴虫阴道炎
- D. 念珠菌阴道炎
- E. 老年性阴道炎

答案:B

解析:细菌性阴道炎诊断:①匀质、稀薄、白色阴道分泌物,常粘附于阴道壁②阴道 pH 值 $>4.5$ ③胺臭味试验阳性④线索细胞阳性。根据题中所给信息提示为细菌性阴道炎,故选项 B 正确。滴虫阴道炎分泌物为稀薄脓性、黄绿色、泡沫状、有臭味,故选项 C 不正确。老年性阴道炎阴道分泌物稀薄,呈淡黄色,感染严重者呈脓血性白带,外阴瘙痒、灼烧感,故选项 E 不正确。

标签:

精华  
应用  
中等

84. 28 岁妇女,主诉白带增多,检查宫颈阴道部宫口周围外观呈细颗粒状红色区,占整个宫颈面积的  $2/3$ ,宫颈刮片巴氏染色 H 级。本例恰当处置应是

- A. 涂硝酸银腐蚀
- B. 阴道内放置药物
- C. 物理治疗
- D. 宫颈锥形切除
- E. 宫颈切除

答案:C

解析:宫颈外口处的宫颈阴道部外观呈细颗粒状的红色区,称为宫颈糜烂。宫颈糜烂分 3 度:轻度指糜烂面小于整个宫颈面积的  $1/3$ ;中度指糜烂面占  $1/3\sim 2/3$ ;重度指糜烂面占  $2/3$  以上。物理治疗为宫颈糜烂最常用的有效治疗方法,常用的有激光、冷冻、红外线凝结及微波等。药物治疗适用于糜烂面积小和炎症浸润较浅的病例。故选项 C 正确。

标签:

应用  
中等

85. 女,40 岁,已婚,经产妇,月经期延长,量多,痛经明显,子宫孕 50

天大小，有压痛，双附件正常，最可能的诊断为

- A. 子宫肌瘤
- B. 子宫肌腺病
- C. 子宫肥大
- D. 子宫内膜异位症
- E. 早孕

答案:B

解析:子宫腺肌病主要表现是经量增多、经期延长以及逐渐加剧的进行性痛经。子宫呈均匀性增大或有局限性结节隆起，质硬而有压痛，经期时压痛尤为显著。根据题目所给信息提示子宫腺肌病可能性大，故选项 B 正确。子宫肌瘤、子宫肥大进行性痛经少见，故选项 A、C 不正确。子宫内膜异位症痛经症状较子宫腺肌病轻，且异位内膜常见种植部位是盆腔脏器和腹膜，其中以侵犯卵巢最为常见，故选项 D 不正确。早孕应有停经史及其他早孕反应，故选项 E 不正确。

标签:

应用

中等

86. 28 岁经产妇，人工流产术后半年，术后断续阴道流血，量不多，术后一直避孕。尿妊娠试验阳性，查子宫超鸭卵大、软。胸片见两肺中下部有多处散在棉絮团影。本例最可能的疾病是

- A. 吸宫不全
- B. 葡萄胎
- C. 侵蚀性葡萄胎
- D. 绒毛膜癌
- E. 胎盘部位滋养细胞肿瘤

答案:D

解析:继发于葡萄胎的绒癌绝大多数在 1 年以上发病，而继发于流产和足月产的绒癌约 50%在 1 年内发病，阴道流血是其最主要症状，并有 hCG 升高，早期转移常见于肺部，表现为胸痛、咳嗽、咯血及呼吸困难，靠 X 线或 CT 可作出诊断。故 D 正确。

标签:

精华

应用

中等

87. 37 岁妇女，因阴部有块物脱出就诊。妇科检查见部分宫体与宫颈外露于阴道口，宫颈较长。本例恰当处理应是

- A. 阴道前后壁修补术
- B. Manchester 手术

- C. 阴道纵隔形成术
- D. 阴道子宫全切除及阴道前后壁修补术
- E. 经腹子宫全切除术

答案:B

解析:子宫脱垂临床分度: I 度: 轻度: 子宫颈距离处女膜缘少于 4cm; 重度: 子宫颈已达处女膜缘但未超过该缘; II 度: 轻度: 子宫颈已脱出阴道口外, 但宫体仍在阴道内; 重度: 子宫颈及部分宫体已脱出阴道口外; III 度: 子宫颈及宫体全部脱出于阴道口外。本题属于子宫脱垂 II 度重度。子宫脱垂的非手术治疗适用于 I 度重及 II 度轻型, 手术治疗适用于保守治疗无效或者 II 度重及 III 度病例。曼氏手术适用于年龄较轻、宫颈较长且希望保留生育功能者; 阴道子宫全切除适用于年龄较大不需要生育者或并发阴道壁膨出; 阴道前后壁修补术适用于伴有明显阴道前后壁脱垂而无宫颈延长者。根据题目所给条件, 本病例适用于曼氏手术治疗。故选项 B 正确。

标签:

精华

应用

中等

88. 患儿, 女, 2 岁。反复发作喘息 4 次以上, 昨又突然发作喘息, 查两肺满布哮鸣音, 皮下注射肾上腺素后, 哮鸣音明显减少。患儿幼时对花粉过敏, 母有哮喘史。患儿如呈哮喘持续状态, 有效的紧急处理是

- A. 气管切开
- B. 平卧位
- C. 毛花苷丙(西地兰)注射
- D. 甘露醇注射
- E. 氢化可的松静脉滴注

答案:E

解析: 患儿哮喘持续状态的处理: 应用氢化可的松静脉滴注, 全身糖皮质激素作为儿童危重哮喘治疗的一线药物。

标签:

89. 患儿, 男, 5 个月。因受凉后突然喘憋急诊入院。入院体检: T37.5℃, 烦躁, 气促, 口周发绀, 心率 196/min, 心音被响亮的哮鸣音掩盖, 吸气末少量中细湿啰音, 腹软, 肝肋下 3cm, 剑下 3cm, 上界第 6 肋间, 脾未触及。WBC  $9.8 \times 10^9/L$ , N 0.5。以下哪一项诊断可能性最大

- A. 金黄色葡萄球菌肺炎
- B. 腺病毒肺炎
- C. 白色念珠菌性肺炎
- D. 呼吸道合胞病毒肺炎
- E. 肺炎支原体肺炎

答案:D

解析:本题主要特点是小婴儿,急性起病,表现为喘憋、肺部听诊可闻及响亮哮鸣音和中细湿啰音、外周血白细胞无增高。肝虽在肋下 3cm,但上界下移,因此不能认为有肝脏增大,结合喘憋、肺部哮鸣音应考虑是肺气肿致横膈下移而肝亦随之下移,故心动过速是缺氧严重表现。答题时,根据本病例起病急骤,即可排除白色念珠菌性肺炎,因白色念珠菌性肺炎虽有肺炎各种临床表现,但起病不甚急骤,多发生在长期应用广谱抗生素的过程中。同时,起病急骤,肺部体征较重,也可排除肺炎支原体肺炎,因肺炎支原体肺炎起病不甚急。金黄色葡萄球菌肺炎、腺病毒肺炎、呼吸遭合胞病毒肺炎均起病较急,应在三者中再选择。本病例发病即出现肺部啰音,血白细胞不高,无高热,可排除金黄色葡萄球菌肺炎,因金黄色葡萄球菌肺炎虽也较早出现肺部啰音,但中毒症状明显,常有弛张高热,白细胞显著增高。腺病毒肺炎也有喘憋,但是肺部体征出现较晚,发热 4~5 天后才出现湿啰音,亦与本病例不符可予排除。选项 D 呼吸道合胞病毒肺炎的特点是多见于 2~6 个月婴儿,发病较急,以喘憋为突出表现,喘憋严重时可合并心力衰竭,肺部听诊可闻及哮鸣音和多量细湿啰音,有肺气肿,血白细胞不高,与本病例相符。

标签:

90. 患儿,女,1 岁。急起高热,流涎,厌食。查体:可见咽部充血,咽腭弓、悬雍垂、软腭等处可见 2~4mm 大小的疱疹,心肺(-)。最可能的诊断是

- A. 疱疹性口炎
- B. 鹅口疮
- C. 咽-结合膜热
- D. 猩红热
- E. 疱疹性咽峡炎

答案:E

解析:疱疹性咽峡炎是小儿一种特殊上感。除上感表现外,咽峡部、软腭、悬雍垂等处黏膜出现 2~4mm 灰白色小丘疹,周围绕有红晕,渐变成疱疹,疱疹破溃,形成溃疡,亦可三种病变同时存在。

标签:

91. 患儿,男,1.5 岁。咳嗽、发热 3 天,双肺闻及散在的细湿啰音及广泛呼气时哮鸣音。血常规:白细胞  $15 \times 10^9/L$ ,中性粒细胞 0.6;胸部正位片:两下肺散在斑片影。诊断最可能是

- A. 合胞病毒肺炎
- B. 支气管肺炎
- C. 支原体肺炎
- D. 腺病毒肺炎
- E. 金黄色葡萄球菌肺炎

答案:B

解析:支气管肺炎潜伏期 2~3 周,起病缓慢,约 1/3 病例无症状。以支管-支气管炎、肺炎、耳鼓膜炎等的形式出现,而以肺炎最重。肺部 X 线检查可见模糊云雾状或均匀一致的阴影,近肺门部较致密,向外逐渐变浅,边缘不清楚,通常不侵犯整叶。

标签:

中等

92. 患儿,女,6 岁。反复咳嗽 3 个月,活动后加重,常于夜间咳醒,痰不多,无发热,抗生素治疗无效。既往有湿疹史。查体:双肺呼吸音粗,余无异常。最可能的诊断是

- A. 支气管炎
- B. 支气管异物
- C. 咳嗽变异性哮喘
- D. 支气管肺炎
- E. 喘息性支气管炎

答案:C

解析:咳嗽变异性哮喘的诊断标准:①持续咳嗽或反复发作>1 个月,常夜间和(或)清晨发作,运动、遇冷空气或嗅到特殊气味后加重,痰少,临床上无感染征象,或经较长时间抗生素治疗无效。②支气管舒张剂诊断性治疗可使咳嗽发作缓解(基本诊断条件)。③有个人或家族过敏史、家族哮喘病史,过敏原检测阳性可做辅助诊断。④排除其他原因引起的慢性咳嗽。

标签:

93. 患儿,男,14 岁。发热、干咳伴全身肌痛 2 天,胸部 X 线片示间质性肺炎,同班级中数人有类似症状。治疗首选的是

- A. 头孢唑啉
- B. 左氧氟沙星
- C. 庆大霉素
- D. 克林霉素
- E. 阿奇霉素

答案:E

解析:肺炎支原体肺炎:①多见于学龄期(>5 岁)儿童及青年。②发热,可持续 1~3 周,可伴有咽痛和肌肉酸痛。③以刺激性干咳为突出表现,常有黏稠痰液,偶带血丝,少数病例可类似百日咳样阵咳,可持续 1 周。④肺部体征常不明显,甚至全无。少数可听到散在干、湿啰音,但多很快消失,故体征与剧咳及发热等临床表现不一致,为本病特点之一。⑤肺部 X 线改变是本病的重要诊断依据:支气管肺炎、间质性肺炎、均匀一致的片状阴影似大叶性肺炎改变、肺门阴影增浓。⑥部分患儿可出现有溶血性贫血、脑膜炎、心肌炎、肾炎、吉兰-巴雷综合征等肺外表现。⑦血冷凝集试验 $\geq 1:32$ 有很大参考价值。该患儿最可能的诊断是肺炎支原体肺炎,故治疗首选大环

内酯类抗生素，如红霉素、阿奇霉素等。

标签：

94. 患儿 5 个月，支气管肺炎合并心衰，应立即进行的处理是

- A. 吸氧、镇静、氨茶碱、毛花苷丙 0.05mg 肌内注射
- B. 吸氧、镇静、毛花苷丙 0.5mg 肌内注射
- C. 吸氧、镇静、毛花苷丙 0.1mg 稀释后静脉注射
- D. 吸氧、镇静、氨茶碱，毛花苷丙 0.2mg 肌内注射
- E. 吸氧、镇静、氨茶碱

答案:C

解析:肺炎合并心衰的治疗: 吸氧. 镇静. 利尿. 强心 (可用地高辛或毛花苷丙静脉注射). 血管活性药物

标签：

困难

95. 患儿，女，8 岁。发热伴头痛及肌肉酸痛 4 天。查体:咽充血，扁桃体 I 度肿大。同学中有数人发病。最可能的诊断是

- A. 疱疹性咽峡炎
- B. 川崎病
- C. 急性上呼吸道感染
- D. 急性扁桃体炎
- E. 流行性感冒

答案:E

解析:流行性感冒主要由流感病毒、副流感病毒所致。有明显流行病史。全身症状重，如发热、头痛、咽痛、肌肉酸痛等，上呼吸道卡他症状不一定出现。

标签：

96. 女，18 岁，某大学一年级新生。入学后对新的学习环境和教学模式不适应，出现情绪焦虑、失眠等情况，该生的辅导员、老师及同学们给予其热情的帮助，疏导和安慰，使该生逐渐走出适应不良的状态。这种应对应激的方法属于

- A. 回避应激源
- B. 催眠心理治疗
- C. 专业思想教育
- D. 运用自我防御机制
- E. 取得社会支持

答案:E

解析:社会支持是指个体与社会各方面包括亲属、朋友、同事、伙伴等以及家庭、单位、党团、工会等社团组织所产生的精神上和物质上的联系程度。在应激研究领域，一般认为社会支持具有减轻应激的作用，拥有好的社会支

持，常常会带来很多资源和能量。

标签:

97. 患儿，女，3岁。高热、咽痛、纳差3天。查体：咽部充血，眼结膜充血，颈部、耳后淋巴结肿大，心肺无异常。最可能的病原体是

- A. 柯萨奇病毒
- B. 副流感病毒
- C. 流感病毒
- D. 腺病毒
- E. 单纯疱疹病毒

答案:D

解析:婴幼儿特殊上感咽-结合膜热:病原体为腺病毒3、7型。常发生于春夏季。是一种以发热、咽炎、结合膜炎为特征的急性传染病，散发或发生小流行。可在集体儿童机构中流行。多呈高热，咽痛，眼部刺痛，咽部充血，一侧或两侧滤泡性眼结合膜炎。颈部、耳后淋巴结肿大，有时有胃肠道症状。病程1~2周。

标签:

98. 男，23岁。3个月前劳务输出首次出国，出现紧张、心慌、易怒、失眠多梦，不愿上班，每天打电话向家人寻求安慰。回国1个月后症状自行缓解，恢复如常。该患者最可能的诊断是

- A. 社交焦虑障碍
- B. 适应障碍
- C. 急性应激障碍
- D. 创伤后应激障碍
- E. 广泛性焦虑障碍

答案:B

解析:适应障碍是指个体经历应激事件后出现了反应性情绪障碍、适应不良行为障碍和社会功能受损，临床表现以情绪和行为异常为主，常见焦虑不安、抑郁等，常伴有自主神经系统紊乱如心悸、出汗等。典型的生活事件有离婚、失业或变换岗位、迁居、转学、患重病、经济危机、退休等，发病往往与生活事件的严重程度、个体的心理素质、心理应对方式、来自家庭和社会的支持等因有关。

标签:

99. 男孩，10岁。上课时突然见讲台上老师变成“数寸长短的小人”，5~10秒后此现象消失。伴随不自主发笑，事后不能回忆发笑之事。3周内反复发作9次。查体和头颅MRI未见异常。可能的癫痫发作类型是

- A. 单纯运动性发作
- B. 单纯部分性发作
- C. 复杂部分性发作

D. 单纯感觉性发作

E. 失神发作

答案:E

解析:单纯部分性发作指发作起始于一侧脑部(局灶性或局限性),可扩展至两侧,发作时不伴意识障碍,包括单纯运动性发作和单纯感觉性发作。患儿事后不能回忆发笑之事,故排除 A、B、D。复杂部分性发作只有一时障碍时,应与失神发作鉴别,其不同点在于本型意识障碍常在 1 分钟以上,而真正的失神发作则不超过 1 分钟。患儿持续 5~10 秒,故属失神发作。

标签:

100. 女孩, 14 岁, 中学生。外出旅游, 夜间出室外解便时突感恐惧紧张, 跑步回室途中, 不慎跌倒, 双手着地。站立起来时, 发现双目失明。最可能的诊断是

A. 恐怖性神经症

B. 焦虑性神经症

C. 疑病性神经症

D. 分离转换障碍

E. 双目外伤失明

答案:D

解析:分离转换障碍是一类由精神因素,如重大生活事件、内心冲突、情绪激动、暗示及自我暗示,作用于易病个体引起的精神障碍。主要表现为各种各样的躯体症状、意识范围缩小、选择性遗忘或情感爆发等精神症状,但不能查出相应的器质性损害作为其病理基础。此患者夜间突感情绪紧张恐惧,不慎摔倒,双手着地,头部及眼部并未受伤,但站立起来时却发现双目失明,据此分析其最大可能的诊断是分离转换障碍。

标签:

101. 患儿, 女, 6 个月。咳嗽伴喘憋 2 天。查体:T 38℃, P 120/min, R 80/min, 烦躁不安, 双肺明显哮鸣音, 喘息缓解时可闻及少许中、小湿啰音, 肝肋下 2.0cm。最可能的诊断是

A. 肺炎链球菌肺炎

B. 腺病毒肺炎

C. 呼吸道合胞病毒肺炎

D. 肺炎支原体肺炎

E. 金黄色葡萄球菌肺炎

答案:C

解析:呼吸道合胞病毒肺炎的特点:是最常见的病毒性肺炎。多见于 2 岁以内婴幼儿,尤其是 2~6 个月的小婴儿。临床上轻症患者发热、呼吸困难等症状不重;中、重症者有较明显的呼吸困难、喘憋、口唇发绀、鼻煽及三凹征。发热可为低、中热或高热。肺部听诊满肺哮鸣音,伴有少量中、细湿啰音。

胸部 X 线表现主要以肺间质病变为主，两肺可见小点片状、斑片状阴影，部分患儿有不同程度的肺气肿。外周血白细胞总数大多正常。腺病毒肺炎的特点：腺病毒肺炎是我国小儿死亡率最高的病毒性肺炎。起病急骤、高热持续时间长、中毒症状重、啰音出现较晚、X 线改变较肺部体征出现早，易合并心肌炎和心力衰竭等多器官衰竭。

标签：

102. 女，19 岁。近 3 个月至少每周 2 次因情绪波动而暴饮暴食，每次摄入量常人 4~5 倍的量，无法自控。过后又担心发胖采用催吐的方法将食物全部吐出。暴食后出现内疚自责，甚至自杀观念。体重无明显下降。该患者的诊断是

- A. 躁狂发作
- B. 神经性贪食
- C. 神经性呕吐
- D. 神经性厌食
- E. 抑郁发作

答案：B

解析：躁狂发作以心境高涨为主，与题干描述不符。神经性贪食是一种进食障碍，特征为反复发作和不可抗拒的摄食欲望及暴食行为，患者有担心发胖的恐惧心理，常采取引吐、导泻、禁食等极端措施以消除暴食引起的发胖。神经性呕吐又称心因性呕吐，以反复发作的呕吐为特征，无器质性病变作为基础，常与心理社会因素有关。神经性厌食指个体通过节食等手段，有意造成并维持体重明显低于正常标准为特征的一种进食障碍。抑郁发作是以抑郁为特征的状态。

标签：

103. 男，50 岁。双下肢痉挛性瘫痪伴肋间神经痛。该患者病变最可能位于

- A. 颈髓
- B. 胸髓
- C. 腰骶髓
- D. 圆锥部
- E. 马尾

答案：B

解析：本题考核脊髓各节段解剖及功能分布。双下肢痉挛性瘫痪提示上运动神经元损伤，病变最可能位于胸髓。

标签：

104. 女，42 岁。头痛伴行走不稳 2 个月。查体：视盘水肿，闭目难立征(+)。B 超示右肾一囊性肿物，头颅 CT 发现左小脑半球囊性占位性病变。其病变性质最可能的是

- A. 脑膜瘤

- B. 转移瘤
- C. 脑脓肿
- D. 星形细胞瘤
- E. 血管网状细胞瘤

答案:E

解析:本题考核小脑半球常见肿瘤。B 超示肾囊性肿瘤,考虑 VHL 综合征相关小脑血管网状细胞瘤的可能。

标签:

105. 男, 32 岁。发热、头痛、全身抽搐 3 天。有糖尿病病史。查体:神志清楚, 时间、地点定向差, 有烦躁不安和激越。脑神经检查基本正常, 颈软, 四肢肌张力对称, 肌力 5 级, 右下肢巴宾斯基征(+). 感觉检查不合作。查体过程中发生一次持续 2 分钟的部分性痫性发作。该患者的临床诊断可能是

- A. 脑膜瘤
- B. 脑叶出血
- C. 单纯疱疹脑炎
- D. 结核性脑膜炎
- E. 新型隐球菌性脑膜炎

答案:C

解析:本题是综合应用题, 主要考核单纯疱疹脑炎的诊断与鉴别诊断。

标签:

A3/A4 型选择题

(106-1~106-2 题共用题干)

女, 28 岁。身高 156cm, 体重 75kg。婚后 4 年未孕, 月经周期 4~5 天/2~3 个月, 量偏少。面部可见痤疮, 阴毛分布呈男性型。妇科检查:子宫未见异常, 双侧卵巢稍大。基础体温单相。

106. 该患者最可能的诊断是

- A. 生殖器结核
- B. 卵巢早衰
- C. 子宫内膜异位症
- D. 多囊卵巢综合征
- E. 黄体功能不足

答案:D

解析:多囊卵巢综合征的临床表现:①月经失调, 为最主要症状, 多表现为月经稀发或闭经, 闭经前常有月经过少或月经稀发; ②不孕; ③多毛、痤疮; ④肥胖; ⑤黑棘皮症。基础体温测定表现为单相型基础体温曲线, 检查可见双侧卵巢增大。该患者 BMI 为 30.8, 结合其相关表现, 初步诊断为多囊卵巢综合征。

标签:

107. 该患者用氯米芬治疗，最需要注意防止的并发症是

- A. 卵巢早衰
- B. 卵巢过度刺激综合征
- C. 肝肾功能损害
- D. 盆腔炎性疾病
- E. 未破裂卵泡黄素化综合征

答案:B

解析:氯米芬适用于无排卵或月经稀发导致不孕,且患者有生育要求,血PRL正常者;诱发排卵时易发生卵巢过度刺激综合征,需严密监测,加强预防。

标签:

(108-1~108-5 题共用题干)

女,30岁。进行性痛经8年,婚后5年未孕。妇科检查:子宫大小正常,后位,固定,盆底可触及多个痛性结节,右侧附件区触及直径约6cm的囊性包块,不活动。左侧附件区组织略增厚。

108. 首先考虑的诊断是

- A. 盆腔结核
- B. 原发性痛经
- C. 慢性盆腔炎
- D. 子宫内膜异位症
- E. 卵巢肿瘤

答案:D

解析:进行性痛经、不孕、盆底可触及多个痛性结节、右侧附件区触及直径约6cm的囊性包块,最可能是子宫内膜异位症。

标签:

109. 首选的治疗方案是

- A. 孕激素治疗
- B. 手术治疗
- C. 抗炎治疗
- D. 抗结核治疗
- E. 镇痛治疗

答案:B

解析:子宫内膜异位症的手术指征:较大的卵巢内膜异位囊肿、药物治疗不能缓解的盆腔疼痛和不孕。考虑此妇女已30岁,婚后5年未孕,应行保留生育功能的手术治疗。

标签:

110. 女,60岁。阴道脱出物3个月。查体:屏气用力时子宫颈及部分子宫体脱出阴道口外,子宫颈前唇有一溃疡。首选的治疗是

- A. 曼氏手术
- B. 经阴道子宫全切除术
- C. 阴道纵隔形成术
- D. 子宫托
- E. 腹腔镜圆韧带缩短术

答案:B

解析:经阴道全子宫切除术适用于年龄较大、无需考虑生育功能的患者。患者为II度重型子宫脱垂,无需保留子宫。

标签:

(111-1~111-2 题共用题干)

女,18岁,月经不规则2年。阴道大量流血2周,贫血貌。B超示子宫及双侧附件未见异常。血FSH、LH、T、PRL水平正常。

111. 该患者最可能的诊断是

- A. 子宫内膜癌
- B. 卵巢功能性肿瘤
- C. 子宫内膜异位症
- D. 功能失调性子宫出血
- E. 多囊卵巢综合征

答案:D

解析:患者为18岁女性,初潮后月经紊乱,体检子宫及双侧附件未见异常,最可能诊断为功能失调性子宫出血。

标签:

112. 经过治疗血止住并撤退性出血后,首选的治疗是

- A. 氯米芬促排卵治疗
- B. 雌孕激素序贯疗法
- C. 雌激素治疗
- D. 孕激素治疗
- E. 雄激素治疗

答案:B

解析:青春期及生育年龄功能失调性子宫出血以止血、调整周期、促排卵为主。应用性激素止血后,必须调整月经周期。雌孕激素序贯疗法即人工周期,适用于青春期功能失调性子宫出血的患者。

标签:

(113-1~113-2 题共用题干)

女,24岁。停经6周诊断为早孕,行人工流产术,吸宫后探子宫腔发现探不到子宫底,出血不多。自述心悸,伴轻度腹痛及恶心。

113. 该患者最可能的诊断是

- A. 羊水栓塞

- B. 葡萄胎
- C. 人工流产综合反应
- D. 子宫穿孔
- E. 子宫畸形

答案:D

解析:人工流产手术时突感无子宫底感觉,或手术器械进入深度超过原来所测深度,提示子宫穿孔。

标签:

114. 此时该患者首选的处理方法是

- A. 继续手术, 清空子宫
- B. 静脉注射阿托品
- C. 暂停手术, 密切观察病情
- D. 立即行剖腹探查术
- E. 吸氧, 给予升压药

答案:C

解析:诊断为子宫穿孔时,应立即暂停手术。穿孔小,无脏器损伤或内出血,手术已完成,可注射子宫收缩剂保守治疗,并给予抗生素预防感染,同时密切观察血压、脉搏等生命体征。期别 临床分期 I 期 癌灶局限在子宫颈(包括累及子宫体)IA 镜下浸润癌,间质浸润深度 <5mm,宽度 <7mmIA1 间质浸润深度 <3mm,宽度 <7mmIA2 间质浸润深度>3mm 且 <5mm,宽度 <7mmIB 肉眼可见癌灶局限于子宫颈,或显微镜下可见病变>IAIB1 肉眼可见癌灶最大直径 <4cmIB2 肉眼可见癌灶最大直径>4cmII 期 癌灶已超出子宫,但未达盆壁或未达阴道下 1/3II A 肿瘤侵犯阴道上 2/3,无明显子宫旁浸润II B 有明显宫旁浸润,但未达盆壁III 期 癌肿扩散盆壁和/或累及阴道下 1/3,和/或导致肾盂积水或无功能肾IIIA 癌累及阴道下 1/3,但未达盆壁IIIB 癌扩展到骨壁,或有肾盂积水或无功能肾IVA 肿瘤侵犯邻近的盆腔器官IVB 远处转移

标签:

(115-1~115-2 题共用题干)

男孩,6岁。身高80cm,智能落后,仅能数1~20个数。体检:皮肤粗糙,毛发枯干,表情呆板,腹隆,四肢短小,骨龄摄片仅有4枚骨化核。

115. 为确诊应做的检查是

- A. 智能测定
- B. 血清 T3、T4、TSH 测定
- C. 尿甲苯胺蓝试验
- D. 尿三氯化铁试验
- E. 血清生长激素测定

答案:B

解析:根据题中患儿身高 80cm(身材矮小),智能落后,仅能数 1~20 个数,皮肤粗糙,毛发枯干,表情呆板,腹隆,四肢短小,骨龄摄片仅有 4 枚骨化核(骨龄落后),首先要考虑先天性甲状腺功能减退症,所以要做血清 T3、T4、TSH 测定。

标签:

116. 患儿确诊后治疗应选用

- A. 低苯丙氨酸饮食
- B. 低铜饮食
- C. 生长激素
- D. 甲状腺素
- E. 脑活素、吡拉西坦(脑复康)

答案:D

解析:患儿考虑为先天性甲状腺功能减退症,确诊后需终身治疗。首选甲状腺素制剂,一般从小剂量开始,待临床症状改善、血清 T4 和 TSH 正常,以维持量长期使用。

标签:

(117-1~117-3 题共用题干)

男,68 岁。2 个月前因妻生病住院出现焦虑不安、情绪低落、兴趣减退、失眠早醒,日渐变得反应迟钝,行动迟缓,料理家务能力也下降。妻子病愈出院已 1 个月,但患者病情不见好转,怀疑自己患了不治之症,且听见“医院”二字就感到紧张、恐惧、害怕。既往史阴性。入院查体:神清合作,生命体征正常,心肺未见异常,神经系统检查未见异常。ECG 正常,EEG 轻度异常,头颅 MRI 显示左侧基底核有一点状腔隙梗死灶。精神检查:未引出任何精神病性症状,有上述情绪障碍,计算力、记忆减退,但常识、抽象思维、理解判断力正常。

117. 该患者精神状态最可能的诊断是

- A. 抑郁症
- B. 焦虑症
- C. 疑病症
- D. 脑器质性精神障碍
- E. 应激相关障碍

答案:A

解析:抑郁症首要症状为对日常活动兴趣显著减退,感到生活无意义,对前途悲观失望,常沉思过去不愉快的事,遇事常往坏处想,精神不振,脑力迟钝、反应缓慢,对工作、学习缺乏信心,自我评价下降,对赞扬、奖赏无相应情绪反应,不愿主动与别人交往。

标签:

118. 该患者首先要考虑的鉴别诊断是

- A. 抑郁症
- B. 焦虑症
- C. 疑病症
- D. 脑器质性精神障碍
- E. 应激相关障碍

答案:D

解析:脑器质性精神障碍时精神症状一般多发生于躯体疾病高峰期,亦偶有精神症状为首发者,精神症状多与躯体疾病的严重度相平行,即躯体疾病严重时精神症状明显,待躯体疾病好转后,精神疾病亦减轻;病程和预后主要取决于原发躯体疾病的状况及处理是否恰当;躯体疾病所致精神障碍患者除表现明显的精神症状外,多伴有躯体和/或神经系统的病理体征及实验室的阳性发现。

标签:

119. 下列治疗策略中首选

- A. 阿米替林+阿普唑仑
- B. 盐酸舍曲林+阿普唑仑
- C. 利培酮+阿普唑仑
- D. 促智药+阿普唑仑
- E. 心理治疗+阿普唑仑

答案:E

解析:抑郁症的治疗:①药物治疗,阿普唑仑属苯二氮类药物,具有同地西洋相似的药理作用,有抗焦虑、抗惊厥、抗抑郁、镇静、催眠及肌肉松弛等作用;②心理治疗,对有明显心理社会因素作用的抑郁症患者需行心理治疗。

标签:

(120-1~120-3 题共用题干)

男,34岁。近1个月来多次因阵发性恐惧、胸闷、濒死感在医院急诊科就诊,症状持续约半小时后消失。多次查血常规、心电图及头颅CT等未见明显异常。患者为此担心苦恼,但仍能坚持工作。

120. 最可能的诊断是

- A. 二尖瓣脱垂
- B. 甲状腺功能亢进症
- C. 疑病障碍
- D. 惊恐障碍
- E. 广泛性焦虑障碍

答案:D

解析:惊恐障碍简称惊恐症,是以反复出现显著的心悸、出汗、震颤等自主神经症状,伴以强烈的濒死感或失控感,害怕产生不幸后果的惊恐发作。结

合题中描述，患者为惊恐障碍的可能性大。

标签：

121. 长期治疗最适当的药物是

- A. 地西洋
- B. 甲巯咪唑
- C. 帕罗西汀
- D. 普萘洛尔
- E. 硝酸甘油

答案:C

解析:患者诊断为惊恐障碍，治疗药物主要是三环类抗抑郁药、SSRIs 类药物、苯二氮卓类、帕罗西汀属于 SSRIs，作用广谱，无依赖性，是长期治疗最适当的药物。

标签：

(122-1~122-2 题共用题干)

男，17 岁，高中生。怕出门，不愿见人，不去上课，纠缠父母出钱给自己做美容手术半年。原因是半年来反复照镜子发现自己的鼻子比以前变大了，难看了。说班上的同学都讥笑他，出门就感觉别人在说他，别人的眼光看他时很特别，能使他头痛。父母不愿出钱就说父母不关心他，不是父母亲生的，曾说要去亲子鉴定。

122. 如给予药物治疗，下列不属于抗精神病药的是

- A. 氟哌啶醇
- B. 三氟拉嗪
- C. 氟西汀
- D. 氯氮平
- E. 氟奋乃静

答案:C

解析:常见的抗精神病药:氯普噻吨、氯哌噻吨、氯丙嗪、硫利达嗪、奋乃静、三氟拉嗪、氟奋乃静、氟哌啶醇、舒必利、洛沙平；非典型抗精神病药:利培酮、奥氮平、喹硫平、氯氮平。C 为抗抑郁药。

标签：

123. 患者认为“不是父母亲生的，要去做亲子鉴定”属于

- A. 关系妄想
- B. 物理影响妄想
- C. 非血统妄想
- D. 被控制妄想
- E. 非幻觉性知觉障碍

答案:C

解析:非血统妄想是指患者毫无依据地坚信自己的父母不是亲生的，虽经反

复解释和证实，仍坚信不疑。患者有时认为自己是被抱养或被寄养的，但又说不清从何时、为什么与现在的父母生活在一起。多见于精神分裂症。

标签：

(124-1~124-3 题共用题干)

女，46岁，公司经理。自述昨晚11点突然感到紧张、胸闷、心悸、头晕、气短、出汗，出现濒死感，被送来急诊。既往3个月上述症状发生过3次，每次持续半小时左右，症状未发作时能正常处理公司业务，但总担心再次发病。查体：BP150/80mmHg。

124. 该患者最可能的诊断是

- A. 急性左心衰竭
- B. 心绞痛
- C. 惊恐发作
- D. 自发性气胸
- E. 精神分裂症复发

答案：C

解析：惊恐发作的典型表现常是患者在日常活动中，突然出现强烈恐惧，好像即将要死去(濒死感)或即将失去理智(失控感)，使患者难以忍受。同时患者感到心悸，好像心脏要从口腔跳出来，有胸闷、胸痛、气急、喉头堵塞窒息感。

标签：

125. 如患者没有其他基础性疾病，排除心脏疾病，该患者最可能是惊恐发作。为明确诊断，需要做如下检查。

- A. 心电图
- B. 超声心动图
- C. 冠状动脉造影
- D. 胸部X线检查
- E. 心理测量

答案：A

解析：患者有紧张、胸闷、心悸、头晕、气短、出汗，出现濒死感，需做心电图、超声心动图和冠状动脉造影，排除心脏突发疾病；应做心理测量排除是否为心理疾病所引起的上述症状。胸部X线检查针对慢性呼吸系统疾病有诊断作用。

标签：

126. 该患者目前最合适的处理是

- A. 静脉滴注硝普钠
- B. 静脉滴注硝酸甘油
- C. 请精神科医师会诊
- D. 吸氧

E. 口服地西洋(安定)

答案:C

解析:患者属于精神科疾病, 应请精神科医师会诊, 由精神科诊断。

标签:

B1 型选择题

(127-1~127-2 题共用备选答案)

- A. 第二产程停滞
- B. 第二产程延长
- C. 活跃期停滞
- D. 活跃期延长
- E. 潜伏期延长

127. 初产妇, 24 岁。宫口开全 3 小时 10 分钟尚未分娩。此时的诊断是

答案:B

解析:第二产程是指从宫口开全(10cm)至胎儿娩出的时间, 初产妇超过 3 小时, 经产妇超过 2 小时, 称为第二产程延长, 故本例应诊断为第二产程延长(B)。

标签:

128. 初产妇, 26 岁。妊娠 38 周, 凌晨 3 点出现规律宫缩, 19 时 30 分宫口开大 2cm。此时的诊断是

答案:E

解析:潜伏期是指从临产规律宫缩开始至宫口扩张 3cm, 初产妇正常约需 8 小时, 超过 16 小时称为潜伏期延长。本例潜伏期已达 16 小时 30 分钟(凌晨 3 时→19 时 30 分), 故应诊断为潜伏期延长(E)。第二产程达 1 小时胎头下降无进展, 称为第二产程停滞。进入活跃期后, 宫口不再扩张达 4 小时以上, 称为活跃期停滞。初产妇活跃期正常需 4 小时, 超过 8 小时称为活跃期延长。

标签:

(129-1~129-2 题共用备选答案)

- A. 雌激素
- B. 孕激素
- C. 雄激素
- D. 甲硝唑
- E. 克霉唑

129. 治疗外阴阴道念珠菌病宜选用

答案:E

解析:克霉唑为广谱抗真菌药, 局部用药可治疗各种浅部真菌感染, 如外阴阴道念珠菌病(E)。

标签:

130. 治疗滴虫阴道炎宜选用

答案:D

解析:滴虫阴道炎的治疗首选甲硝唑口服(D)。补充雌激素常用于治疗萎缩性阴道炎。局部涂擦孕激素(黄体酮油膏)、雄激素(丙酸睾酮油膏),常用于治疗外阴硬化性苔癣。

标签:

(131-1~131-2 题共用备选答案)

- A. 宫缩时胎头受压
- B. 胎儿受镇静药物影响
- C. 宫缩时脐带受压, 兴奋迷走神经
- D. 胎儿缺氧
- E. 胎儿状况良好

131. 胎心减速出现在宫缩高峰后, 下降慢, 持续时间长, 恢复慢, 临床提示的情况是

答案:D

解析:胎心一过性变化中的减速分为:①早期减速, 减速与宫缩同步, 下降幅度 $<50\text{bpm}$ , 形态一致。持续时间短, 恢复快。是由于胎头下降受压, 继发性迷走神经活动增强所致; ②变异减速, 与宫缩无恒定关系, 下降快, 恢复也快。一般认为宫缩时脐带受压兴奋迷走神经引起; ③晚期减速, 常发生于宫缩顶峰之后 15 秒, 与宫缩不同步; 胎心率基线常偏高, 变异减少或消失, 下降缓慢, 恢复亦慢。是由于胎盘功能不良, 胎儿缺氧, 心肌抑制所致。

标签:

132. 胎心率减速与宫缩无固定关系, 下降迅速且下降幅度大, 恢复也迅速, 临床提示的情况是

答案:C

解析:胎心一过性变化中的减速分为:①早期减速, 减速与宫缩同步, 下降幅度 $<50\text{bpm}$ , 形态一致。持续时间短, 恢复快。是由于胎头下降受压, 继发性迷走神经活动增强所致; ②变异减速, 与宫缩无恒定关系, 下降快, 恢复也快。一般认为宫缩时脐带受压兴奋迷走神经引起; ③晚期减速, 常发生于宫缩顶峰之后 15 秒, 与宫缩不同步; 胎心率基线常偏高, 变异减少或消失, 下降缓慢, 恢复亦慢。是由于胎盘功能不良, 胎儿缺氧, 心肌抑制所致。

标签:

(133-1~133-2 题共用备选答案)

- A. 青霉素
- B. 头孢安定
- C. 阿奇霉素
- D. 氧氟沙星

E. 多西环素

133. 孕妇感染梅毒首选的治疗药物是

答案:A

解析:孕妇感染梅毒首选青霉素治疗,妊娠早期治疗可避免胎儿感染;妊娠中晚期治疗可使感染儿在出生前治愈。

标签:

134. 孕妇生殖道感染沙眼衣原体首选的治疗药物是

答案:C

解析:孕妇生殖道感染沙眼衣原体首选阿奇霉素,禁用多西环素、喹诺酮类和四环素。

标签:

(135-1~135-2 题共用备选答案)

A. 直接或间接传播

B. 飞沫传播

C. 内源性感染

D. 血液传播

E. 垂直传播

135. 滴虫阴道炎的主要感染方式是

答案:A

解析:滴虫阴道炎的感染方式有:①性交直接传播(主要);②公共浴室、浴盆、浴巾、游泳池、坐便器、衣物等间接传播;③污染的医用材料及敷料传播等。

标签:

136. 外阴阴道假丝酵母菌病的主要感染方式是

答案:C

解析:外阴阴道假丝酵母菌除寄生在阴道外,还可寄生于人的口腔、肠道,这三个部位的念珠菌可互相自身传染,这是主要感染方式。

标签:

(137-1~137-3 题共用备选答案)

A. 60~90ml/kg

B. 150~180ml/kg

C. 50~60ml/kg

D. 90~120ml/kg

E. 120~150ml/kg

137. 重度窒息新生儿推迟喂养,第一天静脉补液的量是

答案:C

解析:重度窒息患儿第一天补液量为 50~60ml/kg,若患儿在血气正常后,出现低血容量表现时,可用全血或血浆每次 10ml/kg 静脉滴注。轻度、中度、

重度脱水第一天补液量分别为 90~120ml/kg, 120~150ml/kg, 150~180ml/kg, 包括累积损失量、继续损失量和生理需要量。

标签:

138. 患儿腹泻, 中度脱水, 第一天静脉补液的量是

答案:E

解析:重度窒息患儿第一天补液量为 50~60ml/kg, 若患儿在血气正常后, 出现低血容量表现时, 可用全血或血浆每次 10ml/kg 静脉滴注。轻度、中度、重度脱水第一天补液量分别为 90~120ml/kg, 120~150ml/kg, 150~180ml/kg, 包括累积损失量、继续损失量和生理需要量。

标签:

139. 患儿腹泻, 重度脱水, 第一天静脉补液的量是

答案:B

解析:重度窒息患儿第一天补液量为 50~60ml/kg, 若患儿在血气正常后, 出现低血容量表现时, 可用全血或血浆每次 10ml/kg 静脉滴注。轻度、中度、重度脱水第一天补液量分别为 90~120ml/kg, 120~150ml/kg, 150~180ml/kg, 包括累积损失量、继续损失量和生理需要量。

标签:

(140-1~140-2 题共用备选答案)

- A. 左侧卧位
- B. 膝胸位
- C. 截石位
- D. 蹲位
- E. 弯腰前俯位

140. 直肠指检和结肠镜检查常用的体位是

答案:A

解析:左侧卧位是直肠指检和结肠镜检查常用的体位。蹲位是取下蹲排大便姿势, 用于检查内痔、脱肛和直肠息肉等。膝胸位是检查直肠肛管的最常用体位, 亦是前列腺按摩的常规体位。截石位是直肠肛管手术的常用体位, 需要做双合诊时亦选择该体位。弯腰前俯位是肛门视诊最常见的体位。

标签:

141. 可看到内痔和脱肛状况的最佳体位是

答案:D

解析:左侧卧位是直肠指检和结肠镜检查常用的体位。蹲位是取下蹲排大便姿势, 用于检查内痔、脱肛和直肠息肉等。膝胸位是检查直肠肛管的最常用体位, 亦是前列腺按摩的常规体位。截石位是直肠肛管手术的常用体位, 需要做双合诊时亦选择该体位。弯腰前俯位是肛门视诊最常见的体位。

标签:

(142-1~142-2 题共用备选答案)

- A. 致病性大肠埃希菌肠炎
- B. 轮状病毒性肠炎
- C. 生理性腹泻
- D. 细菌性痢疾
- E. 金黄色葡萄球菌肠炎

142. 多继发于长期使用广谱抗生素的是

答案:E

解析:长期使用广谱抗生素可使肠道正常菌群失调,金黄色葡萄球菌、铜绿假单胞菌等可大量繁殖,引起抗生素相关性腹泻。轮状病毒性肠炎是我国北方秋、冬季儿童腹泻最常见的病原体。

标签:

143. 多发生在秋、冬季的是

答案:B

解析:长期使用广谱抗生素可使肠道正常菌群失调,金黄色葡萄球菌、铜绿假单胞菌等可大量繁殖,引起抗生素相关性腹泻。轮状病毒性肠炎是我国北方秋、冬季儿童腹泻最常见的病原体。儿科疾病

标签:

(144-1~144-2 题共用备选答案)

- A. 强迫性思维
- B. 思维奔逸
- C. 联想散漫
- D. 强制性思维
- E. 思维贫乏

144. 患者体验到脑内概念不断涌现,一个意念接着一个意念。该症状为

答案:B

解析:思维奔逸是一种兴奋性的联想障碍,即指思维联想速度加快、数量增多。患者联想加速,思潮澎湃,新的概念一个接一个不断地涌现出来。此时患者思维进程虽然快,但方向却不固定,易受环境影响而离开主题,转移到新接触的事物上去。强迫性思维是指患者脑海中反复多次出现某一观念或概念,伴有主观的被强迫感觉和痛苦感。患者完全能够意识到这一思想是不必要的,或者是荒谬的,并力图把这些想法从脑海中驱赶出去,但对这种思想并不能自由地加以干涉或控制。

标签:

145. 患者反复出现一些想法,明知不必要或不合理,但无法控制。该症状为

答案:A

解析:思维奔逸是一种兴奋性的联想障碍,即指思维联想速度加快、数量增多。患者联想加速,思潮澎湃,新的概念一个接一个不断地涌现出来。此时患者思维进程虽然快,但方向却不固定,易受环境影响而离开主题,转移到

新接触的事物上去。强迫性思维是指患者脑海中反复多次出现某一观念或概念，伴有主观的被强迫感觉和痛苦感。患者完全能够意识到这一思想是不必要的，或者是荒谬的，并力图把这些想法从脑海中驱赶出去，但对这种思想并不能自由地加以干涉或控制。

标签:

(146-1~146-2 题共用备选答案)

- A. 双侧瞳孔等大，光反应存在
- B. 双侧瞳孔散大，光反应消失
- C. 一侧瞳孔散大，暗室中略缩小，光反应迟钝，对侧瞳孔无异常，光反应存在
- D. 一侧瞳孔散大，光反应消失，对侧瞳孔无异常，光反应迟钝
- E. 双侧瞳孔缩小，光反应迟钝

146. 重症肌无力患者瞳孔检查为

答案:A

解析:重症肌无力为骨骼肌(横纹肌)的乙酰胆碱突触处的免疫性疾病。出现全身骨骼肌无力，不影响瞳孔括约肌，所以选项 A 为正确答案。

标签:

147. 一侧基底核出血造成小脑幕疝，瞳孔检查为

答案:D

解析:基底核脑出血可造成昏迷，出血侧瞳孔散大、光反应消失，对侧瞳孔无异常，即双侧瞳孔不等大，这表明无幕疝形成。正确答案为 D。选项 B、C、E 为迷惑选项。选项 C 为强直性瞳孔的表现。选项 B 为药物中毒(阿托品类)、深昏迷等各种疾病的表现。选项 E 为药物中毒(吗啡类、毒扁豆碱、新斯的明等)的表现。

标签:

(148-1~148-3 题共用备选答案)

- A. 分水岭脑梗死
- B. 短暂性脑缺血发作
- C. 脑栓塞
- D. 脑血栓形成
- E. 腔隙性脑梗死

148. 导致脑梗死最常见的病因是

答案:D

解析:导致脑梗死最常见的病因是脑血栓形成，占 50%~60%(D)。

标签:

149. 相邻两血管供血区分界处缺血所导致的卒中类型是

答案:A

解析:分水岭脑梗死是指脑内相邻动脉供血区之间的边缘带发生的脑梗死(A)。

短暂性脑缺血发作是由于局部脑或视网膜缺血引起的短暂性神经功能缺损。腔隙性脑梗死是指大脑半球或脑干深部的小穿通动脉，在长期高血压等危险因素基础上，血管壁发生病变，最终管腔闭塞，导致脑组织缺血引起的脑梗死。

标签：

