

2021 年 5 月临床执业医师月度考试（第二单元）

- 1、（A1 型选择题）腹股沟深环位于
- A. 股骨沟中点上方
 - B. 腹股沟中点下方 2cm
 - C. 腹股沟中点
 - D. 腹股沟中点下方 1cm
 - E. 腹股沟中点上方 2cm
- 2、（A1 型选择题）职业中毒诊断前提和基本条件是
- A. 病史和临床检查
 - B. 生成环境调查
 - C. 接触有害物质的时间
 - D. 病理证实
 - E. 职业史及劳动卫生条件
- 3、（A1 型选择题）主动脉瓣狭窄时心脏震颤出现在
- A. 胸骨右缘第 2 肋间，收缩期

B.胸骨左缘第 2 肋间，连续性

C.胸骨左缘第 2 肋间，收缩期

D.胸骨左缘第 2 肋间，舒张期

E.胸骨右缘第 2 肋间，舒张期

4、（A1 型选择题）县药品监督管理部门接到某药店将保健食品作为药品出售给患者的举报后，立即对该药店进行了查处，并依照《药品管理法》的规定，将其销售给患者的保健食品认定为

A.假药

B.按假药论处的药

C.食品

D.劣药

E.按劣药论处的药

5、（A1 型选择题）参与经典途径激活补体的是

A.IgE

B.LPS

C.IgD

D.IgM

E.IgA

6、（A1 型选择题）判断小儿支气管肺炎严重程度的指标是

A.白细胞高低

B.有无累及其他系统

C.呼吸频率

D.胸片显示程度

E.感染菌群

7、（A1 型选择题）类风湿关节炎治疗改善病情的抗风湿药联合治疗方案是

A.甲氨蝶呤+来氟米特

B.双氯芬酸钠+来氟米特

C.甲氨蝶呤+硫酸氨基葡萄糖

D.对乙酰氨基酚+硫酸氨基葡萄糖

E.双氯芬酸钠+泼尼松

8、（A1 型选择题）人重度肥胖是指体重至少超过标准体重的

A.10%

B.20%

C.30%

D.40%

E.50%

9、（A1 型选择题）初产妇总产程不超过

A.14 小时

B.16 小时

C.18 小时

D.20 小时

E.22 小时

10、（A1 型选择题）病原为真核细胞型微生物的疾病是

A.传染性单核细胞增多症

B.水痘

C.结核

D.鹅口疮

E.霍乱

11、（A1 型选择题）卵巢动静脉通过的韧带是

A.圆韧带

B.主韧带

C.宫骶韧带

D.骨盆漏斗韧带

E.阔韧带

12、（A1 型选择题）国家实行特殊管理的药品不包括

A.疫苗

B.麻醉药品

C.精神药品

D.医疗用毒性药品

E.放射性药品

13、（A1 型选择题）最易形成潜伏感染的病毒是

A.麻疹病毒

B.流感病毒

- C. 脊髓灰质炎
- D. 狂犬病
- E. 水痘-带状疱疹病毒

14、（A1 型选择题）下列疾病中，持续性干咳而胸部 X 线片正常的情况最常见的是

- A. 心力衰竭
- B. 慢性支气管炎
- C. 支气管哮喘
- D. 支气管扩张
- E. 支气管结核

15、（A1 型选择题）胎头矢状缝与骨盆入口右斜径一致的胎位是

- A. 枕左后
- B. 枕右前
- C. 枕左横
- D. 枕左前
- E. 枕右横

16、（A1 型选择题）伤寒最严重的并发症是

- A.肠出血
- B.心肌炎
- C.中毒性肝炎
- D.肺炎
- E.肠穿孔

17、（A1 型选择题）肝脏的血液供应中来自门静脉的约占

- A.30%~40%
- B.40%~50%
- C.50%~60%
- D.60%~65%
- E.70%~75%

18、（A1 型选择题）严重胸腹联合损伤后，必须首先处理的是

- A.呼吸骤停
- B.粉碎性胸腰椎骨折
- C.急性弥漫性腹膜炎

D.闭合性液气胸

E.轻度血压下降

19、（A1 型选择题）关于子宫，正确的是

A.成年的子宫长 7~8cm，宽 4~5cm,厚 4~5cm

B.子宫体与子宫颈的比例，成年人为 1 : 2

C.子宫峡部的上端是组织学内口

D.子宫体与子宫颈之间形成最狭窄的部分为子宫峡部

E.经产妇的子宫颈外口是圆形

20、（A1 型选择题）医师考核不合格者，县级以上人民政府卫生行政部门可以责令其暂停执业活动

A.1~3 个月

B.3~6 个月

C.6~9 个月

D.5~12 个月

E.12 个月以上

21、（A1 型选择题）诊断低位肠梗阻最可靠的证据是

- A.阵发性腹痛伴腹胀
- B.脐周可闻气过水音
- C.腹部平片示小肠多个阶梯状气液平
- D.置胃管行胃肠减压后梗阻症状明显减轻
- E.频繁呕吐、呕吐量大

22、（A1 型选择题）抑制体内环氧酶活性的药物是

- A.施慧达
- B.卡托普利
- C.阿司匹林
- D.雷米替丁
- E.缬沙坦

23、（A1 型选择题）一般头皮裂伤清创的时限不应超过

- A.8 小时
- B.12 小时
- C.24 小时
- D.36 小时

E.48 小时

24、（A1 型选择题）小儿疱疹性咽峡炎的病原体是

A.鼻病毒

B.柯萨奇病毒

C.腺病毒

D.金黄色葡萄球菌

E.流感嗜血杆菌

25、（A1 型选择题）婴儿期“生理性贫血”的发生时间是

A.生后 1 个月

B.生后 2 个月

C.生后 2~3 个月

D.生后 3 个月

E.生后 4 个月

26、（A1 型选择题）右肾盂内 1.3cm 单发结石，静脉尿路造影显示右肾轻度积水，肾功能正常，首选的治疗方法是

A.药物治疗

B.经皮肾镜碎石

C.经输尿管镜碎石

D.体外冲击波碎石

E.肾盂切开取石

27、（A1 型选择题）慢性肾病继发甲状旁腺功能亢进的始动因素是

A.高磷血症

B.高钾血症

C.低钙血症

D.高尿酸血症

E.低代谢性碱中毒

28、（A1 型选择题）心房颤动时 f 波的频率为

A.250~300 次/分

B.<150 次/分

C.150~200 次/分

D.>600 次/分

E.350~600 次/分

29、（A1 型选择题）对感染艾滋病病毒的孕产妇无偿提供预防艾滋病母婴传播的服务是

- A. 无偿献血
- B. 家庭接生
- C. 产前指导
- D. 终止妊娠
- E. 基因诊断

30、（A1 型选择题）判断慢性胃炎有无活动的病理学依据是

- A. 浆细胞浸润
- B. 中性粒细胞浸润
- C. 淋巴滤泡形成
- D. 淋巴细胞浸润
- E. 肠上皮化生

31、（A1 型选择题）尿渗透压降低常见于

- A. 糖尿病
- B. 甲状旁腺功能亢进症

C.甲状腺功能亢进症

D.中枢性尿崩症

E.原发性醛固酮增多症

32、（A1 型选择题）淋病是何种类型的炎症

A.慢性化脓性炎症

B.急性化脓性炎症

C.急性变质性炎症

D.出血性炎

E.浆液性炎症

33、（A1 型选择题）胰腺癌最常见的组织类型为

A.导管细胞癌

B.腺泡细胞癌

C.多形性腺癌

D.纤维细胞腺癌

E.黏液癌

34、（A1 型选择题）炎症的基本病理变化是

- A.变性，坏死，增生
- B.萎缩，渗出，增生
- C.增生，坏死，纤维化
- D.变质，渗出，增生
- E.萎缩，变性，坏死

35、（A1 型选择题）心室颤动导致不可逆性脑损害，其发作至少持续

- A.1~3 分钟
- B.4~6 分钟
- C.30 秒
- D.7~9 分钟
- E.10 分钟

36、（A1 型选择题）骨折治疗原则中的首要步骤是

- A.功能锻炼
- B.内固定
- C.包扎
- D.复位

E.外固定

37、（A1 型选择题）慢性肺源性心脏病患者胸部 X 线片典型的心脏形态特征是

A.心脏普大

B.心脏向右扩大

C.心脏向左下扩大

D.心尖上翘

E.心腰部凹陷

38、（A1 型选择题）右心感染性心内膜炎最常见的栓塞部位是

A.冠状动脉

B.肾动脉

C.肺动脉

D.大脑中动脉

E.下肢动脉

39、（A1 型选择题）下列属于副交感神经作用的是

A.逼尿肌收缩

B.糖原分解增加

C.瞳孔增大

D.骨骼肌血管舒张

E.消化道括约肌收缩

40、（A1 型选择题）采用吲哚美辛治疗动脉导管未闭的最佳年龄段是

A.学龄前期

B.学龄期

C.青春期

D.幼儿期

E.新生儿期

41、（A1 型选择题）克罗恩病的主要手术指征是

A.营养不良、体重减轻

B.疑有恶变

C.持续性粪隐血阳性

D.严重腹泻

E.合并结肠息肉

42、（A1 型选择题）正常思维一般都具有

- A.目的性
- B.连贯性
- C.逻辑性
- D.实践性
- E.以上都对

43、（A1 型选择题）偏头痛的预防性治疗药物是

- A.苯噻啶
- B.英明格
- C.咖啡因麦角胺
- D.小剂量阿司匹林
- E.吲哚美辛

44、（A1 型选择题）甲状腺癌最常见的病理类型是

- A.滤泡状癌
- B.乳头状癌
- C.未分化癌

D.髓样癌

E.腺癌

45、（A1 型选择题）佝偻病颅骨软化多发生于

A.1~3 个月

B.9~12 个月

C.6~9 个月

D.3~6 个月

E.12 个月以上

46、（A1 型选择题）治疗社区获得性肺炎时，可覆盖非典型病原体的抗生素是

A.头孢菌素类

B.糖肽类

C.青霉素类

D.氨基糖苷类

E.大环内酯类

47、（A1 型选择题）有关Ⅲ度胎盘早剥的说法，错误的是

- A.剧烈腹痛后，阴道流血
- B.阴道出血量与全身症状不成正比
- C.无痛性阴道流血
- D.子宫板状
- E.子宫底升高

48、（A1 型选择题）脾破裂术前最重要的治疗措施是

- A.止痛
- B.应用止血药
- C.控制感染
- D.补充血容量
- E.补充营养

49、（A1 型选择题）慢性支气管炎早期最可能发生的肺功能改变是

- A.第一秒用力呼气量降低
- B.总肺活量升高
- C.用力呼气量降低
- D.残气量异常

E.小气道功能异常

50、（A1 型选择题）提示原发性肺结核病变恶化的病理转归是

A.结核性胸膜

B.原发病灶扩大，产生空洞

C.支气管淋巴结肿大

D.急性粟粒性肺结核

E.支气管淋巴结周围炎

51、（A1 型选择题）催化转录合成 RNA 的酶是

A.反转录酶

B.引物酶

C.RNA 聚合酶

D.DNA 指导的 RNA 聚合酶

E.拓扑异构酶

52、（A1 型选择题）子宫肌瘤的症状与下列关系密切的是

A.肌瘤的大小

B.肌瘤生长部位

C.发生年龄

D.肌瘤数目

E.肌瘤与肌层的关系

53、（A1 型选择题）必需脂肪酸与非必需脂肪酸的区别是

A.前者不能在人体内消化，而后者可以

B.后者不能在人体内消化，而前者可以

C.所含氮元素的量不一样

D.前者不能在人体合成，而后者可以

E.后者不能在人体合成，而前者可以

54、（A1 型选择题）正常脐带内含有

A.一条脐动脉，一条脐静脉

B.两条脐动脉，两条脐静脉

C.两条脐动脉，一条脐静脉

D.一条脐动脉，两条脐静脉

E.两条脐动脉

55、（A1 型选择题）肾性与中枢性尿崩症的鉴别方法是

- A.加压素试验
- B.测定尿渗透压和血钠
- C.测定尿渗透压和比重
- D.测定血浆和尿渗透压
- E.禁水（禁饮）试验

56、（A1 型选择题）中国人急性胰腺炎最常见的病因是

- A.药物
- B.病毒感染
- C.酗酒
- D.自身免疫
- E.胆道系统疾病

57、（A1 型选择题）关于糖皮质激素的抗炎作用，正确的叙述是

- A.促进创口愈合
- B.能提高集体的防御功能
- C.对抗各种原因，如物理、生物等引起的各种炎症
- D.抑制病原体生长

E.直接杀灭病原体

58、（A1 型选择题）二尖瓣狭窄最不可能引起的变化是

- A.左心房扩大
- B.右心房扩大
- C.左心室扩大
- D.左心房肥大
- E.右心室肥大

59、（A1 型选择题）尿毒症患者血液系统的临床表现为

- A.低色素小细胞性贫血
- B.白细胞出现中毒颗粒，核左移
- C.贫血常为中、重度
- D.血小板异常增多
- E.促红细胞生成素增加

60、（A1 型选择题）亚急性感染性心内膜炎最常见的致病菌是

- A.金黄色葡萄球菌
- B.草绿色链球菌

C.淋病奈瑟菌

D.肺炎球菌

E.肠球菌

61、（A1 型选择题）胃酸进入十二指肠后实现反馈抑制胃液分泌涉及的激素是

A.胃动素

B.胰泌素

C.胆汁

D.抑胃肽

E.促胰液素

62、（A1 型选择题）每次开处方，每张处方所包含的药品种类上限为

A.3 种

B.5 种

C.6 种

D.7 种

E.8 种

63、（A1 型选择题）本能冲动和被压抑愿望属于

- A.意识冲突
- B.前意识冲突
- C.潜意识冲突
- D.下意识冲突、
- E.意识控制

64、（A1 型选择题）有关脾破裂，以下不正确的是

- A.行脾切除术
- B.行脾缝合修补术
- C.可收集腹腔内出血行自家输血
- D.待失血性休克好转后手术
- E.白细胞计数升高

65、（A1 型选择题）有权批准医疗机构取得麻醉药品、第一类精神药品购用印鉴卡的部门是

- A.该区的县级人民政府卫生行政部门
- B.该区的市级人民政府卫生行政部门

C.该区的省级人民政府卫生行政部门

D.该区的市级公安部门

E.医学会

66、（A1 型选择题）临床预防服务的对象是

A.遗传病人

B.健康人

C.病房病人

D.传染病人

E.慢性病病人

67、（A1 型选择题）根据微生物的分类，新生隐球菌属于

A.细菌

B.立克次体

C.放线菌

D.真菌

E.支原体

68、（A1 型选择题）硅沉着病的特征性病理改变是

- A.圆形小阴影
- B.肺间质纤维化
- C.硅结节
- D.肺泡结构破坏
- E.肺脏体积增大，含气量减少

69、（A1 型选择题）判断疝是否绞窄的依据是

- A.疝内容物是否完全回纳
- B.疝局部是否有红肿或疼痛
- C.疝内容物是否有血循环障碍
- D.嵌顿时间的长短
- E.有无肠梗阻表现

70、（A1 型选择题）基因表达调控的主要环节是

- A.基因扩增
- B.翻译起始
- C.转录后加工
- D.转录起始

E.翻译后加工

71、（A2 型选择题）女，70 岁。反复咳嗽，咳痰 30 年，一周前呼吸道感染入院，自觉胸闷，增加吸氧浓度，出现昏睡，原因为

- A.气胸
- B.血氨升高
- C.脑器质病变
- D.二氧化碳潴留
- E.神经功能障碍

72、（A2 型选择题）女，27 岁，已婚。突发腹痛、阴道流血 1 天。血压 60/40mmHg。体检发现一侧下腹部持续剧烈疼痛，阴道后穹隆穿刺抽出不凝血。最有价值的体征是

- A.一侧下腹部持续性剧烈疼痛
- B.突发腹痛
- C.阴道后穹隆穿刺抽出不凝血
- D.阴道流血 1 天
- E.血压 60/40mmHg

73、（A2 型选择题）女，26 岁。活动后突然左下腹剧痛，伴有恶心、呕

吐。月经规律，末次月经为 8 天前。妇科检查:左侧附件区可触及手拳大小囊实性包块，触痛，推移后疼痛加剧。首先考虑为

- A. 卵巢黄体破裂
- B. 急性盆腔炎
- C. 卵巢囊肿蒂扭转
- D. 急性阑尾炎
- E. 输卵管妊娠破裂

74、（A2 型选择题）女，50 岁。因低位直肠癌行 Dixon 术，术后吻合口位于齿状上 1cm。患者术后最可能出现的情况是

- A. 排尿功能障碍
- B. 性功能障碍
- C. 排便功能完全正常
- D. 排便前无明显便意，排便控制不理想
- E. 排便前有便意，但不能控制排便

75、（A2 型选择题）患儿,18 天，过期产儿，出生时重 4.2kg，哭声低哑，反应迟钝，食量少，黄疸未退，便秘，体重低,腹胀。该患儿最可能的诊断是

- A. 先天愚型

- B. 苯丙酮尿症
- C. 甲状腺功能减退症
- D. 先天性巨结肠
- E. 黏多糖病

76、（A2 型选择题）男，42 岁。右下肢畏寒、疼痛间断发作 4 年。吸烟 8 年余。无高血压、糖尿病病史。查体：右下肢皮温降低，足背动脉搏动减弱。治疗措施中错误的是

- A. 戒烟
- B. 链激酶溶栓治疗
- C. 抗凝药物治疗
- D. 腰交感神经节切除术
- E. 高压氧舱治疗

77、（A2 型选择题）男，50 岁。间歇性肉眼血尿 3 个月余，IVP 见左肾盂内有不规则充盈缺损，膀胱镜检见左侧输尿管口喷血应首先考虑为

- A. 肾结核
- B. 肾盂癌
- C. X 线不显影肾结石

D.肾癌

E.肾炎

78、（A2型选择题）女，50岁。突发呼吸困难、胸痛、晕厥。查体：颈静脉充盈，肺动脉瓣区第二心音亢进。最可能的原因是

A.呼吸衰竭

B.左心衰竭

C.右心衰竭

D.冠心病

E.肺动脉栓塞

79、（A2型选择题）女，13岁。左胫骨近端疼痛2个月，呈进行性加重。X线片检查发现左胫骨干骺端骨膜反应呈“日光射线”形态。最可能的诊断是

A.骨囊肿

B.骨肉瘤

C.骨软骨瘤

D.骨结核

E.巨细胞瘤

80、（A2 型选择题）初孕妇，26 岁，规律宫缩 12 小时，羊膜囊完整，胎头 S=+1，胎心 140 次/分。对该患者的处理是

- A. 无需处理
- B. 立即行人工破膜
- C. 立即剖宫产
- D. 静脉滴注缩宫素
- E. 会阴剪切

81、（A2 型选择题）女，25 岁。乏力 3 个月。查体：BP170/105mmHg。实验室检查：Hb84g/L；尿常规：蛋白（++），颗粒管型 2~3/低倍视野；血 BUN12.3mmol/L，SCr276.8 μ mol/L。对该患者不应该采取的措施是

- A. 低磷饮食
- B. 控制血压
- C. 根据尿量适当限水
- D. 低钠饮食
- E. 高蛋白饮食

82、（A1 型选择题）女，71 岁。服用氟桂利嗪 3 个月后出现动作徐缓，僵硬，手部震颤，跌倒一次。美多丝肼治疗无效。查体：智能正常，面具脸，四肢

肌力正常，肌张力高。最可能的诊断是

- A.血管性帕金森综合征
- B.帕金森叠加综合征
- C.外伤性帕金森综合征
- D.药物性帕金森综合征
- E.原发性帕金森病

83、（A2 型选择题）女，20 岁。2 日来出现皮肤紫癜，以下肢为主，两侧对称，颜色鲜艳，高出皮肤表面，伴有腹痛，应诊断为

- A.血小板减少性紫癜
- B.急性白血病
- C.过敏性紫癜
- D.急性关节炎
- E.急腹症

84、（A2 型选择题）女，7 岁。肾病综合征初治，体重 25kg，泼尼松每次 25mg，每天 2 次。治疗 2 周后，水肿消失，4 周时尿蛋白转阴。此时判断该患儿疗效为

- A.激素部分敏感

- B.激素依赖
- C.激素敏感
- D.激素不耐受
- E.激素耐药

85、（A2 型选择题）女，38 岁。因患再生障碍性贫血入院治疗，既往曾多次输血。此时应考虑输注

- A.浓缩红细胞
- B.辐照红细胞
- C.全血
- D.去除白细胞的红细胞
- E.悬浮红细胞

86、（A2 型选择题）男，52 岁。糖尿病肾病伴高血压，BP170/100mmHg，心率 54 次/分，血肌酐 158 μ mol/L。最适宜的治疗药物组合是

- A.氢氯噻嗪、吲达帕胺
- B.美托洛尔、维拉帕米
- C.氨氯地平、缬沙坦

D.普萘洛尔、卡托普利

E.螺内酯、福辛普利

87、（A2 型选择题）女，4 岁。突起高热、畏寒 3 天，伴左膝关节肿痛就诊。查体：左侧膝关节红肿，压痛，活动时疼痛剧烈，浮髌试验（+）。下列处理欠佳的是

A.局部固定

B.大剂量静脉注射抗生素

C.关节内注射抗生素

D.立即切开引流

E.全身支持疗法

88、（A2 型选择题）女，30 岁。淋雨后寒战、发热 3 天。胸透示右下肺炎。血 WBC $12.3 \times 10^9/L$ 。该患者感染的病原菌最可能是

A.金黄色葡萄球菌

B.结核分枝杆菌

C.肺炎链球菌

D.流感嗜血杆菌

E.铜绿假单胞菌

89、（A2 型选择题）初孕妇，28 岁。妊娠 34 周，用胰岛素治疗糖尿病，今晨 5 时清醒，心慌、出汗。此时最有效的处理措施是

- A.检测血糖
- B.检测成糖及酮体
- C.静脉注射胰岛素
- D.进食
- E.测量体温

90、（A2 型选择题）男,30 岁。因发热、胸痛 5 天就诊。查体：T38.5°C，BP120/80mmHg,双肺呼吸音清，心界不大，心率 92 次/分，律齐，胸骨左缘 3、4 肋间可闻及抓刮样粗糙音，屏气时仍存在。该患者最可能的诊断是

- A.急性胸膜炎
- B.纤维蛋白性心包炎
- C.扩张型心肌病
- D.肥厚型心肌病
- E.病毒性心肌炎

91、（A2 型选择题）女，40 岁。间断咳嗽 2 年，每年均于秋季出现，干咳为主，夜间明显，伴憋气，常常影响睡眠，白天症状常不明显，使用多种药物

抗感染治疗无效，持续 1~2 个月后症状可自行消失。本次入秋后再次出现上述症状。体格检查未见明显异常。胸部 X 线片未见明显异常。通气功能正常。为明确诊断；宜采取的进一步检查措施是

- A. 支气管镜
- B. 睡眠呼吸监测
- C. 胸部 CT
- D. 血气分析
- E. 支气管激发试验

92、（A2 型选择题）男，35 岁。体检发现肝大。肝肋下 2cm，质地中等，表面光滑，边缘整齐无触痛，肝功能检查正常。最可能的诊断是

- A. 慢性肝炎
- B. 肝癌
- C. 肝棘球蚴病
- D. 肝硬化代偿期
- E. 肝腺瘤

93、（A2 型选择题）女，45 岁。左乳头溢液 10 余天，无不适症状。查体：乳房视诊无异常发现，未扪及肿块，无压痛，按压左乳晕外上方可见黄褐色溢

液。门诊首选的检查是

- A.热图像检查
- B.钼靶 X 线摄片
- C.B 型超声检查
- D.近红外线扫描
- E.溢液涂片细胞学检查

94、（A2 型选择题）女,40 岁。外伤致右胸积血，右侧呼吸音弱，叩诊为浊音，胸穿抽出混浊胸液。最应该采取的治疗措施是

- A.胸穿
- B.开胸止血
- C.胸腔闭式引流
- D.患肺切除术
- E.无需特殊处理

95、（A2 型选择题）女，30 岁。高处坠落导致胸背部疼痛，下肢感觉障碍，5 小时逐渐恢复。则最可能的诊断是

- A.脊髓休克

- B. 脊髓损伤
- C. 脊髓震荡
- D. 脊髓截断
- E. 脊髓水肿

96、（A2 型选择题）男，46 岁。间断干咳 3 年，无低热、咯血等。反复抗生素治疗无效。查体：无明显阳性体征。胸部 X 线片未见明显异常。最可能的诊断是

- A. 支原体肺炎
- B. 支气管结核
- C. 支气管扩张
- D. 慢性支气管炎
- E. 咳嗽变异性哮喘

97、（A2 型选择题）女，60 岁。上腹胀、隐痛 2 个月，伴食欲减退、乏力、消瘦、大便发黑。查体：消瘦，浅表淋巴结无肿大。上消化道钡剂造影见胃窦部小弯侧黏膜紊乱，可见直径 3.5cm 不规则充盈缺损，胃壁僵直。其最常见的转移途径是

- A. 胃肠道内转移

B.腹腔内种植

C.直接浸润

D.淋巴转移

E.血行转移

98、（A2型选择题）女,30岁。右小腿被撞伤,创口出血,骨外露24小时。X线片示右胫腓骨下段粉碎性骨折。最易出现的并发症是

A.坠积性肺炎

B.神经血管损伤

C.感染

D.骨筋膜室综合征

E.急性骨萎缩

99、（A2型选择题）女,45岁。慢性肾衰竭患者,饮食控制欠佳,突发抽搐,意识丧失,心搏骤停。死亡原因最可能是

A.代谢性酸中毒

B.高钾血症

C.心功能不全

D.高血压

E.尿毒症脑病

100、（A2 型选择题）女，51 岁。白带带血 1 个月。复查，宫颈中度糜烂，易出血，子宫大小质地正常，附件正常。阴道镜下多点活检报告为 CINⅢ。其处理恰当的是

A.子宫根治术

B.子宫全切术

C.诊断性刮宫

D.定期随访

E.激光治疗

101、（A2 型选择题）女，36 岁。刀刺伤右上腹 1 小时来诊，腹腔穿刺抽出不凝血，急诊手术探查。正确的腹腔探查顺序首先探查的是

A.胃十二指肠

B.膈肌

C.胃后壁及胰腺

D.肝脏

E.右肾

102、（A2 型选择题）女，45 岁，不慎右手被手榴弹炸伤 1 小时，包扎后就诊。查体：右小腿后不规则伤口长 4cm，肌肉破损、渗血，有弹片污染。宜采取的处理方法是

- A.洗伤口、止血加压包扎
- B.消毒、探查伤口后包扎
- C.清创、引流后延期缝合
- D.清创、引流缝合伤口
- E.清创缝合伤口

103、（A2 型选择题）女，50 岁。左乳房红肿、增大 1 个月，进展较快，无疼痛、发热。查体：左乳房红肿，局部温度略高，发硬，但未触及包块，左腋窝有肿大淋巴结，稍硬，活动度好，无压痛，血常规正常。最可能的诊断是

- A.乳房结核
- B.急性乳腺炎
- C.炎性乳腺癌
- D.导管内乳头状瘤
- E.乳腺增生症

104、（A2 型选择题）男，40 岁。腰腿痛 3 个月。查体：下腰椎旁压痛，左

下肢直腿抬高试验阳性（50°），加强试验阳性，外踝及足背外侧皮肤感觉减弱，踝反射消失。考虑为腰椎间盘突出症，最可能突出的间隙是

- A.L1~2
- B.L2~3
- C.L3~4
- D.L4~5
- E.L5~S1

105、（A2型选择题）女，26岁。停经19周，剧烈腹痛1天，超声提示单胎妊娠合并子宫肌壁间肌瘤，考虑该肌瘤为

- A.囊性变
- B.玻璃样变
- C.红色样变
- D.肉瘤样变
- E.钙化

106、（A2型选择题）男，30岁，个体户。有冶游史1周，2天前自觉尿痛、尿频，尿道口出脓。查体：尿道口有大量脓性分泌物。此时可能性最大的疾病是

- A.梅毒
- B.生殖器疱疹
- C.淋病
- D.天疱疹
- E.艾滋病

107、（A2 型选择题）男，60 岁。右侧阴囊逐渐增大 5 年，无疼痛。查体见右侧阴囊肿大，大小约 14cm×10cm，呈囊性，未触及睾丸，透光试验阳性。首先应该考虑的诊断是

- A.睾丸炎
- B.精索静脉曲张
- C.腹股沟斜疝
- D.睾丸鞘膜积液
- E.睾丸肿瘤

108、（A2 型选择题）初产妇，26 岁。妊娠 40 周，临产后产程进展顺利，胎头拨露时，胎心 110 次/分。应采取的措施是

- A.滴注稀释缩宫素
- B.立即剖宫产

- C.吸氧等待自然分娩
- D.用胎儿监护仪器检测是否缺氧
- E.会阴侧切，胎头吸引分娩

109、（A2 型选择题）男，55 岁。上腹疼痛伴反酸、烧心 15 年，近期出现体重下降。最有价值的检查是

- A.胃肠道造影检查
- B.CT 检查
- C.超声检查
- D.胃镜
- E.血清学检测

110、（A2 型选择题）女，50 岁。头颈部、双上肢浅Ⅱ烧伤。伤后第 3 天出现黑便，约 700ml。查体:P107 次/分,BP85/60mmHg。最可能的原因是

- A.胆道出血
- B.消化性溃疡出血
- C.应激性溃疡出血
- D.食管溃疡

E.慢性胃炎出血

111、（B1 型选择题）合并支气管哮喘的高血压患者不宜选用的是

- A.中枢交感神经抑制剂
- B.血管紧张素转换酶抑制剂
- C.β 受体阻断剂
- D.钙通道阻滞剂
- E.血管紧张素Ⅱ受体阻断剂

112、（B1 型选择题）无合并症的老年单纯收缩期高血压患者首选的降压药是

- A.中枢交感神经抑制剂
- B.血管紧张素转换酶抑制剂
- C.β 受体阻断剂
- D.钙通道阻滞剂
- E.血管紧张素Ⅱ受体阻断剂

113、（B1 型选择题）细菌性痢疾的渗出和坏死物形成的是

- A.增生

B.化生

C.渗出

D.转化

E.伪膜

114、（B1 型选择题）成纤维细胞损伤后转变为成骨细胞的是

A.增生

B.化生

C.渗出

D.转化

E.伪膜

115、（B1 型选择题）说明抗休克治疗时血容量仍不足的是

A.尿量少，CVP 很高

B.尿量少,CVP 很低

C.尿量多，CVP 较低

D.尿量多，CVP 偏高

E.尿量多，CVP 正常

116、（B1 型选择题）说明抗休克治疗时液体已补足的是

A.尿量少，CVP 很高

B.尿量少,CVP 很低

C.尿量多，CVP 较低

D.尿量多，CVP 偏高

E.尿量多，CVP 正常

117、（B1 型选择题）询问病史的道德要求是

A.全神贯注

B.精确操作

C.合理配伍

D.镇静从容

E.争分夺秒

118、（B1 型选择题）急救工作对医生的道德要求是

A.全神贯注

B.精确操作

C.合理配伍

D.镇静从容

E.争分夺秒

119、（B1 型选择题）药物治疗对医生的道德要求是

A.全神贯注

B.精确操作

C.合理配伍

D.镇静从容

E.争分夺秒

120、（B1 型选择题）急性肾小球肾炎的病理类型是

A.微小病变肾病

B.系膜增生性肾小球肾炎

C.硬化性肾小球肾炎

D.新月体性肾小球肾炎

E.毛细血管内增生性肾小球肾炎

121、（B1 型选择题）急进性肾小球肾炎的病理类型是

A.微小病变肾病

B.系膜增生性肾小球肾炎

C.硬化性肾小球肾炎

D.新月体性肾小球肾炎

E.毛细血管内增生性肾小球肾炎

122、（B1 型选择题）慢性阻塞性肺疾病（COPD）的氧疗最常用的是

A.无创机械通气

B.有创机械通气

C.间断高浓度吸氧

D.持续低流量吸氧

E.持续高频呼吸机通气

123、（B1 型选择题）COPD 急性加重伴呼吸功能不全早期，防止呼吸功能不全加重最常用的是

A.无创机械通气

B.有创机械通气

C.间断高浓度吸氧

D.持续低流量吸氧

E.持续高频呼吸机通气

124、（B1 型选择题）治疗滴虫性阴道炎宜选用的药物是

A.雌激素

B.孕激素

C.雄激素

D.甲硝唑

E.克霉唑

125、（B1 型选择题）治疗外阴阴道念珠菌病宜选用的药物是

A.雌激素

B.孕激素

C.雄激素

D.甲硝唑

E.克霉唑

126、（B1 型选择题）幼儿急疹的病原是

A.柯萨奇病毒

B.腺病毒

C. 带状疱疹病毒

D. 呼吸道合胞病毒

E. 人类疱疹病毒 6 型

127、（B1 型选择题）咽结合膜热的病原是

A. 柯萨奇病毒

B. 腺病毒

C. 带状疱疹病毒

D. 呼吸道合胞病毒

E. 人类疱疹病毒 6 型

128、（B1 型选择题）疱疹性咽峡炎的病原是

A. 柯萨奇病毒

B. 腺病毒

C. 带状疱疹病毒

D. 呼吸道合胞病毒

E. 人类疱疹病毒 6 型

129、（B1 型选择题）出现 Aschoff 细胞的是

- A.慢性肺源性心脏病
- B.高血压心脏病伴左心功能不全
- C.扩张型心肌病
- D.梅毒性心肌炎
- E.风湿性心脏病

130、（B1 型选择题）出现心衰细胞的是

- A.慢性肺源性心脏病
- B.高血压心脏病伴左心功能不全
- C.扩张型心肌病
- D.梅毒性心肌炎
- E.风湿性心脏病

131、（A3/A4 型选择题）男，30 岁。胃溃疡病史 3 年，今突发上腹剧痛、面色苍白、大汗。查体：全腹压痛，腹肌紧张，似穿孔。胃溃疡穿孔多见的部位是

- A.胃大弯
- B.胃小弯

- C.胃体
- D.胃窦
- E.胃底部

132、（A3/A4 型选择题）男，30 岁。胃溃疡病史 3 年，今突发上腹剧痛、面色苍白、大汗。查体：全腹压痛，腹肌紧张，似穿孔。急性穿孔诊断后手术治疗效果最好的时间是

- A.8 小时
- B.10 小时
- C.12 小时
- D.24 小时
- E.48 小时

133、（A3/A4 型选择题）男，30 岁。施工时左大腿开放伤，未发现骨折，行简单的创口缝合，2 天后感觉伤部包扎过紧，疼痛剧烈，患肢肿胀明显，缝合处血性液体渗出多，恶臭。该患者此时最可能的诊断为

- A.丹毒
- B.急性蜂窝织炎
- C.急性淋巴管炎

D.气性坏疽

E.伤口化脓感染

134、（A3/A4 型选择题）男，30 岁。施工时左大腿开放伤，未发现骨折，行简单的创口缝合，2 天后感觉伤部包扎过紧，疼痛剧烈，患肢肿胀明显，缝合处血性液体渗出多，恶臭。导致这种感染最主要的原因是

A.伤口包扎过紧

B.第一次清创不彻底

C.初次缝合创面止血不充分

D.未行静脉营养

E.未应用广谱抗生素

135、（A3/A4 型选择题）女，32 岁。G2P1，既往月经规律，月经量少，身体健康，要求长期采取避孕措施。首选的避孕方法是

A.紧急避孕药

B.宫内节育器

C.安全期避孕

D.长效口服避孕药

E.外用杀精子剂

136、（A3/A4 型选择题）女，32 岁。G2P1，既往月经规律，月经量少，身体健康，要求长期采取避孕措施。其避孕原理是

- A.阻止精子跟卵子相遇
- B.抑制卵巢排卵
- C.影响精子获能
- D.干扰受精卵着床
- E.改变宫颈黏液性状

137、（A3/A4 型选择题）女，50 岁。右腹股沟下方包块 3 年，平卧后可变小。4 小时前搬重物后，包块突然增大，并出现胀痛，逐渐加重。1 小时前出现右下腹阵发性绞痛。查体：表情痛苦，肠鸣音亢进，可闻及气过水声。右腹股沟下方可及 3cm×3cm 包块，触痛明显，无搏动感，平卧手法还纳未成功。如行外科治疗，传统术式中最常用的是

- A.Shouldice 法
- B.Ferguson 法
- C.Halsted 法
- D.Bassini 法
- E.McVay 法

138、（A3/A4 型选择题）女，50 岁。右腹股沟下方包块 3 年，平卧后可变小。4 小时前搬重物后，包块突然增大，并出现胀痛，逐渐加重。1 小时前出现右下腹阵发性绞痛。查体：表情痛苦，肠鸣音亢进，可闻及气过水声。右腹股沟下方可及 3cm×3cm 包块，触痛明显，无搏动感，平卧手法还纳未成功。处理疝囊后，一般将切断的腹股沟韧带修复缝合在

- A. 精索后方与联合腱上
- B. 精索前方下腹外斜肌腱膜上
- C. 耻骨肌筋膜上
- D. 精索后方与腹外斜肌腱膜上
- E. 精索前方与联合腱上

139、（A3/A4 型选择题）女，62 岁。胸闷、气促 2 周。查体：吸气时 BP85/60mmHg，呼气时 BP100/75mmHg，心尖搏动减弱，心界向两侧扩大，心率 125 次/分，律齐，心音低钝、遥远，心脏各瓣膜区未闻及杂音。与上述临床表现相符合的体征是

- A. DeMusset 征
- B. Corrigan 征
- C. Ewart 征
- D. Quincke 征

E.Traube 征

140、（A3/A4 型选择题）女，62 岁。胸闷、气促 2 周。查体：吸气时 BP85/60mmHg，呼气时 BP100/75mmHg，心尖搏动减弱，心界向两侧扩大，心率 125 次/分，律齐，心音低钝、遥远，心脏各瓣膜区未闻及杂音。最有助于确诊的辅助检查是

A.胸部 X 线片

B.动态血压监测

C.超声心动图

D.心电图

E.肺功能

141、（A3/A4 型选择题）女，26 岁。主诉心前区疼痛 2 小时，向左肩放射，吸气时疼痛加重，坐位时减轻，伴有畏寒、发热就诊。查体：血压 105/75mmHg，体温 38°C，心率 110 次/分，规则，心脏无杂音，两肺未见异常，有血吸虫病史。心电图示除 aVR 与 V1 外各导联 ST 段抬高。其最可能的诊断是

A.肺梗死

B.心肌梗死

C.心肌炎

D.心肌梗死伴继发性心包炎

E.急性心包炎

142、（A3/A4 型选择题）女，26 岁。主诉心前区疼痛 2 小时，向左肩放射，吸气时疼痛加重，坐位时减轻，伴有畏寒、发热就诊。查体：血压 105/75mmHg，体温 38°C，心率 110 次/分，规则，心脏无杂音，两肺未见异常，有血吸虫病史。心电图示除 aVR 与 V1 外各导联 ST 段抬高。入院第 3 天，血压 90/75mmHg，颈静脉怒张，气喘不能平卧。病情变化应考虑为

A.再次肺梗死

B.心肌梗死扩大范围

C.毒血症

D.心脏压塞

E.心脏腱索断裂

143、（A3/A4 型选择题）女，26 岁。主诉心前区疼痛 2 小时，向左肩放射，吸气时疼痛加重，坐位时减轻，伴有畏寒、发热就诊。查体：血压 105/75mmHg，体温 38°C，心率 110 次/分，规则，心脏无杂音，两肺未见异常，有血吸虫病史。心电图示除 aVR 与 V1 外各导联 ST 段抬高。此时 X 线检查可能显示

A.左肺野楔形实质性阴影，伴左胸腔积液

- B.肺部无明显充血而心影显著增大
- C.正常
- D.左肺野多发炎症阴影
- E.两侧肺门影不大

144、（A3/A4 型选择题）女，26 岁。主诉心前区疼痛 2 小时，向左肩放射，吸气时疼痛加重，坐位时减轻，伴有畏寒、发热就诊。查体：血压 105/75mmHg，体温 38℃，心率 110 次/分，规则，心脏无杂音，两肺未见异常，有血吸虫病史。心电图示除 aVR 与 V1 外各导联 ST 段抬高。本例正确的治疗是

- A.手术取出栓子
- B.心包穿刺
- C.冠脉造影伴紧急 PTCA
- D.大剂量抗生素静脉滴注
- E.应用升压药以及强心利尿剂

145、（A3/A4 型选择题）女，28 岁。进行性痛经 8 年，婚后 5 年未孕。妇科检查：子宫大小正常，后位，固定，盆底可触及多个痛性结节，右侧附件区触及直径约 6cm 的囊性包块，不活动，左侧附件区组织略增厚。首先考虑的诊断是

- A. 盆腔结核
- B. 原发性痛经
- C. 慢性盆腔炎
- D. 卵巢肿瘤
- E. 子宫内膜异位症

146、（A3/A4 型选择题）女，28 岁。进行性痛经 8 年，婚后 5 年未孕。妇科检查：子宫大小正常，后位，固定，盆底可触及多个痛性结节，右侧附件区触及直径约 6cm 的囊性包块，不活动，左侧附件区组织略增厚。首选的治疗方案为

- A. 手术治疗
- B. 孕激素治疗
- C. 抗感染治疗
- D. 抗结核治疗
- E. 镇痛治疗

147、（A3/A4 型选择题）男，50 岁。因胆道梗阻并发休克入院，使用去甲肾上腺素升压，血压不易维持，波动较大，应用氢化可的松后血压上升并维持平稳，治疗 3 天时，患者出现精神失常，躁狂。患者出现精神失常，躁狂，因氢化可的松

- A.提高中枢神经的兴奋性
- B.加速蛋白质的分解代谢
- C.过量引起感染的扩散
- D.减少脑组织对葡萄糖的利用
- E.增强升压药的作用

148、（A3/A4 型选择题）男，50 岁。因胆道梗阻并发休克入院，使用去甲肾上腺素升压，血压不易维持，波动较大，应用氢化可的松后血压上升并维持平稳，治疗 3 天时，患者出现精神失常，躁狂。加用氢化可的松后，去甲肾上腺素升压作用增强的这种现象是

- A.两种药物作用的协同
- B.糖皮质激素的允许作用
- C.糖皮质激素的刺激作用
- D.糖皮质激素的抗感染作用
- E.两种药物作用的叠加

149、（A3/A4 型选择题）女，26 岁。因甲状腺功能亢进行甲状腺切除，术后第二天出现手足抽搐。最可能的原因是

- A.喉上或喉返神经损伤

- B.甲状腺功能低下
- C.甲状腺危
- D.甲状旁腺功能低下
- E.喉头水肿

150、（A3/A4 型选择题）女，26 岁。因甲状腺功能亢进行甲状腺切除，术后第二天出现手足抽搐。采用的治疗方法是

- A.颈部理疗
- B.口服甲状腺素片
- C.口服复方碘化钾溶液
- D.静脉注射 10%葡萄糖酸钙
- E.气管切开

答案

1、正确答案：E

答案解析：【解析】记忆题，考查腹股沟解剖。

2、正确答案：E

答案解析：【解析】仔细询问，核对职业史是诊断职业病的先决条件，内容包括：患者全部职业的工种和工龄，接触有害物质的种类，时间和数量，接触方式及防护措施使用情况等。

3、正确答案：A

答案解析：【解析】主动脉瓣狭窄，指由于风湿性、先天畸形、瓣膜结构老化等原因导致主动脉瓣病变，致使主动脉瓣开放受限。随着病变的进展可出现主动脉瓣狭窄的临床三联症：劳累性呼吸困难、心绞痛和晕厥。听诊主要部位在胸骨右缘第2肋间。

4、正确答案：B

答案解析：【解析】：《药品管理法》第四十八条禁止生产(包括配制，下同)、销售假药。有下列情形之一的，为假药：(一)药品所含成份与国家药品标准规定的成份不符的；(二)以非药品冒充药品或者以他种药品冒充此种药品的。有下列情形之一的药品，按假药论处：(一)国务院药品监督管理部门规定禁止使用的；(二)依照本法必须批准而未经批准生产、进口，或者依照本法必须检验而未经检验即销售的；(三)变质的；(四)被污染的；(五)使用依照本法必须取得批准文号而未取得批准文号的原料药生产的；(六)所标明的适应症或者功能主治超出规定范围的。

5、正确答案：D

答案解析：

6、正确答案：B

答案解析：【解析】：有无累及其他系统是判断是否重症肺炎的标准。

7、正确答案：A

答案解析：【解析】：类风湿性关节炎尚不能治愈，缓解疼痛，防止病情进展。常用方案是甲氨蝶呤+来氟米特。

8、正确答案：E

答案解析：【解析】肥胖度=（实际体重-标准体重）÷标准体重×（±100%），肥胖度在±10%之内，称之为正常适中。肥胖度超过10%，称之为超重。肥胖度超过20%-30%，称之为轻度肥胖。肥胖度超过30%-50%，称之为中度肥胖。肥胖度超过50%以上，称之为重度肥胖。肥胖度小于-10%，称之为偏瘦。肥胖度小于-20%以上，称之为消瘦。

9、正确答案：E

答案解析：

10、正确答案：D

答案解析：【解析】鹅口疮又名雪口病白念菌病鹅口、雪口、鹅口疳、鹅口白疮。是由真菌传染，在粘膜表面形成白色斑膜的疾病多见于婴幼儿。本病是白色念珠菌感染所引起。这种真菌有时也可在口腔中找到当婴儿营养不良或身体衰弱时可以发病。白色念珠菌属于真菌，真菌属于真核生物。

11、正确答案：D

答案解析：记忆

12、正确答案：A

答案解析：解析：国家实行特殊管理的药品种类：麻醉药品、精神药品、医疗用毒性药品、放射性药品、药品类易制毒化学品、蛋白同化制剂、肽类激素、终止妊娠药品、部分含特殊药品复方制剂。

13、正确答案：E

答案解析：【解析】潜伏感染是一种病毒的持续性感染状态，原发感染后，病毒基因存在于一定的组织或细胞中，并不能产生感染性病毒，也不出现临床症状。在某些条件下病毒被激活增生，感染急性发作而出现症状。急性发作期可以检测出病毒。水痘——带状疱疹病毒同样可引起潜伏感染：在儿童初次感染后，引起水痘；而潜伏在体内脊糖后根神经节或脑感觉神经节中的病毒，当机体细胞免疫功能低下时，导致潜伏病毒激活，沿感觉神经到达皮肤上皮细胞，发生串联的水疱疹，多发于胸、腹、背和面部，局部剧烈疼痛，多见于成年人和老年人。

14、正确答案：C

答案解析：

15、正确答案：D

答案解析：【解析】：枕左前位时胎头矢状缝与骨盆入口右斜径相一致；。

16、正确答案：E

答案解析：【解析】：伤寒是由伤寒杆菌引起的急性传染病，以持续菌血症、单核-吞噬细胞系统受累、回肠远端微小脓肿及溃疡形成为基本病理特征。典型的临床表现包括持续高热，腹部不适，肝、脾大，白细胞低下，部分病人有玫瑰疹和相对缓脉。伤寒的并发症有肠出血、肠穿孔、中毒性肝炎、中毒性心肌炎、支气管炎等，其中肠穿孔是最严重的并发症。

17、正确答案：E

答案解析：记忆题

18、正确答案：A

答案解析：解析：必须优先抢救的急症有：心跳骤停、窒息、大出血、开放性和张力性气胸、休克、腹部内脏脱出等。

19、正确答案：D

答案解析：解析：成年子宫原2~3cm，宫体与宫颈比为2:1，已产妇宫颈外口受分娩影响形成横裂。

20、正确答案：B

答案解析：

21、正确答案：C

答案解析：解析：X线检查有助于鉴别，低位小肠梗阻，扩张的肠袢在腹中

部，呈阶梯状排列。

22、正确答案：C

答案解析：【解析】记忆题,考查药理作用。

23、正确答案：C

答案解析：解析:头皮裂伤清创的最佳时限最迟应在 24 小时之内。

24、正确答案：B

答案解析：记忆题

25、正确答案：C

答案解析：胎儿生后一周由于生理性贫血血红蛋白逐渐下降，直到第八周后才停止，2~3 个月时血红蛋白降至约 100g/L，红细胞数降至 $3.0 \times 10^{12}/L$ ，早产儿生理性贫血出现早而且较重，在生后 3~6 周时血红蛋白可下降至 70~90g/L，生理性贫血产生的原因有：(1)小儿出生后建立了肺呼吸，血氧饱和度由胎儿时期的 45%升至 95%，血氧饱和度成倍的增加使红细胞生成素明显减少，骨髓造血功能下降，这是最主要的原因；(2)胎儿红细胞的寿命比出生后制造的红细胞寿命短（胎儿红细胞寿命约为 45~70 天，出生后制造的红细胞平均寿命为 120 天），生后胎儿红细胞逐渐破坏；(3)生后 3 个月是体重增长最快的阶段，血容量增加很多，红细胞被稀释。

26、正确答案：D

答案解析：

27、正确答案：C

答案解析：解析:慢性肾病时电解质紊乱导致低钙血症,从而引起甲状旁腺功能亢进 ;。

28、正确答案：E

答案解析：心房颤动时 f 波的频率是 350~600 次/分

29、正确答案：C

答案解析：解析：预防艾滋病母婴传播工作原则(1)所有承担孕产期保健及提供助产服务的医疗保健机构，为孕产妇提供预防艾滋病母婴传播的技术服务。(2)为孕产妇及婚前保健人群提供免费咨询；为孕产妇及婚前保健人群提供免费的艾滋病病毒抗体检测，为艾滋病病毒感染的孕产妇及所生婴儿提供免费的抗病毒药物治疗。(3)为艾滋病病毒感染产妇及所生婴儿提供追踪和检测服务。(4)对孕期未知感染状况的产妇，在产时提供快速的艾滋病病毒抗体检测，以满足预防措施的需要。(5)所有预防及干预措施要坚持自愿原则，提供服务的机构有责任为服务对象保密。

30、正确答案：B

答案解析：解析：慢性胃炎是一类可由多种原因引起的胃黏膜慢性炎症，发病率居胃部多种疾病之首，在临床十分常见，现已明确 Hp 感染为慢性胃炎的最主要的病因，由于 Hp 的感染，黏膜固有层出现大量单核细胞浸润，上皮细胞

被破坏与细菌的浸润程度及细菌与细胞接触的紧密程度成正比。当中性粒细胞出现时为炎症活动的指标。故本题选 B。

31、正确答案：D

答案解析：解析：中枢性尿崩症：是由于各种原因导致的精氨酸血管加压素合成和释放减少，造成尿液浓缩障碍。表现为多饮、多尿、大量低渗尿，血浆精氨酸血管加压素水平降低。应用外源性精氨酸血管加压素有效。B、C、D选项尿液虽可增多，但无低渗表现。急性肾小球肾炎可出现血尿，但尿渗透压不降低，故不选 C。原发性醛固酮增多症多引起水钠潴留，不选 E。

32、正确答案：B

答案解析：【解析】淋病是淋病奈瑟菌（简称淋菌）引起的以泌尿生殖系统化脓性感染为主要表现的性传播疾病。

33、正确答案：A

答案解析：【解析】记忆题，考查胰腺癌病理类型。

34、正确答案：D

答案解析：解析：炎症的基本病理变化包括变质、渗出和增生。一、变质：炎症局部组织发生的变性和坏死。二、渗出：炎症局部组织血管内的液体和细胞成分，通过血管壁进入组织间质、体腔、粘膜表面和体表的过程。渗出是炎症最具特征性的变化。；三、增生：包括实质细胞(如鼻粘膜上皮细胞和腺体细胞)和间质细胞(巨噬细胞、血管内皮细胞、成纤维细胞)的增生。

35、正确答案：B

答案解析：

36、正确答案：D

答案解析：解析：复位是将移位的骨折段恢复正常或近乎正常的解剖关系，重建骨的支架作用。是治疗骨折的首要步骤，也是骨折固定和功能锻炼的基础。早期正确的复位，是骨折愈合过程顺利进行的必要条件。

37、正确答案：D

答案解析：解析：慢性肺心病右心增大，左心上翘。

38、正确答案：C

答案解析：【解析】右心感染性心内膜炎时，赘生物碎落进入肺动脉及其分支，易形成肺动脉栓塞。根据血流运行方向，可知右心感染性心内膜炎最常见的栓塞部位是肺动脉，左向右分流的先天性心血管病常见的栓塞部位也是肺动脉。

39、正确答案：A

答案解析：【解析】交感神经功能特点：（1）紧张性支配：例如，切断心交感神经后，心率减慢；切断支配虹膜的交感神经后，瞳孔缩小。（2）受效应器功能状态的影响：例如，刺激交感神经能引起未孕动物的子宫运动抑制，而对有孕子宫却可加强其运动。（3）对整体生理功能的调节意义：在环境急剧变化时，交感神经系统可以动员机体许多器官的潜力以适应环境的变化；

副交感神经的功能特点：副交感神经系统的作用与交感神经作用相反，它虽不如交感神经系统具有明显的副交感神经一致性，但也有相当关系。副交感神经系统可保持身体在安静状态下的生理平衡，其作用有三个方面：①增进胃肠的活动，消化腺的分泌，促进大小便的排出，保持身体的能量。②瞳孔缩小以减少刺激，促进肝糖原的生成，以储蓄能源。③心跳减慢，血压降低，支气管缩小，以节省不必要的消耗，协助生殖活动，如使生殖血管扩张，性器官分泌液增加。

40、正确答案：E

答案解析：解析：产后 1 周内使用吲哚美辛治疗；。

41、正确答案：B

答案解析：解析：各选项对比，肯定是疑有恶变尽快手术。

42、正确答案：E

答案解析：；【解析】正常的思维过程一般都具有目的性、连贯性和经济性等特点。

43、正确答案：C

答案解析：解析：麦角胺对部分病人有效。它是 5-HT 受体的促动剂，也有直接收缩血管作用。主要激动 5-HT_{1A} 受体，但对多巴胺，肾上腺素受体也有作用，因此副作用较大。

44、正确答案：B

答案解析：乳头状癌乳头状癌是最常见的甲状腺癌，约占成人甲状腺癌的80%以上。低度恶性，易发生颈淋巴结转移，但预后较好。

45、正确答案：D

答案解析：佝偻病颅骨软化多发生于3-6月份，婴儿头骨软化的发生率相对较高

46、正确答案：C

答案解析：【解析】社区获得性肺炎是指在医院外罹患的感染性肺实质（含肺泡壁即广义上的肺间质）炎症，包括具有明确潜伏期的病原体感染而在入院后平均潜伏期内发病的肺炎。

47、正确答案：C

答案解析：解析：胎盘早剥分为3度。① I度：多见于分娩期。胎盘剥离面积小，患者常无腹痛或腹痛轻微，贫血体征不明显。子宫软，大小与妊娠周数相符，胎位清楚，胎心率正常。产后检查见胎盘母体面有凝血块及压迹。② II度：胎盘剥离面达胎盘面积1/3左右。主要症状为突然发生持续性腹痛、腰酸或腰背痛，疼痛程度与胎盘后积血量成正比。无阴道流血或流血量不多，贫血程度与阴道流血量不相符。子宫大于妊娠周数，宫底随胎盘后血肿增大而升高。胎盘附着处压痛明显（胎盘位于后壁则不明显），宫缩有间歇，胎位可触清，胎儿存活。③ III度：胎盘剥离面超过胎盘面积1/2。临床表现较II度重。患者出现恶心、呕吐、面色苍白、四肢湿冷、脉搏细数、血压下降等休克症状，休克程度多与阴道流血量不成正比，子宫硬如板状，于宫缩间歇

时不能松弛，胎位扪不清，胎心消失。患者无凝血功能障碍属Ⅲa，有凝血功能障碍属Ⅲb。胎盘早剥是妊娠期发生凝血功能障碍最常见原因，伴有死胎时约 1/3 发生。

48、正确答案：D

答案解析：

49、正确答案：E

答案解析：

50、正确答案：D

答案解析：解析：原发型肺结核在营养不良患传染病和长期应用免疫抑制剂导致抵抗明显下降者均可发展为急性粟粒型肺结核。

51、正确答案：D

答案解析：记忆题，考查 RNA 合成过程。

52、正确答案：B

答案解析：解析：子宫肌瘤按肌瘤与子宫肌壁的关系分三类：肌壁间肌瘤、浆膜下肌瘤、黏膜下肌瘤。大的肌壁间肌瘤使宫腔及内膜面积增大，宫缩不良。黏膜下肌瘤常为月经过多，随肌瘤增大，经期延长。浆膜下肌瘤及肌壁间小肌瘤常无明显的月经改变。故 B 正确。

53、正确答案：D

答案解析：【解析】必需脂肪酸是为人体所需要但身体自己却不能制造必须从外界摄取的脂肪酸,而非必需脂肪酸是身体自己能自行制造的脂肪酸。

54、正确答案：C

答案解析：记忆题

55、正确答案：A

答案解析：【解析】：垂体加压素试验：鉴别中枢性尿崩症和肾性尿崩症。限水试验阳性者做此试验，两试验可连续进行，结束限水试验时，皮下注射垂体后叶加压素 2.5-5 单位，以后每小时测尿比重、尿量及血压。尿比重 > 1.016 为垂体性尿崩症。

56、正确答案：E

答案解析：【解析】：中国人急性胰腺炎常见病因是胆道系统疾病。

57、正确答案：C

答案解析：解析：糖皮质激素具有强大的抗炎作用，能抑制多种原因造成的炎症反应，炎症初期能提高血管的紧张性，减轻充血，同时抑制白细胞浸润剂吞噬反应。在炎症后期，激素抑制胶原蛋白粘多糖的合成肌肉芽组织的增生，防治粘连剂瘢痕形成，激素若使用不当可致感染扩散，创面延迟愈合。

58、正确答案：C

答案解析：【解析】二尖瓣狭窄引起左心室、右心房、右心室扩大，形成"

梨形心"。

59、正确答案：C

答案解析：【解析】：尿毒症患者血液系统的临床表现：肾性贫血和出血倾向。贫血常为中、重度，其原因是红细胞生成素缺乏。晚期有出血倾向，原因是血小板功能降低。因此本题选C。

60、正确答案：B

答案解析：解析：草绿色链球菌是引起亚急性感染性心内膜炎最常见的致病菌；金黄色葡萄球菌是引起急性感染性心内膜炎最常见的致病菌。

61、正确答案：E

答案解析：解析：记忆题,考查胃酸分泌。

62、正确答案：B

答案解析：解析：记忆题,每张处方所包含的药品种类上限为5种。

63、正确答案：C

答案解析：【解析】一些本能冲动、被压抑的欲望或生命力却在不知不觉的潜在境界里发生，因不符合社会道德和本人的理智，无法进入意识被个体所察觉，这种潜伏者的无法察觉的思想、观念、欲望等心理活动被称之为"潜意识"。

64、正确答案：D

答案解析：【解析】：当确诊为脾破裂时，在抗休克的同时行脾切除或脾缝合修补术。白细胞计数多升高，手术如无其他脏器损伤，可收集腹腔内的血行自体输血。

65、正确答案：B

答案解析：【解析】记忆题，考查药品的监管。

66、正确答案：B

答案解析：【解析】：临床预防服务是在临床环境下一级预防和二级预防的结合，其服务所针对的主要是健康人和无症状的“患者”；。故本题答案是B。

67、正确答案：D

答案解析：【解析】：新生隐球菌是深部感染真菌中隐球菌属的主要菌种之一，种类较多，广泛分布与自然界。

68、正确答案：C

答案解析：解析：矽肺是由于长期吸入大量游离二氧化硅粉尘所引起，以肺部广泛的结节性纤维化为主的疾病。矽肺是尘肺中最常见、进展最快、危害最严重的一种类型。

69、正确答案：C

答案解析：【解析】：腹外疝分为易复性、难复性、嵌顿性、绞窄性等临床类型，前两者其内容物无血运障碍，嵌顿性疝和绞窄性疝是一个病理过程的

两个阶段，嵌顿如不能及时解除，肠管及其系膜受压情况不断加重可使动脉血流减少、最后导致完全阻断，形成绞窄性疝，故疝内容物是否有血液循环为判断疝是否绞窄的依据，故本题答案为 A。

70、正确答案：D

答案解析：【解析】：基因表达调控中，转录起始水平的调节，对基因表达起着至关重要的作用，转录起始是基因表达调控的基本控制点。

71、正确答案：D

答案解析：【解析】：患者属于慢性支气管炎，上感常使病情进入急性期，常需低浓度氧疗，如果氧浓度过高，呼吸中枢受到抑制使呼吸运动减少，导致二氧化碳潴留。

72、正确答案：C

答案解析：解析：年轻已婚女性,阴道流血,腹痛,考虑流产,患者,持续一侧下腹痛,并不凝血抽出提示妊娠破裂,出血致休克。

73、正确答案：C

答案解析：解析：卵巢囊肿蒂扭转的典型症状是突然发生一侧下腹剧痛，常伴恶心、呕吐甚至休克，系腹膜牵引绞窄引起。妇科检查扪及肿物张力较大，有压痛，以瘤蒂部最明显，并有肌紧张。有时扭转自然复位，腹痛随之缓解。

74、正确答案：E

答案解析：解析：Dixon 手术由于吻合口位于齿状线附近，在术后的一段时间内病人出现便次增多、排便控制功能较差。

75、正确答案：C

答案解析：【解析】先天性甲状腺低下的临床表现

76、正确答案：B

答案解析：解析：结合该患者的病史及临床症状，诊断为血栓闭塞性脉管炎，其诱发因素与吸烟、骤冷、外伤等有密切关系。本病多见于 20-40 岁的男性，血管闭塞性脉管炎的处理包括：急救止血及手术治疗两个方面，故 B 项错误。

77、正确答案：B

答案解析：解析：该病例的特点为 40 岁以上男性，间歇性无痛肉眼血尿，膀胱镜检见输尿管口喷血，静脉尿路造影见肾盂内充盈缺损，其诊断应是肾盂癌。

78、正确答案：E

答案解析：解析：胸痛，呼吸困难气促，咳血是肺动脉栓塞三联征，有时候晕厥是首发症状。颈静脉充盈，肺动脉瓣区亢进符合该疾病的体征。

79、正确答案：B

答案解析：解析：X 线显示骨膜反应，且呈日光征，考虑为恶性骨肿瘤，患者 13

岁,为骨肉瘤高发年龄,最可能诊断为骨肉瘤。

80、正确答案：B

答案解析：【解析】：患者初产妇，已经 12 小时宫缩，胎儿下降位置可 S+1，紧急处理为破膜。宫口开 3cm 以上，无头盆不称，胎头已经衔接，行人工破膜。

81、正确答案：E

答案解析：

82、正确答案：D

答案解析：解析：药物性帕金森综合征，顾名思义就是由于药物使用不当而引发帕金森症的一种疾病。有可能诱发帕金森综合征的常用药物，有止吐药、降压药、安定药等。具有代表性的像降压药利血平；止吐药胃复安；抗精神病药氯丙嗪、奋乃静、氟奋乃静、氟哌啶醇、氟利多；抗抑郁剂丙咪嗪、阿密替林、多虑平、单胺氧化酶抑制剂苯乙肼、苯环丙胺等。该患者长期服用氟桂利嗪出现锥体外系症状，首先考虑为药物性帕金森综合症。

83、正确答案：C

答案解析：解析：过敏性紫癜是一种较常见的微血管变态反应性出血性疾病，常表现为双下肢对称性紫癜，伴腹痛和关节痛

84、正确答案：C

答案解析：解析：激素抵抗性肾病综合征是指肾病综合征患者使用常规剂量(泼尼松 1mg / kg·d)的激素治疗 8~12 周无效，或初始激素治疗有效，复发后再次使用无效的情况。在 4 周内转阴为激素敏感型。

85、正确答案：D

答案解析：解析：多次输血产生白细胞抗体的患者一般选去除白细胞的红细胞。

86、正确答案：C

答案解析：解析：吲达帕胺肾功不全的禁用，糖尿病慎用，本例心动过缓禁用于 β -受体阻滞剂，螺内酯保钾，慎用于肾功不全者，氨氯地平降低血压增加心率，缬沙坦不但降压而且降尿蛋白和保护肾功作用。

87、正确答案：D

答案解析：

88、正确答案：C

答案解析：解析：肺炎最常见的致病菌为肺炎链球菌。结合患者的病史，最可能的致病菌是肺炎链球菌。

89、正确答案：D

答案解析：解析：本例为低血糖表现，首先进食或口含糖块或输葡萄糖。

90、正确答案：B

答案解析：【解析】胸骨左缘 3、4 肋间可闻及抓刮样粗糙音，屏气时仍存在是纤维素心包炎的特征诊断。

91、正确答案：E

答案解析：【解析】：患者干咳、喘憋，季节性发作，抗感染无效，自行缓解，考虑为支气管哮喘。故本题选 E。

92、正确答案：D

答案解析：解析：肝功能检查正常排除慢性肝炎，肝硬化代偿期，症状较轻，常缺乏特异性，以疲倦乏力、食欲减退及消化不良为主。可有恶心、厌油、腹部胀气、上腹不适、隐痛及腹泻。

93、正确答案：E

答案解析：对乳头溢液,而未扪及肿块，可作乳头溢液涂片细胞学检查，找到癌细胞即可确诊乳腺癌

94、正确答案：C

答案解析：【解析】：进行性血胸时才开胸查因，一般情况下采取胸腔闭式引流术。

95、正确答案：C

答案解析：【解析】：脊髓震荡：脊髓遭受强烈振荡后立即发生迟缓性瘫痪，损伤的平面以下，运动丧失，只是短暂性功能抑制，可以在数分钟或数小

时内完全恢复。

96、正确答案：E

答案解析：解析：1. 咳嗽持续发生或者反复发作一个月以上，常在夜间发生或清晨发作性咳嗽，运动后加重，痰多 2. 化验或者其他检查表明没有明显的感染征象或者经过长期的抗生素治疗无效 3. 用支气管扩张剂可以使发作减轻 4. 有个人过敏史即伴有湿疹、荨麻疹、过敏性鼻炎等病史，也可以查出家族过敏史 5. 运动、冷空气、过敏原或者病毒性感染等诱发哮喘发作 6. 哮喘有季节性，多见于春、秋两季且反复发作 7. 胸部 X 线片显示正常或者肺纹理增加但无其他器质性改变。符合以上特点的患者应当确诊为咳嗽变异性哮喘。

97、正确答案：D

答案解析：【解析】：患者食欲减退,消瘦,黑便,上消化道造影示胃粘膜紊乱,胃壁僵硬,故诊断为胃癌,最常见的转移途径为淋巴转移。

98、正确答案：D

答案解析：【解析】开放性骨折特别是污染较重或伴有较严重的软组织损伤者好发感染。若清创不彻底，可导致化脓性骨髓炎。

99、正确答案：B

答案解析：解析：慢性肾衰竭导致高血钾，最大危害是导致心搏骤停。所以本题的正确答案是 B。

100、正确答案：B

答案解析： 【解析】：患者为老年女性，无生育要求，且为 CINⅢ，故可行子宫切除术，以防发展为浸润癌。

101、正确答案：D

答案解析： 【解析】：右上腹刀刺伤后首先应该探查实质性脏器，位于右上腹的实质性脏器是肝脏和肾脏，肝脏体积大，容易受伤，所以应该先探查肝脏。

102、正确答案：C

答案解析： 【解析】：弹片损伤，可能深度过深时合并破伤风感染，应该延期缝合。

103、正确答案：C

答案解析： 【解析】：炎性乳腺癌往往发病急骤，患者多数以乳房皮肤的红、肿、热等乳房炎性症状而就诊，炎性乳腺癌的体征，常见乳房弥漫性或局限性皮肤硬化、变厚、表面不平，皮肤水肿似橘皮样，可有卫星结节。皮肤最初呈粉红色，很快变成瘀血样紫红色，呈丹毒样改变。乳房迅速增大，皮温增高，触之韧感，常见乳头干裂、结痂和内陷。

104、正确答案：E

答案解析：首先根据直腿抬高试验阳性，加强试验阳性，诊断为腰椎间盘突出症，再根据具体表现，选 E

105、正确答案：C

答案解析：【解析】红色样变多见于妊娠期或产褥期,为肌瘤的一种特殊类型坏死,患者可有剧烈腹痛伴恶心呕吐。

106、正确答案：C

答案解析：根据临床表现及经历，不难诊断该患者为淋病。

107、正确答案：D

答案解析：【解析】：睾丸鞘膜积液呈球形成卵圆形，表面光滑，有弹性和囊性感无压痛，触不到睾丸和附睾透光试验阳性。

108、正确答案：E

答案解析：胎心变异

109、正确答案：D

答案解析：【解析】：结合患者的症状考虑为慢性胃炎，诊断首选胃镜。

110、正确答案：C

答案解析：【解析】：应激性溃疡出血指重度颅脑损伤后，食管、胃和十二指肠的急性出血性黏膜糜烂和出血，其溃疡病变常呈多发性，形状不规则、范围较大而表浅，糜烂溃疡的部位可从食管、胃到十二指肠，但胃窦部一般不被累及。多仅累及黏膜，罕有超过黏膜肌层者，以上特点与消化性溃疡显著不同。除了重度颅脑损伤外，这种应激性溃疡出血也可见于其他严重创伤（包括烧伤）、重大手术，本病例由头颈部、双上肢浅Ⅱ°烧伤引发，最可能原因为应

激性溃疡出血，A、B、D、E 需排除。故本题选 C。临床表现特点为伤者在事先毫无自觉症状，也没有消化性溃疡史的情况下，突然发生上消化道大出血或穿孔，但大出血远较穿孔多见。出血时不伴腹痛，多呈间歇性。首次出血多在外伤后几天才出现。

111、正确答案：C

答案解析：

112、正确答案：D

答案解析：

113、正确答案：E

答案解析：

114、正确答案：B

答案解析：

115、正确答案：C

答案解析：

116、正确答案：E

答案解析：

117、正确答案：A

答案解析：

118、正确答案：E

答案解析：

119、正确答案：C

答案解析：

120、正确答案：E

答案解析：

121、正确答案：D

答案解析：

122、正确答案：D

答案解析：

123、正确答案：A

答案解析：

124、正确答案：D

答案解析：

125、正确答案：E

答案解析：

126、正确答案：E

答案解析：

127、正确答案：B

答案解析：

128、正确答案：A

答案解析：

129、正确答案：E

答案解析：

130、正确答案：B

答案解析：

131、正确答案：B

答案解析：

132、正确答案：A

答案解析：

133、正确答案：D

答案解析：

134、正确答案：B

答案解析：解析：1.患者外伤后出现肿胀明显、疼痛剧烈、缝合处血性液体渗出多，恶臭等症状，说明已经发生了厌氧菌感染，选D。2.其原因是外伤的简单的创口缝合，清创不彻底导致伤口出现无氧环境。

135、正确答案：B

答案解析：

136、正确答案：D

答案解析：解析：1.育龄期女性常规的避孕方法为宫内节育器、药物及避孕套。长效口服避孕药多不采用；紧急避孕药不是常规避孕方法；而外用杀精子剂、安全期避孕失败率较高。故只能选择E。2.宫内节育器的避孕原理是利用异物引起的无菌性炎症，影响受精卵在子宫内膜着床。

137、正确答案：E

答案解析：

138、正确答案：C

答案解析：解析：1.此患者诊断为绞窄性股疝，股疝传统术式是E。2.此为女性无精索，所以ABDE皆错误

139、正确答案：C

答案解析：

140、正确答案：C

答案解析：解析：1.心包积液典型的特征为 Ewart 征：表现为心音低钝、遥远，心尖搏动减弱。2.最有助于确诊心包积液的辅助检查是超声心动图。

141、正确答案：E

答案解析：

142、正确答案：D

答案解析：

143、正确答案：B

答案解析：

144、正确答案：B

答案解析：

145、正确答案：E

答案解析：

146、正确答案：A

答案解析：

147、正确答案：D

答案解析：

148、正确答案：B

答案解析：

149、正确答案：D

答案解析：

150、正确答案：D

答案解析：解析：1.手足抽搐为甲状旁腺被误切或血供不足所致，血钙下降至 2.0mmol/L 以下，轻则口唇手足麻木，重则四肢抽搐。2.甲状旁腺功能低下对症处理措施：症状轻者可口服钙剂，重者发作时静脉注射 10%葡萄糖酸钙 100-200ml;口服二氢速固醇长期效果较好。