

2021 年《药专业知识二》真题（网友回忆版）

1. 扩张脑血管作用较强，能增加脑血流量的钙通道阻滞剂是(D)
- A. 氨氯地平
 - B. 拉西地平
 - C. 非洛地平
 - D. 尼莫地平
 - E. 硝苯地平
2. 属于褪黑素受体激动剂的药物是 (E)
- A. 扎来普隆
 - B. 艾司唑仑
 - C. 地西洋
 - D. 苯巴比妥
 - E. 雷美替胺
3. 乙内酰胺类抗癫痫药通过减钠离子内流而使神经细胞稳定，限制钠离子通道介导的发作性放电的扩散，属于该类的抗癫痫药物是 (D)
- A. 卡马西平
 - B. 加巴喷丁
 - C. 左乙拉西坦
 - D. 苯妥英钠
 - E. 地西洋
4. 关于抗抑郁药米氮平作用特点的说法，说法错误的是 (E)
- A. 属于去甲肾上腺素能及特异性 5-羟色胺能抗抑郁药
 - B. 不属于 CYP450 酶系的强效或中效抑制剂，因此药物相互作用风险小
 - C. 口服吸收快而完全
 - D. 对组胺 H₁ 受体亲和力较高，具有特异性的镇静作用
 - E. 用药 1~2 天后起效
5. 属于阿片类麻醉性镇痛药的是 (D)
- A. 曲马多
 - B. 依托考昔
 - C. 萘普生
 - D. 吗啡
 - E. 利多卡因
6. 某患者新诊断为退行性膝关节炎，既往有磺胺过敏史，不宜选用的非甾体抗炎药是 (B)
- A. 布洛芬
 - B. 塞来昔布
 - C. 双氯芬酸
 - D. 吲哚美辛
 - E. 美洛昔康
7. 关于美罗培南使用注意事项的说法，错误的是 (A)
- A. 肝功能不全者需调整剂量
 - B. 可用于治疗妊娠期呼吸系统感染
 - C. 有其他 β-内酰胺类药物过敏性休克史的患者禁用
 - D. 与中枢神经系统 γ-氨基丁酸受体的亲和力较亚胺培南弱，故癫痫等中枢神经系统不良反应

应的发生率显著低于亚胺培南

E.与丙戊酸钠合用时，可导致后者血浆药物浓度下降至有效浓度以下，甚至引起癫痫发作

8.属于程序性细胞死亡蛋白-1 (PD-1) 抑制剂的抗肿瘤药物是 (B)

- A.干扰素
- B.帕博丽珠单抗
- C.白介素
- D.贝伐珠单抗
- E.利妥昔单抗

9.关于钠-葡萄糖协同转运蛋白-2 (SLG-2) 抑制剂达格列净作用特点和不良反应的说法，错误的是 (C)

- A.降糖效果受肾小球滤过的葡萄糖负荷的影响
- B.降糖作用不依赖于胰岛 B 细胞的功能及机体对胰岛素的敏感性
- C.适用于 1 型糖尿病或糖尿病酮症酸中毒
- D.重度肾功能不全患者禁用
- E.可降低血压，减轻体重

10.作用机制为抑制合成嘧啶的二氢乳酸脱氢酶，半衰期较长，建议间隔 24 小时给药一次的慢作用抗风湿药物是(D)

- A.柳氮磺吡啶
- B.羟氯喹
- C.甲氨蝶呤
- D.来氟米特
- E.双醋瑞因

11.患儿，女，14 岁。因出现尿频、尿急、尿痛症状 2 天就诊，诊断为急性膀胱炎，患儿既往有癫痫病史，宜选用的治疗药物是 (A)

- A.呋喃妥因
- B.青霉素 G
- C.阿奇霉素
- D.环丙沙星
- E.克林霉素

12.患者，女，27 岁，孕 34 周。诊断为轻度便秘，宜选用的药物是 (B)

- A.蓖麻油
- B.乳果糖
- C.硫酸镁
- D.普芦卡必利
- E.利那洛肽

13.血培养结果为耐甲氧西林金黄色葡萄球菌，首选的抗菌药物是 (C)

- A.青霉素 G
- B.头孢唑林
- C.万古霉素
- D.左氧氟沙星
- E.阿奇霉素

14.属于长效 β_2 肾上腺素受体激动剂，可用于哮喘长期维持治疗的药物是 (E)

- A.噻托溴铵
- B.特布他林

- C.布地奈德
D.孟鲁司特
E.福莫特罗
- 15.可用于治疗蛔虫病、蛲虫病、钩虫病和鞭虫病的广谱驱虫药物是 (D)
A.甲硝唑
B.氯硝柳胺
C.乙胺嗪
D.甲苯咪唑
E.三氯苯达唑
- 16.可致男性胎儿外生殖器发育畸形,妊娠期或备孕期妇女不宜接触其破碎制剂的药物是(A)
A.非那雄胺
B.赛洛多辛
C.特拉唑嗪
D.多沙唑嗪
E.坦洛新
- 17.重组人促红素的适应证是 (E)
A.缺铁性贫血
B.巨幼细胞性贫血
C.血小板减少性紫癜
D.中性粒细胞减少症
E.肾功能不全所致的贫血
- 18.关于抗心力衰竭药物沙库巴曲缬沙坦的说法,错误的是 (B)
A.通过抑制脑啡肽酶,同时阻断血管紧张素II的1型受体(AT₁)起效
B.与血管紧张素转换酶抑制剂(ACEI)合用具有协同作用
C.适用于射血分数降低的慢性心力衰竭(NYHA II-IV级,LVEF<40%)成年患者
D.血钾水平>5.4 mmol/L的患者不可使用
E.重度肝功能损害(Child-PughC级)患者不推荐使用
- 19.适用于膀胱过度兴奋引起的尿频、尿急或紧迫性尿失禁症状治疗的药物是 (A)
A.托特罗定
B.托拉塞米
C.度他雄胺
D.坦洛新
E.西地那非
- 20.通过阻断二磷酸腺苷 P2Y₁₂ 受体,发挥抗血小板作用的药物是 (E)
A.阿司匹林
B.替罗非班
C.西洛他唑
D.双嘧达莫
E.氯吡格雷
- 21.由于氯吡格雷部分经 CYP2C19 转化为活性代谢物,合用抑制此酶活性的药物会降低氯吡格雷的疗效,故不推荐与氯吡格雷合用的质子泵抑制剂是 (B)
A.兰索拉唑
B.奥美拉唑
C.泮托拉唑

- D.雷贝拉唑
E.右兰索拉唑

22.舌下给药吸收迅速、起效最快，作为心绞痛急性发作首选的治疗药物是（A）

- A.硝酸甘油
B.硝酸异山梨酯
C.单硝酸异山梨酯
D.美托洛尔
E.卡托普利

23.患者，男，48岁，入院接受结肠癌手术，术后因合并肺部感染，静脉给予头孢哌酮舒巴坦钠治疗6天，观察到手术切口和静脉输液穿刺部位有少量渗血，实验室检验结果显示凝血功能异常。针对此症状，宜选用的治疗药物是（D）

- A.重组链激酶
B.重组人促红素
C.维生素K₁
D.维生素B₁₂
E.叶酸

24.患者，女，32岁。诊断为慢性宫颈炎、柱状上皮外移，使用聚甲酚磺醛栓治疗。关于该药物使用注意事项的说法，错误的是（E）

- A.治疗期间避免性交
B.月经期间暂停治疗
C.避免同时在局部合用其他药物
D.有刺激性，注意避免接触到眼睛
E.妊娠期可以安全使用

25.患者，男，65岁。患有2型糖尿病，长期服用降糖药，同时长期服用阿司匹林肠溶片（100mg/d）预防心脑血管疾病。近期拟行髋关节置换手术，为减少出血风险，宜采取的措施是（B）

- A.无需停用阿司匹林，也无需加用其他药物预防出血
B.停用阿司匹林7~10天后，再行手术
C.停用阿司匹林3天后，再行手术
D.无需停用阿司匹林，在手术日加用维生素K₁预防出血
E.无需停用阿司匹林，在手术日加用蛇毒血凝酶预防出血

26.患者，女，45岁。因持续的烧心和反酸就诊，诊断为胃食管反流病，宜选用的抑酸药物是（A）

- A.雷尼替丁
B.米索前列醇
C.吉法酯
D.乳酶生
E.匹维溴铵

27.通过监测国际标准化比值（INR）调整给药剂量的药物是（C）

- A.茶碱
B.丙戊酸钠
C.华法林
D.地高辛
E.万古霉素

28.不属于阿昔洛韦适应证的是 (E)

- A.单纯疱疹
- B.带状疱疹
- C.免疫缺陷者水痘
- D.病毒性急性视网膜坏死
- E.乙型流感

29.可待因是前药,需经肝药酶转化为吗啡而发挥镇痛作用,参与转化的肝药酶是 (D)

- A.CYP1A2
- B. CYP3A4
- C. CYP2C9
- D. CYP2D6
- E.CYP2C19

30.患者,男,35岁,有每日饮酒习惯。因牙龈炎口服甲硝唑,治疗期间如常饮酒后出现面部潮红、头痛、头晕、胸闷等症状,最可能的原因是 (E)

- A.酒精引起的过敏反应
- B.酒精引起的胃肠道反应
- C.甲硝唑引起的胃肠道反应
- D.甲硝唑引起的周围神经炎
- E.双硫仑样反应

31.患者,男,46岁。新诊断为高血压,最高血压155/95mmHg,心率100次/分,交感神经兴奋性明显增高,首选的治疗药物是 (A)

- A.美托洛尔
- B.氯沙坦
- C.氢氯噻嗪
- D.硝酸甘油
- E.硝苯地平

32.有关甲氨蝶呤药物相互作用的说法,错误的是 (C)

- A.阿司匹林会减慢甲氨蝶呤的肾排泄
- B.丙磺舒会减慢甲氨蝶呤的肾排泄
- C.碳酸氢钠会减慢甲氨蝶呤的肾排泄
- D.与顺铂等肾毒性药物合用,可能减慢甲氨蝶呤的肾排泄
- E.氨基糖苷类药物可增加甲氨蝶呤的肾毒性

33.水溶性他汀类药物能够选择性抑制肝脏胆固醇合成,而对肾上腺、性腺、心脏、大脑等部位的胆固醇合成影响极低,既有效降低了血清胆固醇水平,又减少了肝脏以外组织不良反应的发生。水溶性较强的他汀类药物是 (B)

- A.洛伐他汀
- B.普伐他汀
- C.辛伐他汀
- D.氟伐他汀
- E.阿托伐他汀

34.祥利尿剂是利尿作用最强的一类利尿剂,属于祥利尿剂的药物是 (B)

- A.氢氯噻嗪
- B.布美他尼
- C.乙酰唑胺

D.阿米洛利

E.吡达帕胺

35.能抑制外周（甲状腺外） T_4 转化为 T_3 的抗甲状腺药物是（D）

A.甲巯咪唑

B.卡比马唑

C.美托洛尔

D.丙硫氧嘧啶

E.左甲状腺素

36.可干扰转录过程和阻止 RNA 合成的抗肿瘤药物是（D）

A.顺铂

B.塞替派

C.丝裂霉素

D.多柔比星

E.长春瑞滨

37.属于短效避孕药，但其埋植剂可作为长效避孕药使用的药物是（C）

A.去氧孕烯

B.孕二烯酮

C.左炔诺孕酮

D.氯地孕酮

E.地屈孕酮

38.某冠心病患者，使用中等强度的他汀类药物治疗 6 个月后，低密度脂蛋白胆固醇仍不达标，每日调脂治疗方案可调整为（D）

A.氟伐他汀 20~40mg

B.辛伐他汀 20~40mg

C.阿托伐他汀 10~20mg

D.瑞舒伐他汀 20~40mg

E.匹伐他汀 2~4mg

39.可致超敏反应综合征（AHS），推荐用药前做 HLA-B*5801 基因筛查的抗痛风药物是（B）

A.苯溴马隆

B.别嘌醇

C.秋水仙碱

D.非布司他

E.丙磺舒

40.兼有抑菌作用的鼻用减充血剂是（A）

A.呋麻滴鼻液

B.赛洛唑啉滴鼻液

C.羟甲唑啉鼻喷剂

D.麻黄碱滴鼻液

E.左氧氟沙星滴鼻液

二、配伍选择题

（41-42）

A.赖氨酸注射液

B.复方氨基酸注射液（18AA）

C.复方氨基酸注射液（9AA）

D.丙氨酰谷氨酰胺注射液

E.复方氨基酸注射液（6AA）

41.治疗肝性脑病、慢性迁延性肝炎、慢性活动性肝炎引起的氨基酸代谢紊乱的药物是（E）

42.作为大手术、外伤或脓毒血症引起的严重肾功能衰竭以及急慢性肾功能衰竭患者肠外营养支持的药物是（C）

（43-45）

A.阿比多尔

B.奥司他韦

C.博洛昔韦

D.法匹拉韦

E.利巴韦林

43.属于神经氨酸酶抑制剂的抗流感病毒药物是（B）

44.既可用于治疗呼吸道合胞病毒感染，也可用于治疗肝功能代偿期的慢性丙型肝炎的药物是（E）

45.属于细胞血凝素抑制剂的抗流感病毒药物是（A）

（46-47）

A.氢氧化铝

B.双歧杆菌三联活菌

C.昂丹司琼

D.利那洛肽

E.奥美拉唑

46.先天性 QT 间期延长综合征患者应避免使用的药物是（C）

47.影响熊去氧胆酸的吸收，不宜同时服用的药物（A）

（48-50）

A.聚乙二醇滴眼液

B.硫酸阿托品眼用凝胶

C.雷珠单抗注射液

D.毛果芸香碱滴眼液

E.丙美卡因滴眼液

48.用于治疗干眼症的药物是（A）

49.用于治疗湿性视网膜黄斑变性的药物是（C）

50.用于验光配镜屈光度检查前散瞳的药物是（B）

（51-53）

A.沙格列汀

B.达格列净

C.吡格列酮

D.二甲双胍

E.瑞格列奈

51.低血糖发生风险较高的口服降糖药物是（E）

52.若无禁忌证，治疗 2 型糖尿病首选的口服降糖药物（D）

53.常见不良反应为泌尿生殖系统感染的口服降糖药物是（B）

（54-56）

A.西格列汀

B.那格列奈

- C. 格列美脲
D. 利拉鲁肽
E. 罗格列酮
54. 属于胰高血糖素样肽-1 (GLP-1) 受体激动剂的药物是 (D)
55. 属于噻唑烷二酮类(TZDs)胰岛素增敏剂的药物是 (E)
56. 属于二肽基肽酶-4 (DPP-4) 抑制剂的药物是 (A)
(57-58)
- A. 氨溴索
B. 羟甲唑啉
C. 度米芬
D. 西地碘
E. 左卡巴斯汀
57. 属于 H₁ 受体阻断剂, 可用于治疗季节性过敏性鼻炎的药物是 (E)
58. 属于阳离子型表面活性剂, 可用于治疗咽喉炎的药物是 (C)
(59-61)
- A. 依诺肝素
B. 氯吡格雷
C. 华法林
D. 利伐沙班
E. 达比加群酯
59. 通过直接抑制凝血酶而发挥作用的抗凝血药物是 (E)
60. 通过直接抑制凝血因子 Xa 而发挥作用的抗凝血药物 (D)
61. 属于维生素 K 拮抗剂的抗凝血药物是 (C)
(62-63)
- A. 雷洛昔芬
B. 骨化三醇
C. 阿仑膦酸钠
D. 鲑降钙素
E. 唑来膦酸
62. 仅适用于绝经后妇女的骨质疏松症, 不适用于男性骨质疏松症的抗骨质疏松药物是 (A)
63. 可能诱发哮喘, 因此过敏体质者、有支气管哮喘病史者慎用的抗骨质疏松药物是 (D)
(64-65)
- A. 尼莫地平
B. 吡拉西坦
C. 依达拉奉
D. 多奈哌齐
E. 尼麦角林
64. 属于自由基清除剂, 用于治疗缺血性脑血管病的药物是 (C)
65. 属于乙酰胆碱酯酶抑制剂, 用于改善脑功能及抗记忆障碍的药物 (D)
(66-67)
- A. 吗氯贝胺
B. 艾司西酞普兰
C. 文拉法辛
D. 马普替林

E.瑞波西汀

66.属于选择性 5-羟色胺再摄取抑制剂的抗抑郁药物是 (B)

67.属于 5-羟色胺与去甲肾上腺素再摄取抑制剂的抗抑郁药物是 (C)
(68-69)

A.拉贝洛尔

B.阿罗洛尔

C.卡维地洛

D.普萘洛尔

E.比索洛尔

68.属于非选择性 β 受体阻断剂的抗高血压药物是 (D)

69.属于选择性 β_1 受体阻断剂的抗高血压药物是 (E)

(70-71)

A.炉甘石洗剂

B.莫匹罗星软膏

C.克罗米通乳膏

D.联苯苄唑乳膏

E.过氧苯甲酰凝胶

70.用于治疗疥疮、皮肤瘙痒的药物是 (C)

71.用于治疗寻常痤疮的药物是 (E)

(72-73)

A.托烷司琼

B.东莨菪碱

C.苯海拉明

D.氟哌啶醇

E.阿瑞匹坦

72.属于抗胆碱药,易透过血脑屏障,能有效预防晕动病的药物 (B)

73.常与糖皮质激素和 5-羟色胺 3 (5-HT₃) 受体阻断剂组成三药联合方案,预防高致吐性化疗药物引起的急性和迟发性恶心、呕吐的药物是 (E)

(74-76)

A.来曲唑

B.环磷酰胺

C.厄洛替尼

D.长春新碱

E.多柔比星

74.属于酪氨酸激酶抑制剂的抗肿瘤药物是 (C)

75.属于微管蛋白活性制剂的抗肿瘤药物是 (D)

76.属于烷化剂,能破坏 DNA 的抗肿瘤药物是 (B)

(77-79)

A.甘油果糖

B.螺内酯

C.乙酰唑胺

D.氢氯噻嗪

E.呋塞米

77.既可用于降低颅内压,也可提供一定能量的药物 (A)

- 78.常与 ACEI 联用,在协同降压的同时,兼具防治高钾血症的中效利尿剂是 (D)
- 79.利尿作用最强、起效最快的药物是 (E)
- (80-82)
- A.阿米卡星
B.氨曲南
C.氨苄西林
D.头孢他啶
E.头孢曲松
- 80.属于第三代头孢菌素,通常铜绿假单胞菌对其敏感的药物是 (D)
- 81.属于浓度依赖型抗菌药物,通常铜绿假单胞菌对其敏感的药物是 (A)
- 82.属于时间依赖型抗菌药物,抗菌谱窄,仅对需氧革兰阴性菌有效的药物 (B)
- (83-85)
- A.哌拉西林他唑巴坦
B.青霉素 G
C.苯唑西林
D.苄星青霉素
E.阿莫西林
- 83.每周给药 1 次,只能深部肌内注射,可治疗梅毒螺旋体感染的抗菌药物是 (D)
- 84.幽门螺杆菌根除治疗方案中,常与克拉霉素和质子泵抑制剂合用的抗菌药物是 (E)
- 85.痰培养结果为铜绿假单胞菌,宜选用的抗菌药物是 (A)
- (86-88)
- A.重组链激酶
B.尿激酶
C.瑞替普酶
D.替奈普酶
E.阿替普酶
- 86.血浆消除半衰期短 (<5min),需要先静脉推注负荷剂量,随后再持续静脉滴注给药的溶栓药物是 (E)
- 87.血浆消除半衰期相对较长(14~16min),可间隔 30min 静脉注射 2 次给药的溶栓药物是(C)
- 88.抗原性及变态反应风险最高的溶栓药物是 (A)
- A.头孢曲松
B.头孢唑林
C.头孢噻肟
D.头孢他啶
E.头孢吡肟
- (89-90)
- 89.患者,女,65 岁。诊断为社区获得性肺炎,伴肾功能不全,肌酐清除率 25mL/min,宜选用的无需根据肾功能调整剂量的抗菌药物是 (A)
- 90.患者,男,54 岁。拟行膝关节置换术,围手术期宜选用的预防用抗菌药物 (B)
- (91-93)
- A.双氯芬酸
B.秋水仙碱
C.苯溴马隆
D.双醋瑞因

E.非布司他

91.抑制粒细胞浸润炎症反应的抗痛风药物是 (B)

92.抑制尿酸生成的抗痛风药物是 (E)

93.促进尿酸排泄的抗痛风药物是 (C)

(94-95)

A.乙酰半胱氨酸

B.氯化铵

C.氨溴索

D.右美沙芬

E.可待因

94.既有黏痰溶解作用, 还有解救对乙酰氨基酚中毒作用的药物 (A)

95.既有祛痰作用, 还有酸化尿液、纠正代谢性碱中毒作用的药物是 (B)

(96-98)

A.特比萘芬

B.克霉唑

C.环吡酮胺

D.米卡芬净

E.制霉菌素

96.用于浅部真菌感染, 属于咪唑类的抗真菌药物是 (B)

97.渗透性强, 可透过甲板, 属于吡啶酮类的抗真菌药物是 (C)

98.对角鲨烯环氧酶有非竞争性和可逆性抑制作用, 属于丙烯胺类的抗真菌药物 (A)

(99-100)

A.福辛普利

B.缬沙坦

C.厄贝沙坦

D.氯沙坦

E.卡托普利

99.可被肝药酶 CYP2C9 和 CYP3A4 代谢, 代谢产物仍具降压活性的 ARB 类药物是 (D)

100.可用于治疗高血压急症的药物是 (E)

三、综合分析题

(101-103)

患者, 女, 70 岁, BMI 21kg/m², 45 岁时绝经, 10 年前开始, 经常出现腰背部疼痛, 活动后加重, 但未就诊, 平日外出活动较少, 近 5 年身高降低, 驼背明显。10 天前患者不慎摔倒, 右上肢活动受限、疼痛, 就诊后检查结果: 血钙 1.97mmol/L, 血磷 1.39mmol/L; 右上肢 X 光检查提示: 右桡骨远端骨折。骨密度检查结果: T 值 (-2.9) 入院诊断: 右桡骨远端骨折, 老年性骨质疏松症。

101.实验室检查结果显示, 患者血 25-羟维生素 D 水平降低, 医生评估认为患者维生素 D 严重缺乏, 给予骨化三醇治疗, 该药物的常用剂量是 (E)

A.一次 0.125μg, 一日 1 次

B.一次 0.5μg, 一日 2 次

C.一次 0.75μg, 一日 2 次

D.一次 1.5μg, 一日 2 次

E.一次 0.25μg, 一日 2 次

102.为了预防骨质疏松性骨折, 给予阿仑膦酸钠 70mg 每周口服 1 次, 关于阿仑膦酸钠用药

指导的说法，错误的是（E）

- A.应于早餐前至少半小时服用
- B.服药后至少 30 分钟内应避免卧床
- C.应在每周固定的一天服用
- D.有消化不良、吞咽困难、胃肠道功能紊乱、胃炎、十二指肠炎、溃疡病的患者慎用
- E.为提高疗效，可用牛奶送服

103.患者服用阿仑膦酸钠 3 个月后复查，主诉反酸、咽喉烧灼感明显，为此，用药方案更换为唑来膦酸 5mg 每年静脉滴注 1 次，首次静脉滴注唑来膦酸后，出现发热和肌肉酸痛，建议对症治疗的药物是（C）

- A.地塞米松
- B.双醋瑞因
- C.对乙酰氨基酚
- D.秋水仙碱
- E.吗啡

（104-106）

患者，女，67 岁，入院后行左侧髋关节置换术，术前 12 小时皮下注射低分子肝素预防深静脉血栓。术后患者情况稳定，继续使用低分子肝素，住院第 7 天出院。

104.关于低分子肝素抗凝作用机制的说法，正确的是（B）

- A.能使凝血级联的丝氨酸蛋白酶失活
- B.通过增强抗凝血酶Ⅲ（AT-Ⅲ）的活性，抑制凝血因子Ⅱa 和 Xa 发挥抗凝作用
- C.体外试验具有直接的抗凝活性，可抑制体外凝血过程
- D.能刺激脂蛋白脂肪酶的释放，加速血液循环中脂蛋白的清除
- E.能直接激活凝血因子

105.和普通肝素相比，关于低分子肝素作用特点的说法，错误的是（A）

- A.起效更快
- B.剂量和抗凝效果的相关性更好，不易引起出血
- C.可以固定剂量给药，一般不需要进行凝血功能监测
- D.发生肝素诱导的血小板减少症的风险较低
- E.作用维持时间更长

106.患者出院后的 1 个月内，需要继续使用药物预防深静脉血栓，宜选用的药物是（C）

- A.氯吡格雷
- B.替格瑞洛
- C.利伐沙班
- D.双嘧达莫
- E.西洛他唑

（107-110）

一对年轻夫妇计划出国旅游，出发前，准备选购以下治疗腹泻的药物备用，包括蒙脱石、口服补液盐、双歧杆菌三联活菌、洛哌丁胺，小檗碱。

107.下列药物中，需凭医师处方购买的药物是（D）

- A.蒙脱石
- B.口服补液盐
- C.双歧杆菌三联活菌
- D.洛哌丁胺
- E.小檗碱

108. 药店同时销售口服补液盐 I 和口服补液盐 III, 关于口服补液盐分类和临床应用的说法, 错误的是 (A)

- A. 口服补液盐 III 是等渗性口服补液盐
- B. 口服补液盐是复方制剂, II、III 代表不同的配方
- C. 腹泻导致重度脱水时首选静脉补液, 情况稳定后可更换为口服补液盐治疗
- D. 口服补液盐使用方便、价格低廉, 发生腹泻时如能口服, 应尽早使用
- E. 为保证疗效, 应严格按照说明书规定的水量稀释

109. 执业药师应熟悉微生态制剂的成分, 下列不属于微生态制剂的菌种是 (D)

- A. 双歧杆菌
- B. 嗜酸乳杆菌
- C. 粪肠球菌
- D. 梭状芽孢杆菌
- E. 地衣芽孢杆菌

110. 执业药师不推荐他们购买双歧杆菌三联活菌制剂, 建议更换为地衣芽孢杆菌活菌制剂, 最可能的原因是 (B)

- A. 疗效不确切
- B. 需冷藏保存, 携带不便
- C. 不良反应较多
- D. 不适合成年人服用
- E. 服用不方便

四、多项选择题

111. 关于吉非替尼作用特点、适应证及不良反应的说法, 正确的有 (ABE)

- A. 可用于晚期或转移性非小细胞肺癌
- B. 常见不良反应为皮疹、腹泻、转氨酶或胆红素升高
- C. 可用于晚期或转移性小细胞肺癌
- D. 可用于慢性粒细胞白血病
- E. 主要经 CYP3A4 代谢

112. 属于第二代的抗精神病药物有 (BDE)

- A. 氯丙嗪
- B. 阿立哌唑
- C. 奋乃静
- D. 氯氮平
- E. 利培酮

113. 关于解热镇痛抗炎药的分类、药理作用与临床评价的说法, 正确的有 (AB)

- A. 非甾体抗炎药具有中等程度的镇痛作用, 其镇痛作用部位主要在外周
- B. 非甾体抗炎药对创伤引起的剧烈疼痛和内脏平滑肌绞痛无效
- C. 解热镇痛抗炎药又名非甾体抗炎药, 包括糖皮质激素类药物
- D. 非甾体抗炎药不但能降低发热者的体温, 也能降低正常人的体温
- E. 非甾体抗炎药中, 抗炎作用最强的是对乙酰氨基酚

114. 属于浓度依赖型的抗菌药物有 (ABD)

- A. 阿米卡星
- B. 左氧氟沙星
- C. 头孢呋辛
- D. 达托霉素

E.克林霉素

115.属于吸入型肾上腺糖皮质激素的药物有（ACD）

A.布地奈德

B.地塞米松

C.氟替卡松

D.倍氯米松

E.泼尼松龙

116.用于治疗乙型肝炎的药物有（ABCDE）

A.拉米夫定

B.恩替卡韦

C.替比夫定

D.阿德福韦酯

E.替诺福韦酯

117.属于 β_2 肾上腺素受体激动剂，具有平喘作用的药物有（BCD）

A.异丙托溴铵

B.沙丁胺醇

C.沙美特罗

D.特布他林

E.茶碱

118.患者，女，65岁。诊断为骨质疏松症，给予鲑降钙素注射液治疗，用药期间需注意的事项有（BCE）

A.应当注意有无皮下和牙龈出血

B.必须补充足量的钙剂和维生素D

C.对蛋白质过敏者，使用前需做皮肤敏感试验

D.可能出现低血糖反应

E.常出现面部潮红的不良反应

119.属于碳青霉烯类的抗菌药物有（ACDE）

A.亚胺培南

B.氨曲南

C.美罗培南

D.厄他培南

E.比阿培南

120.雌激素类药物使用的禁忌证有（ACE）

A.乳腺癌

B.晚期前列腺癌

C.急性血栓性静脉炎

D.萎缩性阴道炎

E.未明确诊断的阴道不规则出血