

《中药综》必做 200 题 (上 100)

一、最佳选择题

1. 中药蜜丸贮藏不当易发生霉变。适宜霉菌生长的温度和相对湿度是 ()

- A. 10~30°C, 70%以上
- B. 10~30°C, 75%以上
- C. 20~35°C, 75%以上
- D. 18~35°C, 70%以上
- E. 18~35°C, 75%以上

2. 某男, 6 岁。口干多饮, 纳呆食少, 面黄肌瘦, 四肢倦怠, 精神不振, 体虚多汗、大便干结, 舌红少苔, 脉细。诊断为厌食, 证属脾胃虚弱、胃阴不足。宜选用中成药是 ()

- A. 儿宝颗粒
- B. 枳术丸
- C. 启脾丸
- D. 健胃消食片
- E. 保和丸

3. 肺胀是多种肺系疾患反复发作, 迁延不愈, 导致肺气胀满, 不得敛降的一种肺系疾病病, 临床表现为胸部膨满, 憋闷如塞, 喘息上气, 咳嗽痰多等症状。可参考肺胀辨证论治的疾病是 ()

- A. 慢性阻塞性肺疾病
- B. 支气管哮喘
- C. 社区获得性肺炎
- D. 上呼吸道感染
- E. 病毒性肺炎

4. 传统汤剂是将药物用煎煮或浸泡后去渣取汁的方法制成的液体剂型。关于汤剂煎煮程序的说法, 错误的是 ()

- A. 为便于煎出有效成分, 在煎煮前先加常温水浸泡 20~30 分钟
- B. 第一煎加水量一般高于药面 2~5cm, 第二煎加水量酌减

- C. 每剂药煎好后, 待放凉再滤出煎液
- D. 每剂药的总煎出量, 成人一般为 400~600ml
- E. 剩余残渣挤出的残液量不超过残渣总重量的 20%

5. 药店的某一系列中药斗谱排列如图所示。该斗谱中, 因排列不合理需调整的斗谱组合是 ()

- A. 黄芪与党参
- B. 青皮与陈皮
- C. 公丁香与母丁香
- D. 玫瑰花与月季花

E. 生龙骨与生牡蛎

6. 某男, 25 岁。因上呼吸道感染, 临床给予喜炎平注射液 150mg, 加入到 5% 葡萄糖注射液 250mL 中静脉滴注, 输液 5 分钟后, 患者出现寒战、发热、心悸、前胸及后背皮肤多发红疹, 伴瘙痒, 渐至呼吸困难, 随即停止输液, 予以对症处理, 药师分析为喜炎平引起的药物不良反应。该不良反应的类型是 ()

- A. 过敏反
- 应 B. 副作用
- C. 毒性反应
- D. 继发反应
- E. 后遗作用

7. 某女, 69 岁。患糖尿病 3 年, 服用消糖灵胶囊, 血糖控制良好。半年前确诊为高血压病, 加用珍菊降压片, 服用 1 个月后, 发现血糖控制不佳, 其原因是珍菊降压片含有影响血糖的成分, 该成分是 ()

- A. 枸橼酸
- 钠 B. 氢氯噻
- 嗪
- C. 盐酸异丙嗪
- D. 吗啉美辛
- E. 盐酸苯海拉明

8. 某男, 24 岁。右侧肩胛骨内缘突发疔肿, 周围色红肿硬, 触痛明显, 伴有恶寒, 发热, 口干, 尿黄, 大便干; 舌红苔黄腻, 脉滑数。证属湿毒瘀结。宜选用的中成药是 ()

- A. 连翘败毒丸

B. 皮肤病血

毒丸

C. 牛黄化毒片

D. 活血解毒丸

E. 活血消炎丸

9. 某男, 55 岁。恶寒发热, 无汗, 头身痛, 伴有形寒肢冷, 面白声微; 舌淡苔白, 脉浮无力。宜采用的治法是 ()

A. 助阳解表

B. 益气解表

C. 养血解表

D. 滋阴解表

E. 散寒解表

10. 某男, 36 岁。身热, 腹硬满痛, 大便燥结, 口干渴; 舌燥苔焦黄。临床应采用的治则是 ()

A. 标本兼治

B. 急则治标

C. 缓则治本

D. 塞因塞用

E. 热因热用

11. 中药牛蒡子的别名, 错误的是 ()

A. 大力子

B. 鼠黏子

C. 牛子

D. 梭罗子

E. 恶实

12. 某女, 56 岁。素有关节疼痛, 刻下因咳嗽痰多就诊。

诊断为: (1) 痹证, 证属痛痹; (2) 咳嗽, 证属痰热壅肺。处

方: 橘红丸 (化橘红、浙贝母、陈皮、制半夏、茯苓、苦

杏仁、紫苏子、桔梗、紫菀、款冬花、瓜蒌皮、石膏、

地黄、麦冬、甘草); 小活络丸 (制川乌、制草乌、制

乳香、制没药、胆南星、地龙)。执业药师对该处方

进行审核, 发现其存在的配伍问题是 ()

A. 相使药同用

B. 相杀药同用

C. 相反药同用

D. 相恶药同用

E. 相畏药同用

13. 某女, 30 岁。咽痛干痒, 有异物感, 干咳少痰, 颧红, 潮热, 耳鸣, 多梦; 舌红苔少, 脉细数。宜选用的基础方剂是 ()

A. 清咽利膈汤

B. 养阴清肺汤

C. 疏风清热汤

D. 半夏厚朴汤

E. 枇杷清肺饮

14. 中成药联用在临床上普遍存在, 关于中成药合理联用的说法, 正确的是 ()

A. 脑立清胶囊与桂附地黄丸联用治疗高血压肝肾阴虚证, 前药为主, 后药为辅, 辅药能提高主药功效

B. 乌鸡白凤丸与香砂六君丸联用治疗月经不调, 后者可辅助前者, 增强养血调经之功

C. 二陈丸与平胃散联用治疗湿痰咳嗽, 两药功效相似, 可以起到互相增强疗效的协同作用

D. 内服六神丸与外用冰硼散联用治疗咽喉肿痛, 后者能够抑制前者的偏性

E. 舟车丸与金匱肾气丸联用治疗阳水, 后者能够明显消除前者的偏性

15. 某男, 59 岁。腰部冷痛, 酸软无力, 卧则减轻, 得热则舒, 肢冷畏寒, 面色晄白; 舌淡, 脉沉细无力。宜选用的基础方剂是 ()

A. 右归丸

B. 理中汤

C. 左归丸

D. 四妙丸

E. 四物汤

16. 某女, 35 岁。痔疮, 大便带血, 血色鲜红, 时有肛门瘙痒; 舌红苔薄黄。宜采用的治法 ()

A. 清热利湿止血

B. 清热凉血祛风

C. 清热凉血化瘀

D. 理气祛风活血

E.清热利湿消痔

17.根据中药饮片所含化学成分或炮制方法的不同,确定不同的贮藏方法。关于中药饮片贮藏的说法,错误的是

()

A.山药、葛根含淀粉多,应贮藏于通风、干燥处,以防虫蛀

B.种子类饮片因炒制后增加了香气,易受虫害,应密闭贮藏

C.动物类饮片易生虫和泛油,并有腥臭气,应密封保存

D.薄荷、当归含挥发油多,应置于25℃以下,阴凉、干燥处贮藏

E.盐炙饮片易吸湿而受潮,温度过高,盐分会析出,应贮藏于密闭容器,置通风干燥处

18.某女,42岁。反复咳嗽3年余,刻下咳嗽,痰多黏稠,时而色白,时而微黄,胸脘满闷:苔白腻,脉弦滑。诊断为咳嗽,证属痰气阻肺、肺失宣降。宜选用的中成药是()

A.清肺化痰丸

B.复方鲜竹沥液

C.百合固金丸

D.橘贝半夏颗粒

E.二母宁嗽丸

19.某男,40岁。嗜食肥甘厚味,喜好饮酒,形体肥胖,检查结果:总胆固醇8.22mmol/L,引起该指标升高的疾病不包括()

A.高脂血症

B.消耗性疾病

C.阻塞性黄疸

D.肾病综合征

E.甲状腺功能减退症

20.某女,45岁。带下量多,绵绵不断,质清稀如水,腰痛如折,畏寒肢冷,小腹冷感,面色晦暗,小便清长,夜尿频多,大便溏薄,舌淡苔白润,脉沉迟。宜选用的治法是()

A.健脾益气,除湿

止带

B.温肾培元,固涩止带

C.疏肝健脾,利湿止带

D.健脾固肾,除湿止带

E.清热解毒,利湿止带

二、配伍选择题

【21~22】

A.肝

B.脾

C.心

D.肺

E.肾

21.具有统摄血液、维持血行于脉内的生理功能的脏是()

22.具有贮藏血液、调节血量、防止出血的生理功能的脏是()

【23~25】

A.肾阴阳两虚

B.肾阳虚

C.肾气虚

D.肾精不足

E.肾阴虚

23.某女,63岁。头晕目眩,耳鸣耳聋,五心烦热,口燥咽干,腰膝酸软,舌红苔少,脉细数。辨证是()

24.某男,82岁。精神呆钝,动作迟缓,足痿无力,耳鸣耳聋,健忘恍惚,舌暗红苔薄白,脉沉弱。辨证是()

25.某男,65岁。畏寒肢冷,精神不振,腰膝酸软,小便清长,性欲减退,阳痿早泄,舌淡苔白,脉沉迟。辨证是()

【26~28】

A.连蒲双清片

B.四神丸

C.加味保和丸

D.人参健脾丸

E.槟榔四消丸

26.某男,34岁。因工作压力大,平素喜欢吸烟、饮酒,经

27.常熬夜。刻下腹痛，泻下急迫，粪色黄褐而臭，肛门灼热，烦热口渴，小便短黄；舌红苔黄腻，脉濡数。

宜选用的中成药是（ ）

28.某男，37岁。因饮食、饮酒无度，出现腹胀腹痛，泻下则缓，大便不调，纳食减少，噎腐吞酸；舌苔厚腻。

宜选用的中成药是（ ）

29.某女，48岁。大便溏泻，水谷不化，稍进油腻之物，则大便次数增多，饮食减少，恶心呕吐，脘腹疼痛，胀闷不舒，伴面色萎黄，肢倦乏力；舌淡苔白，脉细弱。

宜选用的中成药是（ ）

【29~31】

A.芎菊上清丸

B.通天口服液

C.清眩丸

D.脑立清丸

E.川芎茶调颗粒

30.某男，30岁。野外勘查归来后，头痛时作，伴见恶寒、发热、鼻塞。宜选用的中成药是（ ）

31.某女，60岁。患高血压病7年，近1周头痛如锥刺，痛处固定不移，反复发作，头晕目眩，恶心呕吐，恶风。

宜选用的中成药是（ ）

32.某女，45岁。近日常因子女学习问题气恼，头胀痛，恼怒加重，伴面色潮红，烦躁易怒，失眠多梦，宜选用的中成药是（ ）

【32~34】

A.莲花清瘟胶

B.柴银口服液

C.桑菊感冒片

D.感冒清热颗粒

E.参苏丸

某女，18岁。流感流行时期，与同学一起去看电影，次日发热，体温38.3℃，症见恶寒，肌肉酸痛，咳嗽，头痛。舌偏红，苔黄，脉浮。宜选用的中成药是（ ）

某女，40岁。初春，衣着较少，自觉恶寒，体温37.6℃，症见头痛，恶寒身痛，鼻流清涕，咳嗽，咽干。舌红苔薄白，脉浮，宜选用的中成药是（ ）

33.某男，73岁。元旦与家人一起游园，翌日发热，体温37.5℃，症见头痛鼻塞，咳嗽痰多，胸闷，呕逆，乏力，气短；舌胖淡，苔薄白，脉虚。宜选用的中成药是

（ ）

【35~37】

A.红粉

B.雄黄

C.斑蝥

D.蟾酥

E.轻粉

34.根据《中国药典》，只可外用，不可内服的毒性中药是（ ）

35.根据《中国药典》，内服剂量为0.015~0.03g的毒性中药是（ ）

36.根据《中国药典》，孕妇慎用的毒性中药是（ ）

【38~39】

A.固阴煎

B.膈下逐瘀汤

C.温经汤

D.人参归脾丸

E.逍遥散

37.某女，27岁。月经或提前或错后，经量时多时少，色暗红或紫红，夹有血块，经行不畅，胸胁、乳房、少腹胀痛，院闷不舒，时叹息，暖气食少；苔薄黄，脉弦。宜选用的基础方剂是（ ）

38.某女，35岁。月经提前10日，量少，色淡质稀，腰膝酸软，头晕耳鸣，面色晦暗；舌淡暗苔白，脉沉细。宜选用的基础方剂是（ ）

【40~41】

A.牛黄化毒片

B.乳康片

C.乳疾灵颗粒

D.乳增宁胶囊

E.乳癖消胶囊

39.某女，34岁。哺乳期患急性乳腺炎，症见乳房胀痛，皮色微红，皮肤发热，内有肿块，乳汁不畅；舌红苔薄黄，

40.脉弦数。宜选用的中成药是 ()

41.某女, 43 岁。患乳腺增生病, 症见双侧乳房疼痛并出现肿块, 月经前加重, 经后缓解, 乳房肿块大小不一、边界不清, 时伴胸闷肋胀, 善郁易怒, 月经失调, 心烦口苦。宜选用的中成药是 ()

【42~43】

- A.佐金平木法
- B.培土制水法
- C.金水相生法
- D.益火补土法
- E.培土生金法

42.某女, 52 岁。畏寒肢冷, 腰膝冷痛, 五更泄泻, 下利清谷; 舌淡胖, 边有齿痕苔白滑, 脉沉无力, 证属脾肾阳虚。宜采用的治法是 ()

43.某男, 48 岁。急躁易怒, 胸肋胀痛, 口苦咽干, 咳逆阵作, 咳时面赤, 痰黏; 舌红苔薄黄, 脉弦细数, 证属肺阴不足、肝火上逆犯肺。宜采用的治法 ()

【44~45】

- A.10~25°C
- B.10~30°C
- C.2~10°C
- D.2~8°C
- E.不超过 20°C

根据《中国药典》“凡例”贮藏项下对各名词术语的规定

44.常温所指的环境温度是 ()

45.凉暗处是指避光且环境温度是 ()

【46~47】

- A.消疲灵颗粒
- B.芪蒯强心胶囊
- C.参松养心胶囊
- D.安神补心丸
- E.朱砂安神片

46.某女, 65 岁, 心悸不安, 气短乏力, 动则加剧, 胸部闷痛, 失眠多梦, 盗汗, 神倦懒言; 舌暗, 脉结代。诊断为心悸, 证属气阴两虚、心络瘀阻。宜选用的中成药是 ()

47.某男, 70 岁。心慌气短, 动则加剧, 夜间不能平卧, 下肢浮肿, 倦怠乏力, 小便短少, 口唇青紫, 畏寒肢冷, 咳吐稀白痰; 舌淡苔白, 脉虚弱。诊断为心悸, 证属阳气虚乏、络瘀水停。宜选用的中成药是 ()

【48~50】

- A.蓖麻子
- B.白矾
- C.苦杏仁
- D.香加皮
- E.胆矾

48.过量服用可出现心律失常, 早搏, 血压先升后降等不良反应的饮片是 ()

49.过量服用可出现认知功能障碍、痴呆等不良反应的饮片是 ()

50.过量服用可出现口麻, 咽部烧灼感, 腹痛腹泻, 甚至严重脱水、溶血等不良反应的饮片是 ()

【51~53】

- A.华山参
- B.川楝子
- C.青风藤
- D.天仙藤

51.五味子肝功能不全患者应避免使用的饮片是 ()

52.青光眼、前列腺重度肥大患者应避免使用的饮片是 ()

53.肾功能不全患者应避免使用的饮片是 ()

【54~55】

- A.红舌
- B.淡红舌
- C.绛舌
- D.紫舌
- E.淡白舌

54.某女, 45 岁。纳呆食少, 神疲乏力, 大便稀溏, 每日 2~3 次, 面色无华, 证属脾阳虚, 其常见的舌象是 ()

55.某女, 52 岁。外感热病, 身热夜甚, 口渴不甚, 烦热躁扰, 斑疹隐现, 手足 (目闰) 动, 证属热入营血, 其常见的舌象是 ()

56. 某男, 61 岁。胸胁胀痛, 烦躁易怒, 头晕目眩, 夜寐梦多, 大便秘结, 小便黄, 口干苦, 证属里实热, 其常见的舌象是 ()

【57~58】

- A. 白芷
- B. 蛇蜕
- C. 蝉蜕
- D. 补骨脂
- E. 木蝴蝶

57. 破故纸的正名是 ()

58. 白故纸的正名是 ()

【59~60】

- A. 柏子仁和酸枣仁
- B. 炙黄芪和炙甘草
- C. 浙贝母和川贝母
- D. 天葵子和冬葵子
- E. 鸡矢藤和鸡血藤

某药店的部分中药斗谱排列如下

59. 因气味恶劣, 不宜与其他饮片装于同一药斗中, 需要调整斗谱位置的是 ()

60. 因饮片外观性状相似易引起混淆, 需要调整斗谱位置的是 ()

【61~63】

- A. 药物配伍联用存在证候禁忌
- B. 药物中的成分存在“十八反”配伍禁忌
- C. 药物中的相同成分存在“叠加”现象
- D. 药物中的毒性成分存在“叠加”现象
- E. 药物中的成分存在“十九畏”配伍禁忌

61. 某男, 56 岁。患胆结石服用利胆排石片。近日又出现高热烦躁, 尿赤便秘, 拟口服紫雪散。执业药师指出, 此中成药联用不合理, 原因是 ()

62. 某男, 56 岁。因胸痹心痛长期服用复方丹参滴丸。近日因跌倒扭伤足踝, 拟口服七厘散以散瘀止痛。执业药师指出, 此中成药联用不合理, 原因是 ()

63. 某女, 65 岁。因患风湿性关节炎多年, 长期服用风湿骨痛胶囊。近日因外感头痛, 拟服用正天丸。执业药师指出, 此中成药联用不合理, 原因是 ()

【64~65】

- A. 可增加药物排泄
- B. 可减少药物排泄
- C. 可发生酶抑反应
- D. 可发生酶促反应
- E. 可发生药效拮抗

64. 某女, 65 岁。因患有糖尿病长期服用格列本脲。近日因外感咳嗽, 医师予以含大量甘草的中药汤剂治疗。执业药师指出, 此中西药联用不合理, 原因是 ()

65. 某男, 68 岁。因帕金森病长期服用司来吉兰。近日因外感风热出现鼻塞、流黄稠涕, 医师予以干柏鼻炎片。执业药师指出, 此中西药联用不合理, 原因是 ()

【66~67】

- A. 灼痛
- B. 刺痛
- C. 重痛
- D. 胀痛
- E. 隐痛

66. 气血不足引起的头痛多见 ()

67. 瘀血阻滞经脉引起的头痛多见 ()

【68~70】

- A. 葛根汤颗粒
- B. 补中益气丸
- C. 龙胆泻肝丸
- D. 耳聋左慈丸
- E. 导赤丸

68. 耳鸣耳聋, 证属肝火上扰者, 宜选用的中成药是 ()

69. 耳鸣耳聋, 证属脾胃虚弱者, 宜选用的中成药是 ()

70. 耳鸣耳聋, 证属肾精亏损者, 宜选用的中成药是 ()

三、综合分析选择题

【71-74】

某女, 4 岁。壮热烦躁, 面红, 大汗出, 口渴喜冷饮, 尿少色黄, 便秘; 舌红苔黄, 脉数。

71. 根据中医理论, 分析其病机是 ()

- A.阴胜则阳病
- B.阳胜则阴病
- C.阴虚则热
- D.阳虚则寒
- E.阴虚则阳亢

72.该患儿体温进一步升高,出现手足厥冷,脉沉伏有力。

分析其病机是 ()

- A.阴胜则寒
- B.阴盛格阳
- C.阳虚则寒
- D.阳盛格阴
- E.阳气亡失

73.分析其病情的变化,辨证是 ()

- A.实热
- B.虚热
- C.真寒假热
- D.真热假寒
- E.虚寒

74.根据病情变化的辨证结果,宜采用的治法是 ()

- A.以热治热
- B.以寒治热
- C.以寒治寒
- D.以热治寒
- E.用热远热

【75-77】

某男,34岁。胃痛隐隐,绵绵不体,喜温喜按,劳累,受凉或空腹时疼痛明显,进食后疼痛缓解,时呕清水,神疲纳少,四肢倦怠,手足不温,大便溏薄,舌淡苔白,脉虚弱。医师诊断为胃痛,证属脾胃虚寒,处方如下:炙黄芪9g 桂枝9g 白芍18g 生姜6g 炙甘草9g 大枣6g 饴糖10g,7剂,水煎服,每日1剂,早、午、晚分服。

75.以下有关药师针对处方中白芍饮片的遴选建议,最适合的是 ()

- A.选用盐炒白芍,增强补益作用

- B.选用酒炒白芍,增强止痛作用
- C.选用醋炒白芍,增强止痛作用
- D.选用清炒白芍,缓和寒性
- E.选用土炒白芍,增强止泻作用

76.以下有关药师对此患者的用药教育内容,正确的是 ()

- A.重视精神的调摄,避免过度劳累
- B.汤剂水煎温服,每日2次,宜餐后服用
- C.方中红枣宜擘开入煎,饴糖宜冲服
- D.嘱患者服中药疼痛不缓解,可服用水杨酸类止痛药
- E.嘱患者少食多餐,多吃高纤维食物

77.患者欲改服中成药巩固治疗,根据辨证结果,不宜选用的中成药是 ()

- A.黄芪健胃膏
- B.胃疡灵颗粒
- C.胃乐新颗粒
- D.虚寒胃痛胶囊
- E.温胃舒胶囊

【78-79】

某女,27岁。1周前因右前臂出现鲜红色皮疹,皮疹为圆形红斑,上附糠状鳞屑,自服复方青黛胶囊,每次4粒,每天3次。服药4天后出现恶心、乏力、腹胀、身黄、目黄,遂停药就诊。入院查体:体温37°C,皮肤及巩膜黄染,无肝掌及蜘蛛痣,心肺听诊未闻及异常,腹软;实验室检查:丙氨酸氨基转移酶600U/L,天门冬氨酸氨基转移酶528U/L,总胆红素98μmol/L,甲、乙丙型肝炎病毒学检查均为阴性。经询问,患者服药期间未服用其他药物及保健品,但2年前曾服用过复方青黛胶囊,也曾出现过转氨酶升高的情况。入院对症处理后,症状缓解,复查肝功能:丙氨酸氨基转移酶100U/L,天门冬氨酸氨基转移酶98U/L,总胆红素18μmol/L。

78.执业药师对该患者肝损伤与复方青黛胶囊之间的关联性进行评价,正确的评价结果是 ()

- A.可能无关
- B.肯定相关
- C.可能相关

D.很可能相关

E.无法评价

79.执业药师分析导致该患者出现肝损伤的原因,正确的是 ()

A.患者特异体质

B.服药剂量过大

C.服药疗程过长

D.没有辨证用药

E.药物相互作用

【80-83】

某男,50岁。冠心病心绞痛病史5年,查血清肌酐、尿素氮均增高。近因劳累复发,心前区疼痛加重1周,神疲乏力,气短懒言,心悸自汗;舌体胖大有齿痕,舌质淡暗,舌苔薄白,脉弱而涩。

80.四诊合参,辨析其证候是 ()

A.寒凝心脉

B.气虚血瘀

C.心肾阳虚

D.气滞血瘀

E.痰瘀痹阻

81.根据辨证结果,宜采用的治法是 ()

A.行气活血,通脉止痛

B.益气活血,通脉止痛

C.豁痰化瘀,通阳宣痹

D.温补心肾,活血通脉

E.温阳散寒,宣通心阳

82.根据辨证结果,宜选用的基础方剂是 ()

A.血府逐瘀汤

B.苏合香丸

C.补阳还五汤

D.瓜蒌薤白桂枝汤

E.桃仁红花煎

83.1周后,患者诉上述症状有所好转,但最近因家庭琐事劳心过度,出现入睡困难,多梦易醒,心悸健忘,纳差。应避免使用的中成药是 ()

A.柏子养

心丸B.北芪五

加片

C.人参归脾丸

D.眠安宁口服液

E.脑力静糖浆

【84-85】

某女,40岁。呃逆、暖气1周余。因与家人吵架生气后,呃声不断,暖气则舒,胃脘痞塞,时有嘈杂反酸,急躁易怒,多梦,大便不畅;舌红苔薄黄腻脉弦。既往史:乙型肝炎5年,十二指肠溃疡2年。医师处方如下:旋覆花9g 吴茱萸5g 黄连5g 枳实9g 紫苏梗10g 香附10g 陈皮10g 竹茹10g 甘草9g,7剂,水煎服,每日1剂,早、晚分服。

84.患者服药后,呃逆频次减少,胃脘痞塞减轻,但仍暖气反酸,食欲不振。自行到药店买,要求购药21剂。执业药师告知患者,长期服用该处方存在风险,因其含有 ()

A.黄连

B.吴茱萸

C.旋覆花

D.枳实

E.香附

85.患者听取上述建议后复诊,医师处以复方猴头颗粒巩固治疗。执业药师提醒患者,该药含西药成分,应注意不要与含相同成分的西药合用。复方猴头颗粒所含的西药成分除硫酸铝、三硅酸镁外,还有 ()

A.碳酸氢钠

B.氯化铵

C.碱式硝酸铋

D.氧化锌

E.碳酸钙

【86-87】

某男,68岁。半年前因中风,遗留半身不遂,口眼喎斜,言语謇涩,出院后常规服用阿司匹林肠溶片(每次100mg,每日1次)。近2周,因过度劳累,患侧肢体无力、活动不便加重,伴浮肿,面色少华;伸舌右偏,舌色淡紫,舌边

有瘀斑，苔薄白，脉细涩无力。医师诊断为中风，证虚血瘀，处方如下：黄芪 30g 桃仁 10g 当归 6g 川芎 9g 红花 10g 赤芍 10g 地龙 6g 半夏 6g，7 剂，水煎服，每日 1 剂，早、晚分服。

86. 关于对该案例开展药学服务的说法，错误的是（ ）

- A. 建议中药处方选用炒桃仁、酒赤芍、生黄芪
- B. 建议黄芪一般用量为 30-60g，长期服用，每日用量不宜超过 120g
- C. 建议桃仁捣碎后入煎：水煎温服，每日 2 次，宜餐前服用
- D. 患者不欲服用汤剂，建议改服消栓胶囊，每次 2 粒，每日 3 次，饭后服用
- E. 建议患者加强偏瘫肢体的被动活动，进行各种功能锻炼

87.1 周后，患者因外感风寒，内伤湿滞，症见头痛昏重、胸膈痞闷、脘腹胀痛、呕吐泄泻，医师予以藿香正气水

内服，执业药师应告知正确的服用方法是（ ）

- A. 餐前服用藿香正气水，餐后服用阿司匹林肠溶片
- B. 餐前服用藿香正气水，餐中服用阿司匹林肠溶片
- C. 餐中服用藿香正气水，餐前服用阿司匹林肠溶片
- D. 餐后服用藿香正气水，餐前服用阿司匹林肠溶片
- E. 餐后服用藿香正气水，餐中服用阿司匹林肠溶片

【88-90】

某，65 岁，糖尿病史 8 岁，刻下口渴引饮，小便频数，多食善饥，形体消瘦，体倦乏力，睡眠欠佳，腰膝酸痛，舌淡红，苔白而干，脉细弱。

88. 四诊合参，辨析其证候是（ ）

- A 脾胃气虚
- B. 气阴两虚
- C 阴虚燥热
- D 胃阴不足
- E 阴阳两虚

89. 根据辨证结果，宜选用的中成药是（ ）

- A 消渴丸

属 气

B. 益津降糖口服液

C 消糖灵胶囊

D 六味地黄丸

E 金匱肾气丸

90. 服药后，上述症状减轻。近因劳累，过食辛辣，又见小便频数，尿色黄赤，灼热涩痛大便干结，尿常规检查：白细胞 90 个/HP，蛋白质(±)，葡萄糖(+)。根据病情变化，宜选用的中成药是（ ）

- A. 净石灵胶囊
- B. 济生肾气丸
- C. 知柏地黄丸
- D. 分清五淋丸
- E. 萆薢分清丸

四、多选题

91. 某男，76 岁。小便点滴而下，尿如细线，甚则阻塞不通，小腹胀满，烦躁口苦，舌紫暗，苔黄腻，脉涩。诊断为癃闭，证属湿热瘀阻。可选用的中成药有（ ）

- A. 前列通片
- B. 癃闭舒胶囊
- C. 热淋清颗粒
- D. 前列通瘀胶囊
- E. 前列舒丸

92. 执业药师在调剂审方中，要关注中成药的联用，保证患者安全、合理用药。下列中成药联用存在配伍禁忌的有（ ）

- A. 人参再造丸与通宣理肺丸
- B. 尪痹冲剂与川贝枇杷露
- C. 祛痰止咳颗粒与镇咳宁胶囊
- D. 朱砂安神丸与天王补心丸
- E. 磁朱丸与消瘦五海丸

93. 某女.42 岁。腹内出现肿块，固定不移，疼痛拒按，形体消瘦，纳谷减少，面色晦暗，肌肤甲错；舌暗紫，有瘀斑、瘀点，脉细涩。诊断为积聚，证属瘀血内结。可选用的中成药有（ ）

- A. 康力欣胶囊

B.肝脾康胶囊

C.鳖甲煎丸

D.和络舒肝胶囊

E.化癥回生片

94.某男,10岁。近2日发热,咽痛,时咳,腹泻,日5-6次。家长的朋友根据个人育儿经验,推荐治疗腹泻可用双歧杆菌三联活菌胶囊,发热、咽痛、时咳可用中药方(金银花、连翘、鱼腥草、黄芩、甘草)。家长遂去药店咨询,执业药师告知,服用双歧杆菌三联活菌胶囊,应避免同时使用的中药有()

A.金银花

B.连翘

C.鱼腥草

D.甘草

E.黄芩

95.据阴阳互根互济的原理,对于阴阳偏衰的治法有()

A.阴病治阳

B.阴阳双补

C.阳病治阴

D.阳中求阴

E.阴中求阳

96.根据痰饮的致病特点,其所致的病症有()

A.头目眩晕

B.阴疽流注

C.身体痛重

D.癥积痞块

E.癫狂痴呆

97.执业药师在提供药学服务时,需加以提示的特殊情况有()

A.同时使用2种含同一成分的药品

B.患者第一次使用某药品

C.同一种药品有多种适应症

D.药品说明书近期有修改

E.需特殊贮存的药品

98.发药是中药调剂工作的最后一个环节,执业药师与

《中药综合》必做200题(下100)

患者核对药品种类和数量,并对其进行用药指导,关于中成药用药指导内容和要点的说法,正确的有()

A.中成药的使用禁忌和注意事项

B.需特殊贮存的药品,应提醒患者按要求贮存

C.中西药联用,应向患者交代间隔半小时左右服用

D.中成药的药物组成

E.栓剂,滴眼液等特殊剂型,应向患者说明正确的使用方法

99.某患者因类风湿关节炎服用雷公藤制剂,执业药师对其进行用药指导,正确的建议有()

A.服药期间可能出现腹痛、腹泻、恶心、呕吐等消化系统症状

B.定期检测血常规,关注血小板、白细胞、血红蛋白等的变化

C.本药可抑制男女生殖功能,有生育需求者禁用

D.服药期间可能出现头晕、失眠、听力减退等神经系统症状

E.出现任何不良反应,必须立即停药

100.肾功能不全时,药物代谢和排泄会受到影响。关于肾功能不全患者用药基本原则和注意事项的说法,正确的有()

A.根据治疗情况及时调整剂量或更换治疗药物

B.尽量不用可能导致肾功能损害的药物

C.坚持少而精的用药原则

D.部分中药有特殊煎煮时间要求,应合理选择煎煮时间

E.多种药物联用时,应注意药物相互作用,避免产生新的肾损害

一、最佳选择题

1. 中医理论认为“症”、“证”、“病”含义不同，下列表述中属于“证”的是

- A. 淋证
- B. 男性不育症
- C. 风寒犯肺
- D. 五心烦热
- E. 恶寒发热

2. 下列是按相生规律确立的治法是

- A. 培土制水
- B. 抑木扶土
- C. 佐金平木
- D. 滋水涵木
- E. 泻南补北

3. 根据五行生克规律，肺之所不胜是

- A. 肝
- B. 肾
- C. 心
- D. 脾
- E. 胃

4. 根据藏象学说，肾主

- A. 疏泄
- B. 运化
- C. 纳气
- D. 神明
- E. 统血

5. 某女，25岁，近日出现干咳少痰或痰黏难咯，喘息胸痛等症状，推测导致此症状的邪气最有可能是

- A. 风邪
- B. 寒邪
- C. 暑邪
- D. 湿邪
- E. 燥邪

6. 下列属于既病防变的是

- A. 早期诊治
- B. 调养精神
- C. 加强锻炼
- D. 血虚

D. 起居有节

E. 人工免疫

7. 患者精神原本极度衰惫，意识不清，突然精神转“佳”者，此为

- A. 神志异常
- B. 无神
- C. 少神
- D. 假神
- E. 得神

8. 小便清澈量多者可见于

- A. 虚寒证
- B. 热证
- C. 湿浊下注
- D. 热伤血络
- E. 实寒证

9. 半表半里证的特征是

- A. 但寒不热
- B. 寒热往来
- C. 但热不寒
- D. 潮热
- E. 壮热

10. 咳嗽连声不绝，终止时作鹭鸶叫声者，称为

- A. 白喉
- B. 百日咳
- C. 燥咳
- D. 乳蛾
- E. 喉痹

11. 常见局部阴囊肿痛，痛如针刺，拒按，痛处固定不移，其证是

- A. 气滞
- B. 血瘀
- C. 痰凝
- D. 津亏

12. 患儿，5岁。咽部红肿疼痛3日，体温39.9℃，突

然肢体抽搐，两眼上翻，来院就诊。中医辨证为

- A. 肝阳化风
- B. 血虚生风
- C. 热极生风
- D. 阴虚风动
- E. 血燥生风

13. 虚脉的脉象是

- A. 三部脉举按无力
- B. 往来流利，如盘走珠
- C. 三部脉举按皆较大
- D. 举之有余，按之不足
- E. 一息脉来五至以上

14. 形寒肢冷，精神不振，腰膝酸软，全身机能低下伴见寒象属于

- A. 肾阳虚
- B. 肾阴虚
- C. 肾精不足
- D. 肾阳虚水泛
- E. 肾气不固

15. 某男，23岁。干咳少痰，午后咳甚，伴五心烦热，颧红，耳鸣。舌红少苔，脉细数，治宜选用的中成药是

- A. 急支糖浆
- B. 二母宁嗽丸
- C. 百合固金丸
- D. 清气化痰丸
- E. 通宣理肺丸

16. 某男，24岁。大便秘结，欲便不得，暖气频作，胸胁痞满，脉弦，应选用的方剂是

- A. 麻子仁丸加减
- B. 六磨汤加减
- C. 润肠丸加减
- D. 半硫丸加减
- E. 大承气汤加减

17. 某女，25岁。胸肋胀满，心悸，唇舌紫暗，脉涩。中医辨证为

- A. 气虚血瘀的胸痹
- B. 气滞血瘀的胸痹

C. 痰瘀痹阻的胸痹

- D. 寒凝心脉的胸痹
- E. 气阴两虚的胸痹

18. 某女，35岁。胃痛胀满，暖腐恶食，矢气后痛减，医生辨为饮食停滞证。治宜选用的中成药是

- A. 良附丸
- B. 保和丸
- C. 左金丸
- D. 四神丸
- E. 健脾丸

19. 某女，48岁。夜不能寐，急燥易怒，目赤耳鸣，舌红苔黄，脉弦而数。宜采用的治法是

- A. 清化热痰、和中安神
- B. 补益心肺，养血安神
- C. 滋阴降火、交通心肾
- D. 益气镇惊，安神定志
- E. 疏肝泄火、镇心安神

20. 某男，6岁。厌食，面色少华，神疲多汗，大便稀薄，夹有未消化食物，形体偏瘦，肢倦乏力。治宜选用的方剂是

- A. 消乳丸
- B. 归脾丸
- C. 不换金正气散
- D. 养胃增液汤
- E. 异功散

21. 某女，月经提前，伴量多，经色紫红，质稠有块，经前乳房、小腹胀痛，烦躁易怒。舌红苔黄，脉弦数。辨证为肝经郁热，治宜选用的方剂是

- A. 圣愈汤
- B. 固阴煎
- C. 丹栀逍遥散
- D. 杞菊地黄丸
- E. 右归丸

22. 某男，25岁。因腹泻就诊，症见腹痛肠鸣，泻下粪便臭如败卵，伴有未消化食物，泻后痛减，暖腐吞酸，不思饮食。舌苔厚腻，脉滑。治宜选用的中成药是

- A.加味保和丸
- B.参苓白术散
- C.涩肠止泻散
- D.葛根苓连汤
- E.固本益肠丸

23.某女,24岁。因受凉后出现头痛,连及项背。恶寒畏风,口不渴,舌质淡,苔白,脉浮,治宜选用的中成药是

- A.芎菊上清丸
- B.通天口服液
- C.川芎茶调颗粒
- D.天麻钩藤颗粒
- E.杞菊地黄丸

24.患者表现小便点滴不通,或量极少而短赤灼热,小腹胀满,口苦口黏,大便不畅。舌质红,苔黄腻,脉数。诊断为癃闭,证属

- A.肾气不固
- B.痰瘀痹阻
- C.湿热瘀阻
- D.肾精亏损
- E.膀胱湿热

25.某女,24岁。半身不遂,肢软无力;手足浮肿,面色少华,语言謇涩。舌色淡紫,脉细涩无力,治宜选用的中成药是

- A.脑安颗粒
- B.心脑静片
- C.天麻钩藤颗粒
- D.豨蛭络达胶囊
- E.松龄血脉康胶囊

26.和胃健脾,消积导滞的藏药方剂是

- A.七十味珍珠丸
- B.志嘎汗散
- C.八味沉香散
- D.六味安消散
- E.五味麝香丸

27.碱性磷酸酶(ALP)升高,除可鉴别肝胆疾病外,还可用于鉴别的疾病是

- A.胸腔积液

- B.溶血性疾病
- C.心肌梗死
- D.骨骼疾病
- E.前列腺肿瘤

28.目前已知最早的我国第一部成药典是

- A.《神农本草经》
- B.《本草纲目》
- C.《太平圣惠方》
- D.《千金翼方》
- E.《太平惠民和剂局方》

29.中药处方调剂的流程正确的是

- A.审方→调配→复核→计价→发药
- B.审方→复核→计价→调配→发药
- C.审方→计价→复核→调配→发药
- D.审方→计价→调配→复核→发药
- E.审方→调配→计价→复核→发药

30.服用大补阴丸的药引是

- A.鲜芦根煎汤
- B.姜汤
- C.米汤
- D.淡盐水
- E.清茶

31.处方调剂复核时,应予以纠正的错误是

- A.苦杏仁未捣碎
- B.生牡蛎单包先煎
- C.薄荷单包后下
- D.三七粉单包冲服
- E.阿胶单包烔化

32.某男,患鼓胀。医师处方中有京大戟、芫花,内服宜选用的炮制品是

- A.醋炙品
- B.酒炙品
- C.蜜炙品
- D.盐炙品
- E.姜炙品

33.为降低毒性,在中药煎煮过程中应先煎的中药是

- A.徐长卿

- B. 鹿角霜
C. 鹿角胶
D. 枇杷叶
E. 制附子
34. 根据中药饮片的贮藏要求, 含淀粉多的药材和饮片
- A. 应置阴凉、干燥处
B. 应贮于通风、干燥处
C. 应密闭贮藏于缸、罐中
D. 应密封保存, 并有通风设备, 阴凉贮存
E. 专人管理, 置阴凉、通风、干燥处贮藏
35. 质地较轻且用量较少的药物, 应放在斗架的位置
- A. 高层
B. 中上层
C. 较下层
D. 最低层
E. 中下层
36. 下列中最易泛油的饮片是
- A. 苦参
B. 当归
C. 厚朴
D. 板蓝根
E. 何首乌
37. 中西药联用影响药物在胃肠道的稳定的是
- A. 含鞣质较多的中药与红霉素
B. 含金属离子中药与四环素类
C. 酒剂、酏剂与苯巴比妥
D. 碱性中药与氨基糖苷类抗生素
E. 含有鞣质类中药与横胺类药物
38. 与甘草联用能增强抗炎、抗变态反应的西药是
- A. 氢化可的松
B. 呋喃唑酮
C. 丙谷胺
D. 碳酸锂
E. 莨菪碱
39. 含格列本脲成分的中成药使用注意事项不包括
- A. 磺胺过敏者禁用
B. 白细胞减少患者禁用
C. 孕妇及哺乳期妇女宜用
D. 高热及肝功能不全患者慎用

- E. 甲状腺功能亢进症患者慎用
40. 可损害肝脏, 肝功能不全者慎用, 需炒黄去刺用的是
- A. 半夏
B. 川乌
C. 皂角
D. 苍耳子
E. 刺蒺藜

二、配伍选择题

[41~43]

- A. 风邪
B. 湿邪
C. 暑邪
D. 燥邪
E. 火邪

41. 六淫中致病季节性最强的邪气是
42. 为百病之长的邪气是
43. 易致疮痛的邪气是

[44~45]

- A. 实寒证
B. 实热证
C. 虚寒证
D. 虚热证
E. 亡阳证

44. 阴偏盛病机表现的临床证候是
45. 阴偏衰病机表现的临床证候是

[46~48]

- A. 阳气不足
B. 营血亏损
C. 阳气暴脱
D. 脾胃气虚
E. 虚阳上越

46. 面色淡白而消瘦, 多属
47. 面色白而虚浮, 多属
48. 急性病突然面色苍白, 多属

[49~50]

- A. 口淡乏味

- B.口甜而腻
- C.口中酸馊
- D.口中泛酸
- E.口苦

49.肝胃蕴热则

50.脾胃湿热则

[51~52]

- A.歪斜
- B.痿软
- C.瘦薄
- D.胖嫩
- E.芒刺

51.热邪亢盛可见的舌象是

52.脾肾阳虚可见的舌象是

[53~55]

- A.沉香化气丸
- B.加味保和丸
- C.良附丸
- D.胃疡灵颗粒
- E.胃安胶囊

53.胃痛暴作，喜温恶寒，得温痛减，治宜选用中成药

54.胃痛胀满，噎腐恶食，吐不消化食物，舌苔厚腻，脉滑，治宜选用中成药

55.胃痛隐隐，大便溏薄，喜温喜按，空腹痛甚，得食痛减，泛吐清水，纳呆，神疲乏力，甚则手足不温，治宜选用中成药

[56~58]

- A.消渴平片
 - B.参苓白术散
 - C.金匱肾气丸
 - D.消渴丸
 - E.六味地黄丸
- 治疗消渴时

56.属肾阴亏虚者，宜选用的中成药是

57.属脾胃气虚者，宜选用的中成药是

58.属阴虚燥热者，宜选用的中成药是[59~61]

A.四君子汤

B.四物汤

C.附子理中汤

D.桂附地黄丸

E.沙参麦冬汤

59.气虚虚劳治宜选用

60.阳虚虚劳治宜选用

61.血虚虚劳治宜选用

[62~64]

A.归脾汤

B.左归丸合二至丸

C.固本止崩汤

D.将军斩关汤

E.圣愈汤

62.经血非时而下，淋漓不尽，血色淡薄，面色无华，气短懒言，食欲不振，便溏。舌淡苔薄白湿润，脉细弱。治宜选用的方剂是

63. 经血非时而下，出血量多，日久而止，气短神疲，面色晄白，四肢浮肿，手足不温，气短懒言，不思饮食，四肢不温，胃纳不佳，大便溏，舌淡苔白脉弱。治宜选用的方剂

64. 月经先期，经期延长，血色暗红，量少而淋漓不畅，咽干颧红，心烦潮热，腰膝酸软，舌红少苔，脉沉细无力。治宜选用方剂是

[65~66]

A.归脾丸

B.玉屏风散

C.大山楂丸

D.十香止痛丸

E.乌梅丸

《中国药典》收载的妊娠禁用、忌用和妊娠慎用的中成药中

65.属于妊娠禁用的中成药是

66.属于妊娠慎用的中成药是

[67~68]

A.肉桂与赤石脂

B.紫苏子与菟丝子

- C. 藜芦与漏芦
D. 熟地与龙眼肉
E. 阿魏与鸡矢藤
67. 斗谱安排时为了防止灰尘污染, 有的中药不宜放在一般的药斗内, 而宜放在加盖的瓷罐中
68. 斗谱安排时, 因为有恶劣气味, 不能与其它药物装于一个药斗的是
[69~71]
- A. 鹿角霜、制附子
B. 生大黄、鱼腥草
C. 羚羊角粉、雷丸
D. 旋覆花、车前子
E. 葫芦壳、灶心土
69. 应先煎的一组中药是
70. 应后下的一组中药是
71. 应包煎的一组中药是
[72~74]
- A. 千金子
B. 益智仁
C. 五味子
D. 龙眼肉
E. 甘草
72. 续随子的正名是
73. 益智的正名是
74. 国老的正名是
[75~76]
- A. 远志去心
B. 炒山药
C. 东阿胶
D. 嫩桂枝
E. 子黄芩
75. 医师处方中对产地提出要求的药名是
76. 医师处方中对品质提出要求的药名是
[77~78]
- A. 大蒜
B. 冰片

- C. 黑豆
D. 花椒
E. 绿豆
77. 宜与蛤蚧对抗贮存的是
78. 宜与土鳖虫对抗贮存的是
[79~80]
- A. 瓜蒌与附子
B. 硫磺与芒硝
C. 白及与半夏
D. 海藻与京大戟
E. 人参与官桂
79. 属“十九畏”的药组是
80. 属“十八反”的药组是
[81~82]
- A. 烫制品
B. 麸炒品
C. 醋炙品
D. 盐炙品
E. 清炒品
81. 处方中写枳壳, 调配时应付
82. 处方中写穿山甲, 调配时应付
[83~84]
- A. 泽泻、山药
B. 紫苏子、莱菔子
C. 麝香、牛黄
D. 当归、川芎
E. 硼砂、芒硝
83. 应阴凉、干燥贮藏的一组中药材和饮片是
84. 应通风、干燥贮藏的一组中药材和饮片是
[85~86]
- A. 2~10℃
B. 10~25℃
C. 2~5℃
D. 避光且不超过 20℃
E. 10~30℃
- 根据 2015 年版《中国药典》“凡例”(贮藏)项下对药品贮藏与保管基本要求的规定

85.凉暗处的温度应控制在

86.常温的温度应控制在

[87~88]

A.相思豆

B.川楝子

C.艾叶

D.千里光

E.黄药子

87.因含蛋白类可导致肝功能损伤的中药是

88.因含生物碱类可导致肝功能损伤的中药

是[89~90]

A.追风丸

B.梅花点舌丸

C.牛黄清心丸

D.六神丸

E.麝香保心丸

89.既含蟾酥,又含雄黄的中成药是

90.既含乌头,又含雄黄的中成药是

三、多项选择题

91.含麻黄类中成药忌与下列药物联用的有

A.降压片

B.珍菊降压片

C.牛黄降压丸

D.复方罗布麻片

E.补心气口服液

92.肾脏是药物代谢和排泄的重要器官,肾功能不全时药物代谢和排泄均会受到影响,导致药物蓄积,从而进一步加重肾脏损害,故肾功能不全者用药时的注意事项有

A.忌用有肾毒性的药物

B.注意药物相互作用

C.坚持少而精的用药原则

D.定期检查,及时调整治疗方案

E.坚持以疾病是否治愈作为判断终点

93.康复的原则包括

A.形神共养

B.调养气血

C.调养阴阳

D.调养脏腑

E.疏通经络

94.某女性老年患者,腹痛,肠鸣腹泻,泻后则安,伴畏寒喜暖,腰膝酸软,舌淡苔白,脉沉细,可选用的中成药有

A.四神丸

B.固本益肠片

C.香连丸

D.参苓白术散

E.枳实导滞丸

95.下列属于因时制宜范畴的是

A.暑邪致病应解暑化湿

B.冬季慎用寒凉

C.夏季慎用温热

D.“冬不用石膏”

E.“夏不用麻黄”

96.医生对饮片新陈提出要求的处方药名是

A.鲜茅根

B.陈佛手

C.绵茵陈

D.鲜芦根

E.陈皮

97.临床治疗有逆治和从治的不同。下列属于逆治的有

A.寒者热之

B.寒因寒用

C.热者寒之

D.热因热用

E.虚则补之

98.医生用药咨询主要有

A.新药信息

B.药物相互作用和禁忌证

C.合理用药信息

D.药品不良反应

E.价格信息

99.含朱砂类组分的药物有

A.抱龙丸

B.紫雪丹

C.更衣丸

D.苏合香丸

E. 安宫牛黄丸

100. 含乌头类的中药有

A. 川乌

B. 附子

C. 雪上一支蒿

D. 草乌

E. 白附子

【参考答案】

➤ 上100题:

1—5: EAACD
6—10: ABBA A
11—15: DCBBA
16—20: BDDDB
21—25: BAEDB
26—30: ACDEB
31—35: DAD EA
36—40: DDEAA
41—45: DDABE
46—50: CBDDBA
51—55: BADEC
56—60: ADEEB
61—65: ECDEC
66—70: EBCBD
71—75: BDDCD
76—80: ACBAB
81—85: BCABC
86—90: DDBAD
91: ABD
92: ABCDE
93: CE
94: ABCE
95: DE
96: ABCE
97: ABCDE
98: ABCE
99: ABCDE
100: ABCE

➤ 下100题:

1—5: CDCCE
6—10: ADABB
11—15: BCAAC
16—20: BBBEE
21—25: CACEA
26—30: CDEDD
31—35: AABBA
36—40: BBACD
41—45: CAEAD
46—50: BACDB
51—55: EDCBD
56—60: EBAAC
61—65: BACBE
66—70: DDEAB
71—75: DAD EC
76—80: EDABA
81—85: BADAD
86—90: EADBD
91: ABCDE
92: ABCD
93: ABCDE
94: AB
95: ABCDE
96: ABCDE
97: ACE
98: ABCD
99: ABCDE
100: ABCD