

涉及考点 | 乙癸同源、水火既济的含义

2年 易错考题

1. 阴中求阳的治法适用于
- A. 阴虚
 - B. 阳虚
 - C. 阴盛
 - D. 阳盛
 - E. 阴阳两虚

【答案】B

【解析】阴阳间相互对立,又相互依存,当出现阳虚病证时,除了使用补阳药外,还应适当运用补阴药,使阳得阴助而生化无穷,此为阴中求阳,这是根据阴阳互根理论确定的治疗原则。

涉及考点 | 阴阳在疾病预防和治疗方面的应用

2. 五行中火的“所胜”是
- A. 木
 - B. 水
 - C. 土
 - D. 金
 - E. 火

【答案】D

【解析】“克我”者是“所不胜”,“我克”者是“所胜”,火的“所胜”,即火“所克”者。根据五行相克次序:水克火,火克金,金克木,木克土,土克水。所以火的“所胜”是金。

涉及考点 | 五行相克

3. 下列关于五行生克规律的表述,正确的是
- A. 木为土之所胜
 - B. 木为水之子
 - C. 火为土之子
 - D. 水为火之所胜
 - E. 金为木之所胜

【答案】B

【解析】五行相生次序:木生火,火生土,土生金,金生水,水生木。“生我”者为母,“我生”者为子。五行相克次序:木克土,土克水,水克火,火克金,金克木。“克我”者为“所不胜”,“我克”者为“所胜”。

涉及考点 | 五行相生与相克

4. 心主神志最主要的物质基础是
- A. 津液
 - B. 精液
 - C. 血液
 - D. 宗气
 - E. 营气

【答案】C

【解析】心藏神,心具有主宰人体五脏六腑、形体官窍的一切生理活动和人体精神意识思维活动的功能。心主血脉,心气可推动和调控血液在脉管中正常运行,流注全身。心的这两种功能相互影响:一方面,心主血脉的功能受心神主宰;另一方面,心神又必须得到心血的濡养才能正常地工作。

涉及考点 | 心的生理功能

5. 根据五行的生克乘侮规律,以下说法错误的是

- A.心火不足，肾水乘之
- B.木火刑金
- C.肝木乘土
- D.心火过亢，反侮肺金
- E.岁土太过，雨湿流行，肾水受邪

【答案】D

【解析】心属火，肺属金，火克金，心火过亢则称心火乘肺金，不是反侮。

涉及考点 | 五行的相生与相克、相乘与相侮

- 6.导致津液输布障碍，水湿痰饮潴留的主要因素是
- A.肺的宣发肃降失职
- B.脾的运化功能失健
- C.肝的疏泄功能失常
- D.肾的主水功能失调
- E.三焦疏通水道不利

【答案】B

【解析】脾居中焦，为人体气机升降的枢纽，故在人体水液代谢过程中起着重要的枢纽作用。因此，脾运化水湿的功能健旺，既能使体内各组织得到水液的充分濡润，又不致使水湿过多而潴留。反之，如果脾运化湿的功能失常，必然导致水液在体内的停滞，而产生水湿、痰饮等病理产物，甚则形成水肿。即所谓脾为“生痰之源”。

涉及考点 | 脾的生理功能

7.《素问·上古天真论》记述了肾气由稚嫩到充盛，由充盛到衰少继而耗竭的演变过程，可见的变化是

- A.筋骨坚，发长极，身体盛壮
- B.三阳脉衰于上，面皆焦，发始白
- C.任脉虚，太冲脉衰少，天癸竭
- D.阳明脉衰，面始焦，发始堕
- E.肾气平均，真牙生而长极

【答案】C

【解析】《素问·上古天真论》：“女子七岁，肾气盛，齿更发长。二七而天癸至，任脉通，太冲脉盛，月事以时下，故有子。三七，肾气平均，故真牙生而长极。四七，筋骨坚，发长极，身体盛壮。五七，阳明脉衰，面始焦，发始堕。六七，三阳脉衰于上，面皆焦，发始白。七七，任脉虚，太冲脉衰少，天癸竭，地道不通，故形坏而无子也。”

涉及考点 | 肾的生理功能

- 8.“吐下之余，定无完气”的生理基础是
- A.气能生津
- B.气能行津
- C.气能摄津
- D.津能载气
- E.津能生气

【答案】D

【解析】津液是气的载体之一，在血脉之外，气必须依附于津液而存在，否则就将涣散不定而无所归。若因汗、吐太过，使津液大量丢失，则气亦随之而外脱，形成“气随津脱”之危候，故曰：“吐下之余，定无完气”。

涉及考点 | 气与津液的关系

- 9.手阳明大肠经在何处交于何经
- A.在鼻翼旁交于足阳明胃经
- B.在拇指端交于手太阴肺经
- C.在小指端交于手太阳小肠经
- D.在无名指端交于手少阳三焦经
- E.在足大趾端交于足太阴脾经

【答案】A

【解析】手阳明大肠经起于示指桡侧端(商阳穴),经过手背行于上肢伸侧前缘,上肩,至肩关节前缘,向后与督脉在大椎穴处相会,再向前下行入锁骨上窝(缺盆),进入胸腔络肺,通过膈肌下行,入属大肠。其分支从锁骨上窝上行,经颈部至面颊,入下齿中,回出夹口两旁,左右交叉于人中,至对侧鼻翼旁,经气于迎香穴处与足阳明胃经相接。

涉及考点 || 十二经脉的交接规律

- 10.治疗血行瘀滞,多配用补气、行气药是由于
- A.气能生血
 - B.气能行血
 - C.气能摄血
 - D.血能生气
 - E.血能载气

【答案】B

【解析】气为血之帅,气能生血、行血、摄血。气能行血,指气的推动作用是血液循行的动力。气可以直接推动血液运行,又可促进脏腑的功能活动,通过脏腑的功能活动推动血液运行。故治疗血行瘀滞时,多配用补气、行气药,气行则血行。

涉及考点 || 气与血的关系

- 11.五行相乘,下列哪种说法是正确的
- A.母气有余而乘其子
 - B.子气有余而乘其母
 - C.气有余则乘己所胜
 - D.气有余则乘己所不胜
 - E.气不及则己所胜侮而乘之

【答案】C

【解析】五行中的某一行过于亢盛,对其所胜行进行超过正常限度的克制,引起其所胜的虚弱,从而导致五行之间的协调关系失常。根据《素问·五运行大论》:“气有余,则制己所胜而侮所不胜;其不及,则己所不胜,侮而乘之,己所胜,轻而侮之”。

涉及考点 || 五行相乘

- 12.关于肺气肃降,说法错误的是
- A.吸入自然界之清气
 - B.呼出体内浊气
 - C.脾转输至肺的津液及部分水谷精微向下向内布散
 - D.将脏腑代谢后产生的浊液下输于膀胱
 - E.肺气向内向下的布散运动

【答案】B

【解析】肺气宣发,是肺气向上向外的布散运动,主要体现在以下三个方面:一是呼出体内浊气。二是将脾所转输来的津液和部分水谷精微上输头面诸窍,外达于全身皮毛肌腠。三是宣发卫气于皮毛肌腠,以温分肉,充皮肤,肥腠理,司开阖,将代谢后的津液化为汗液,并控制和调节其排泄。选项 B 为肺气宣发的具体表现,所以本题选 B。

涉及考点 || 肺的生理功能特性

- 13.“壮水之主,以制阳光”是指
- A.以阳中求阴之法调整阴阳偏衰
 - B.以阴中求阳之法调整阴阳偏衰
 - C.泻热之法,调整阳偏衰
 - D.以补阴之法,治疗阴虚阳亢之证
 - E.以补阳之法,治疗阴虚阳亢之证

【答案】D

【解析】阴虚则热的虚热证,治宜滋阴以抑阳,即王冰所谓“壮水之主,以制阳光”,《内经》所谓“阳病治阴”。

涉及考点 | 阴阳失调

14.“益火之源,以消阴翳”,所指的是

- | | |
|--------|--------|
| A.补阴扶阳 | B.阳病治阴 |
| C.阴中求阳 | D.阳中求阴 |
| E.阴病治阳 | |

【答案】E

【解析】阴阳互制之调补阴阳:阳虚则寒的虚寒证,治宜扶阳以抑阴,即王冰所谓“益火之源,以消阴翳”,《内经》所谓“阴病治阳”。

涉及考点 | 阴阳失调

15.按十二经脉的流注次序,肝经流注于哪条经脉之前

- | | |
|-------|------|
| A.膀胱经 | B.胆经 |
| C.三焦经 | D.心经 |
| E.肺经 | |

【答案】E

【解析】十二经脉流注次序:肺大胃脾心小肠,膀肾包焦胆肝藏。

涉及考点 | 十二经脉的流注次序

16.《素问·五藏生成》说:多食辛,则

- | | |
|----------|----------|
| A.肉胝皱而唇揭 | B.筋急而爪枯 |
| C.骨痛而发落 | D.脉凝泣而变色 |
| E.皮槁而毛拔 | |

【答案】B

【解析】《素问·五藏生成》说:“多食咸,则脉凝泣而变色,多食苦,则皮槁而毛拔;多食辛,则筋急而爪枯;多食酸,则肉胝皱而唇揭;多食甘,则骨痛而发落,此五味之所伤也。”

涉及考点 | 饮食偏嗜

17.所谓“得气”体现的经络功能是

- | | |
|----------|----------|
| A.沟通联络作用 | B.运输渗灌作用 |
| C.感应传导作用 | D.调节平衡作用 |
| E.运行气血作用 | |

【答案】C

【解析】经络的生理机能为沟通联系作用、运输渗灌作用、感应传导作用、调节作用。感应传导,是指经络系统具有感应及传导针灸或其他刺激等各种信息的作用。如对经穴刺激引起的感应及传导,通常称为“得气”,即局部有酸、麻、胀的感觉及沿经脉走向传导,就是经络感应传导作用的体现。

涉及考点 | 经络的生理功能

18.患者四肢冰凉,神志昏迷,口臭。口渴引饮,脉有力,辨证为

- | | |
|---------|---------|
| A.表热证 | B.里虚热证 |
| C.表寒里热证 | D.真假寒热证 |

E.真热假寒证

【答案】E

【解析】真热假寒是内热炽盛而外见寒象的证候。四肢冰凉是因内热过盛，阳气闭郁不能外达所致。口臭，口渴引饮，脉有力，此类都是内有实热的表现。

涉及考点 | 真热假寒

19.补阳时适当配伍补阴药的方法是

- | | |
|--------|--------|
| A.阴中求阳 | B.阳中求阴 |
| C.阴病治阳 | D.阳病治阴 |
| E.阴阳双补 | |

【答案】A

【解析】善补阳者，必于阴中求阳，则阳得阴助而生化无穷。根据阴阳互补的原理，补阳时适当佐以补阴药谓之阴中求阳。

涉及考点 | 调整阴阳

(20~21题共用备选答案)

- | | |
|--------|--------|
| A.津 | B.液 |
| C.受纳水谷 | D.贮存尿液 |
| E.运化 | |

20.小肠主

【答案】B

21.胃主

【答案】C

【解析】选项 A 大肠主津。选项 B 小肠主液。选项 C 胃受纳水谷。选项 D 膀胱贮存尿液。选项 E 脾主运化。

涉及考点 | 胃、小肠的生理机能

(22~23题共用备选答案)

- | | |
|------|------|
| A.督脉 | B.任脉 |
| C.冲脉 | D.带脉 |
| E.维脉 | |

22.与女子妊娠关系密切，主胞胎的是

【答案】B

【解析】任脉起于胞中，与女子妊娠有关，称“任主胞胎”。

23.与妇女月经关系密切的是

【答案】C

【解析】冲脉有“十二经脉之海”“血海”之称，与女子月经及孕育机能密切相关。

涉及考点 | 任脉、冲脉的基本机能

(24~25题共用备选答案)

- | | |
|---------|---------|
| A.益火补土法 | B.金水相生法 |
| C.抑木扶土法 | D.培土制水法 |
| E.泻南补北法 | |

24.肾阳虚不能温脾，以致脾阳不振，其治疗宜采用

【答案】A

【解析】益火补土法是温肾阳补脾阳的一种方法，适用于肾阳不能温煦脾土的脾肾阳虚证。

25.脾虚不运或脾肾阳虚，水湿泛滥而致的水肿胀满之证，其治疗宜采用

【答案】D

【解析】培土制水法是通过温运脾阳或健脾温肾治疗水湿停蓄的一种方法，适用于脾虚不运或脾肾阳虚、水湿泛滥而致的水肿胀满之证。

涉及考点 | 五脏疾病的具体治法

26.适用于热结旁流的治则是

- | | |
|--------|--------|
| A.热因热用 | B.寒因寒用 |
| C.通因通用 | D.塞因塞用 |
| E.寒者热之 | |

【答案】C

【解析】通因通用，即以通治通，是用通利的药物来治疗具有通泻症状的实证。适用于“大实有羸状”的真假虚证。

涉及考点 | 反治

27.《素问·上古天真论》中关于“丈夫五六”在生理上的表现是

- | | |
|------------------|-------------------|
| A.阳气衰竭于上，面焦，发鬓斑白 | B.肾气衰，发堕齿槁 |
| C.肾脏衰，形体皆极 | D.肝气衰，筋不能动，天癸竭，精少 |
| E.三阳脉衰于上，面皆焦，发始白 | |

【答案】B

【解析】丈夫八岁，肾气实，发长齿更。二八，肾气盛，天癸至，精气溢泻，阴阳和，故能有子。三八，肾气平均，筋骨强劲，故真牙生而长极。四八，筋骨隆盛，肌肉满壮。五八，肾气衰，发堕齿槁。六八，阳气衰竭于上，面焦，发鬓颁白。七八，肝气衰，筋不能动，天癸竭，精少，肾藏衰，形体皆极。八八，则齿发去。

涉及考点 | 《素问·上古天真论》

28.《素问·上古天真论》提到女子“三阳脉衰于上，面皆焦，发始白”的年龄是

- | | |
|------|------|
| A.二七 | B.四七 |
| C.五七 | D.六七 |
| E.三七 | |

【答案】D

【解析】女子七岁，肾气盛，齿更发长。二七而天癸至，任脉通，太冲脉盛，月事以时下，故有子。三七，肾气平均，故真牙生而长极。四七，筋骨坚，发长极，身体盛壮。五七，阳明脉衰，面始焦，发始堕。六七，三阳脉衰于上，面皆焦，发始白。七七，任脉虚，太冲脉衰少，天癸竭，地道不通，故形坏而无子也。

涉及考点 | 《素问·上古天真论》

29.阳偏盛而导致的实热证，其治疗方法为

- | | |
|--------|--------|
| A.阴病治阳 | B.热因热用 |
| C.热者寒之 | D.寒者热之 |
| E.阳中求阴 | |

【答案】C

【解析】“阳盛则热”的实热证，据阴阳对立制约原理，宜用寒凉药物以泻其偏盛之阳热，此即“热者寒之”之意。

涉及考点 | 正治

30.“湿浊内生”的主要机理是

- A.肺气不足，寒饮内停
- B.胸阳不振，阴寒内盛
- C.恣食生冷，内伤脾胃
- D.脾肾阳虚，阴寒内盛
- E.痰湿内阻，从阴化寒

【答案】C

【解析】内湿的产生，多因过食肥甘，嗜烟好酒，恣食生冷，内伤脾胃，致使脾失健运不能为胃行其津液，或喜静少动，素体肥胖，情志抑郁，致气机不利，津液输布障碍，聚而成湿所致。因此，脾的运化失职是湿浊内生的关键。

涉及考点 | 湿浊内生的机理

金英杰医学教育

痛等，往往都具有绞痛的特点。

涉及考点 || 问疼痛

90. 前额头痛连及眉棱骨属于
- A. 阳明头痛
 - B. 少阳头痛
 - C. 厥阴头痛
 - D. 太阳头痛
 - E. 太阴头痛

【答案】A

【解析】少阴经头痛：头痛连齿；阳明经：前额部连眉棱骨痛；少阳经：两侧头痛；太阳经：后头部连头项痛；厥阴经：巅顶痛。

涉及考点 || 问疼痛

2年 易错考题

1. 渴喜热饮而量不多，或水入即吐多为
- A. 湿热内蕴
 - B. 痰饮内停
 - C. 营分热盛
 - D. 阴虚津亏
 - E. 瘀血内阻

【答案】B

【解析】渴喜热饮，饮水不多，多为痰饮内停证或阳虚水津不布。

涉及考点 || 问饮食

2. 大便时干时稀是因
- A. 脾气虚
 - B. 脾阳虚
 - C. 食滞胃肠
 - D. 肝郁脾虚
 - E. 脾肾阳虚

【答案】D

【解析】溏结不调即大便时干时稀的症状，多因肝郁脾虚所致。

涉及考点 || 望二便

3. 滑脉、动脉二者脉象相似的特点是
- A. 脉形如豆
 - B. 来去俱盛
 - C. 来盛去衰
 - D. 往来流利
 - E. 脉率均快

【答案】D

【解析】滑脉往来流利，如盘走珠，应指圆滑；动脉脉形如豆，厥厥动摇，滑数有力。两脉均见往来流利。

涉及考点 || 脉象

4. 不具有短、滑、数3种脉象的特点的是
- A. 动脉
 - B. 涩脉
 - C. 弦脉
 - D. 滑脉
 - E. 数脉

【答案】B

【解析】动脉：脉形如豆，厥厥动摇，滑数有力；涩脉：脉细而缓，往来艰涩不畅，如轻刀刮竹；弦脉：端直以长，如按琴弦；滑脉：往来流利，如盘走珠，应指圆滑；数脉：脉来急促，一息五六至。

涉及考点 | 脉象

5.以下脉象中除哪项外均易出现于气血两虚证中

- A.濡脉
- B.弱脉
- C.细脉
- D.涩脉
- E.虚脉

【答案】D

【解析】涩脉临床见于气滞血瘀，精伤血少。

涉及考点 | 脉象

6.下列各项不属于面赤临床意义的是

- A.肝火上炎
- B.阴虚证
- C.戴阳证
- D.实热证
- E.肾精久耗

【答案】E

【解析】本题主要考察的是五色与疾病的关系。面赤多属于阳热有余或者阴虚不足。所以前四个选项都可以，但是肾精久耗一般情况多见黑色，因为五色中肾对应的是黑色。

涉及考点 | 五色与脏腑疾病的关系

7.阳明经证与腑证的鉴别要点是

- A.有无汗出
- B.有无发热
- C.有无神志改变
- D.有无燥屎内结
- E.有无舌苔黄燥

【答案】D

【解析】阳明经证是指邪热亢盛，充斥阳明经，弥漫全身，而肠中无燥屎内结。阳明腑证指邪热内盛阳明之里，与肠中糟粕相结，燥屎内结所表现的证候。所以两者之间的鉴别要点为有无燥屎内结。

涉及考点 | 阳明病热证、实证

8.下列各项，不属于气分证临床表现的是

- A.心烦懊恼
- B.便秘尿赤
- C.胁痛口苦
- D.谵语狂乱
- E.身热夜甚

【答案】E

【解析】气分证为里实热证候，临床可见发热，反恶热，口渴，心烦，尿赤，便秘，或时有谵语、狂乱，舌红苔黄，脉数有力。身热夜甚为热入营分的表现。

涉及考点 | 气分证

(9~10题共用备选答案)

- A.伸舌时舌体歪向一侧
- B.舌体紧缩，不能伸长
- C.舌体震颤抖动，不能自主
- D.舌伸出口外，不即回缩或立即收回
- E.舌体软弱，无力伸缩，痿废不用

9.颤动舌的舌象特征是

【答案】C

10.吐弄舌的舌象特征是

【答案】D

【解析】伸舌时舌体歪向一侧，称歪斜舌；舌体紧缩，不能伸长，称为短缩舌；舌体不自主地颤动，动摇不宁者，称颤动舌；舌伸于口外，不即回缩者，称为吐舌，伸舌即回缩，或反复舐口唇四周，摇动不宁者，均称弄舌；舌体软弱，无力伸缩，痿废不用称为痿软舌。

涉及考点 || 舌态变化

(11~12题共用备选答案)

- | | |
|-----|-----|
| A.滑 | B.促 |
| C.弦 | D.涩 |
| E.数 | |

11.胸痹心痛患者，脉象多见

【答案】C

12.心烦不寐患者，脉象多见

【答案】E

【解析】弦脉主疼痛，所以在胸痹心痛中会出现弦脉。数脉主热证，心烦不寐患者多为阳热或虚热导致。

涉及考点 || 常见脉象

(13~14题共用备选答案)

- | | |
|------------------|----------------------|
| A.面色苍白，口唇青紫 | B.头晕眼花，气短疲乏 |
| C.脘腹坠胀，便意频频，久泻脱肛 | D.神疲乏力，气短，汗出不止，劳累后加重 |
| E.全身瘫痪，神识朦胧 | |

13.气不固证的临床表现为

【答案】D

14.气陷证的临床表现为

【答案】C

【解析】气虚不固证的临床表现：少气懒言，乏力，舌淡，脉虚无力或自汗或出血，或大便失禁，或余沥不尽，遗尿，小便失禁，滑胎小产，遗精早泄。气陷证的临床表现：头晕目眩，少气倦怠，便意频频，久泻久痢，形体消瘦，腹部有坠胀感，内脏下垂，脱肛，子宫脱垂，舌淡苔白，脉弱。

涉及考点 || 气陷证、气不固证

(15~18题共用备选答案)

- | | |
|-------------------|------------------|
| A.肌肤水肿，无汗，身体疼痛 | B.胸胁胀满，咳唾引痛 |
| C.胸闷，咳喘，不能平卧，其形如肿 | D.喉中有物，吞之不下，吐之不出 |
| E.肠鸣辘辘有声 | |

15.饮留胸胁则见

【答案】B

16.饮在胸膈则见

【答案】C

17.饮留肠间则见

【答案】E

18. 饮溢肌肤则见

【答案】A

[解析] 胸胁胀满疼痛、呼吸、咳唾，转侧时加重，气短息促，为饮留胸胁。咳喘胸满，不能平卧，呼吸困难，痰如白沫量多，久咳则面目浮肿，为饮留胸膈脘腹胀满而疼，肠间辘辘有声，为饮留胃肠。四肢沉重或关节疼痛，甚则肢体微肿，为饮溢肌肤。

涉及考点 | 饮证

(19~20题共用备选答案)

- A. 咳嗽痰多，胸闷
- B. 神昏，喉中痰鸣
- C. 形体肥胖
- D. 脘痞纳呆
- E. 肌肤见圆滑包块

19. 痰泛于肌肤的临床表现是

【答案】E

20. 痰浊中阻，胃失和降的临床表现是

【答案】D

涉及考点 | 痰证

(21~22题共用备选答案)

- A. 脾不统血证
- B. 脾虚气陷证
- C. 寒湿困脾证
- D. 脾阳虚证
- E. 脾气虚证

21. 症见神疲乏力，气短懒言，脘腹坠胀，小便混如米泔，其证候是

【答案】B

22. 症见脘腹胀闷，泛恶欲呕，腹痛便溏身重，其证候是

【答案】C

[解析] 脾虚气陷证的临床表现：除脾气虚证表现外，尚见眩晕耳鸣，脘腹坠胀，便意频数，肛门重坠，或久泻久痢，或小便浑浊如米泔，或脱肛、子宫下垂、胃肾下垂、眼睑下垂，舌淡苔白，脉弱。寒湿困脾的临床表现：脘腹痞闷胀痛，泛恶欲吐，口淡不渴，纳呆便溏，头身困重，或身目发黄，晦暗如烟熏色，或浮肿，小便短少，或妇女白带量多清稀，舌淡胖苔白腻，脉濡缓。

涉及考点 | 脾虚气陷证、寒湿困脾证

(23~24题共用备选答案)

- A. 真寒假热
- B. 真热假寒
- C. 真虚假实
- D. 真虚假实
- E. 不虚不实

23. 热结肠胃，痰食壅积，以致经脉阻滞，气血不能畅达，致倦怠懒言，身羸瘦，脉细，此为

【答案】C

24. 脏腑虚衰，气血不足，运化无力，致腹部胀满，呼吸喘促，二便闭涩等，此为

【答案】D

[解析] 当病情发展到寒极或热极的时候，有时会出现一些与其寒热本质相反的“假象”症状或体征，即所谓真热假寒、真寒假热。虚证与实证，都有真假疑似的情况。所谓“至虚有盛候”“大实有羸状”，就是指证候的虚实真假。虚实真假的辨别，关键在于脉象的有力无力、有神无神，其中尤以沉取之象为真谛。

涉及考点 || 证候真假

(25~26题共用备选答案)

- A.肝阳化风证 B.阴虚动风证
 C.血虚生风证 D.热极生风证
 E.肝阳上亢证

25.可见步履不稳,眩晕欲仆症状的是

【答案】A

26.可见眩晕肢体震颤,面白无华症状的是

【答案】C

【解析】肝阳化风可见眩晕欲仆,步履不稳。阴虚风动以手足蠕动,眩晕耳鸣为主。血虚生风以手足震颤,伴面色无华为主。热极生风以高热烦躁,颈项强直为主。肝阳上亢以眩晕耳鸣,头目胀痛为主。

涉及考点 || 肝风内动四证

(27~28题共用备选答案)

- A.肺肾气虚 B.肺气虚
 C.脾肺气虚 D.心肺气虚
 E.肾气不固

27.久病咳喘,乏力少气,呼多吸少,自汗耳鸣,舌淡脉弱。其证候是

【答案】A

28.久病咳喘,胸闷心悸,乏力少气,自汗声低,舌淡脉弱。其证候是

【答案】D

涉及考点 || 肺肾气虚、心肺气虚证

29.假神的病机是

- A.气血不足,精神亏损 B.机体阴阳严重失调
 C.脏腑虚衰,功能低下 D.精气衰竭,虚阳外越
 E.阴盛于内,格阳于外

【答案】D

【解析】久病、重病之人,精气本已极度衰竭,而突然出现某些神气暂时“好转”的虚假表现,是为假神。假神的出现,是因为脏腑精气极度衰竭,正气将脱,阴不敛阳,虚阳外越,阴阳即将离决所致,常是危重病人临终前的征兆。

涉及考点 || 假神

30.气血两虚证的舌象表现为

- A.舌体淡瘦 B.舌淡齿痕
 C.舌尖芒刺 D.舌暗瘀点
 E.舌红裂纹

【答案】A

【解析】当气血两虚时,气血不能濡养舌体,舌体失于濡养后出现瘦的表现。且因气血虚少,舌色呈现淡白。选项B项属脾虚,选项C项为心火,选项D项为血瘀,选项E项为热盛伤津。

涉及考点 || 舌形变化

- C.桔梗
- D.前胡
- E.白芥子

【答案】B

【解析】白前有降气化痰之功效。旋覆花降气化痰、降逆止呕。桔梗宣肺、祛痰、利咽、排脓。前胡降气化痰、疏散风热。白芥子温肺化痰、利气散结，通络止痛。

涉及考点 | 旋覆花的功效

88.丹参治疗疮痈肿痛，其功效是

- A.活血化瘀
- B.凉血止血
- C.凉血消痈
- D.行气止痛
- E.凉血活血

【答案】E

【解析】丹参属于活血调经药，其药性苦，微寒，归心，肝经。所以属于凉血活血药，适用于血热瘀滞者。

涉及考点 | 丹参的功效

2年 易错考题

(1~2题共用备选答案)

- A.山茱萸
- B.五倍子
- C.莲子
- D.诃子
- E.金樱子

1.具有补脾止泻，养心安神功效的药物是

【答案】C

2.具有益肾固精，养心安神功效的药物是

【答案】C

【解析】山茱萸补益肝肾，收敛固涩；五倍子敛肺降火，止咳止汗，涩肠止泻，固精止遗，收敛止血，收湿敛疮；莲子补肾固精缩尿，补脾止泻止带，养心安神；诃子敛肺止咳，利咽开音，涩肠止泻；金樱子固精缩尿止带，涩肠止泻。

涉及考点 | 莲子的功效

(3~4题共用备选答案)

- A.肝、脾经
- B.肝、肾经
- C.肺、肝、肾经
- D.心、脾经
- E.肝、心、肾经

3.熟地的归经是

【答案】B

4.白芍的归经是

【答案】A

【解析】熟地和白芍都属于补血药，但是归经不同，功效也不同。熟地归肝、肾经，功效是补血养阴，填精益髓；白芍归肝、脾经，功效是养血敛阴，柔肝定痛，平抑肝阳。

涉及考点 | 熟地、白芍的性味

(5~6题共用备选答案)

- A.祛寒除湿
- B.祛风止痒
- C.益肝明目
- D.活血止痛
- E.温脾止泻

5.补骨脂具有的功效是

【答案】E

6.仙茅具有的功效是

【答案】A

【解析】补骨脂补肾助阳，固精缩尿，温脾止泻，纳气平喘。仙茅温肾壮阳，祛寒除湿。

涉及考点 | 补骨脂、仙茅的功效

(7~8题共用备选答案)

- A.补肾助阳，固精缩尿，养肝明目
- B.补肺益肾，纳气平喘，助阳益精
- C.补肾阳，强筋骨，祛寒湿
- D.补肾阳，强筋骨，祛风湿
- E.补肝肾，强筋骨，止崩漏

7.沙苑子的功效是

【答案】A

8.淫羊藿的功效是

【答案】D

【解析】沙苑子和淫羊藿都属于补阳药。沙苑子药性甘，温，归肝、肾经，功效是补肾固精，养肝明目；淫羊藿药性辛、甘，温，归肾、肝经，功效是补肾壮阳，祛风除湿。

涉及考点 | 沙苑子、淫羊藿的功效

(9~10题共用备选答案)

- A.合欢皮
- B.酸枣仁
- C.远志
- D.琥珀
- E.磁石

9.既能活血消肿，又能解郁安神的药物是

【答案】A

10.既能活血散瘀，又能镇惊安神的药物是

【答案】D

【解析】合欢皮解郁安神，活血消肿；酸枣仁养心益肝，安神，敛汗；远志宁心安神，祛痰开窍，消散痈肿；琥珀镇惊安神，活血散瘀，利尿通淋；磁石镇惊安神，平肝潜阳，聪耳明目，纳气定喘。

涉及考点 | 合欢皮、琥珀的功效

(11~12题共用备选答案)

- A.杀虫，疗癬
- B.清热解毒，凉血止血，杀虫
- C.杀虫，解暑
- D.杀虫消积，行气利水，截疟
- E.杀虫，润肺下气止咳

11.槟榔的功效是

【答案】D

12.百部的功效是

【答案】E

【解析】槟榔药性辛、苦，温，归胃、大肠经。其功效是杀虫消积，行气，利水，截疟。百部药性甘、苦，微温，归肺经。其功效是润肺下气止咳，杀虫灭虱。

涉及考点 | 槟榔、百部的功效

(13~14题共用备选答案)

- A. 胃热呕吐
- B. 气逆呕吐
- C. 胃虚呕吐
- D. 胃寒呕吐
- E. 妊娠呕吐

13. 竹茹的主治病证是

【答案】A

14. 旋覆花的主治病证是

【答案】B

【解析】竹茹属于清热化痰药，其性甘，微寒，归肺胃心胆经，有清热化痰，除烦止呕的功效，可以治疗胃热呕吐。旋覆花属于温化寒痰药，具有降气，消痰，行水，止呕的功效，可以治疗气逆呕吐。

涉及考点 | 竹茹、旋覆花的主治

15. 具有息风镇痉、攻毒散结、通络止痛功效的药物是

- A. 全蝎、蜈蚣
- B. 地龙、僵蚕
- C. 龙骨、牡蛎
- D. 石决明、决明子
- E. 天麻、钩藤

【答案】A

【解析】全蝎、蜈蚣的功效都是息风止痉，攻毒散结，通络止痛，两味药相须有协同增效作用，与题意相符。地龙与僵蚕都有息风之效；天麻与钩藤都有平息肝风止痉之效；龙骨与牡蛎都有重镇安神、平肝潜阳、收敛固涩之效，石决明与决明子都有清肝明目之效。

涉及考点 | 全蝎、蜈蚣的功效

16. 治疗外感风热，咳嗽痰多，咽痛音哑，胸闷不舒者，应首选

- A. 百部
- B. 川贝母
- C. 桔梗
- D. 杏仁
- E. 旋覆花

【答案】C

【解析】百部主治新旧咳嗽，百日咳，蛲虫，排除选项 A。川贝母主治虚劳咳嗽，肺热燥咳，排除选项 B。杏仁主治咳嗽气喘，肠燥便秘，排除选项 D。旋覆花主治咳嗽痰多，痰饮蓄结，呕吐，排除选项 E。桔梗主治咳嗽痰多，胸闷不畅，咽喉肿痛，肺痈咳嗽。

涉及考点 | 桔梗的应用

17. 半夏的归经是

- A. 心、脾、肾经
- B. 肝、脾、肾经
- C. 肺、胃、肾经
- D. 心、肝、胃经
- E. 肺、脾、胃经

【答案】E

【解析】半夏味辛、性温，有毒，归脾、胃、肺经。

涉及考点 | 半夏的归经

18.治疗痰壅气逆,咳喘痰多,胸闷食少,甚则不能平卧,宜选用的药物是

- | | |
|---------------|--------------|
| A.紫苏子、白芥子、莱菔子 | B.紫菀、款冬花、川贝母 |
| C.桑叶、贝母、北沙参 | D.杏仁、麻黄、甘草 |
| E.麻黄、石膏、杏仁 | |

【答案】A

【解析】紫苏子、白芥子、莱菔子用于痰壅气逆,咳喘痰多,胸闷食少,甚则不能平卧,选项 A 合适。紫菀、款冬花、川贝母用于肺热咳喘,排除选项 B。桑叶、贝母、北沙参,用于肺热或燥热伤肺,咳嗽痰少,色黄而黏稠,或干咳,咽痒等,排除选项 C。杏仁、麻黄、甘草,用于治疗风寒外束,肺气壅遏的喘咳实证,排除选项 D。杏仁、麻黄、石膏,用于肺热壅盛,高热喘急,排除选项 E。

涉及考点 | 紫苏子、白芥子、莱菔子的应用

19.可用于治疗血滞经闭,癥瘕的药物是

- | | |
|-------|------|
| A.马钱子 | B.三棱 |
| C.血竭 | D.儿茶 |
| E.自然铜 | |

【答案】B

【解析】马钱子的功效是通络止痛,散结消肿。主治跌打损伤,骨折肿痛;风湿顽痹,麻木瘫痪;痈疽疮毒,咽喉肿痛。三棱的功效是破血行气,消积止痛,其破血力量较强,善于治疗血滞经闭以及癥瘕。血竭应用于跌打损伤;心腹疼痛;外伤出血;疮疡不敛。儿茶应用于跌仆伤痛;外伤出血;吐血衄血;疮疡不敛;湿疹;湿疮;牙疳;痔疮;肺热咳嗽。自然铜应用于跌打损伤;筋骨折伤;瘀肿疼痛。

涉及考点 | 三棱的应用

20.桃仁的功效是

- | | |
|-------------|------------------|
| A.活血行气,润肠通便 | B.活血祛瘀,润肠通便,止咳平喘 |
| C.活血止痛,解毒消痈 | D.活血祛瘀,止咳平喘 |
| E.行气活血,祛风止痛 | |

【答案】B

【解析】桃仁属于活血调经药,其性苦甘平,归心肝大肠经,有活血祛瘀,润肠通便,止咳平喘的功效,可以治疗血瘀证,肠燥便秘,咳嗽气喘的病症。

涉及考点 | 桃仁的功效

21.善治血热便血、痔血及肝热目赤头痛的药物是

- | | |
|------|------|
| A.虎杖 | B.槐花 |
| C.小蓟 | D.地榆 |
| E.大蓟 | |

【答案】B

【解析】虎杖主治湿热黄疸,淋浊,带下;水火烫伤,痈肿疮毒,毒蛇咬伤;经闭,癥瘕,跌打损伤;肺热咳嗽;热结便秘。槐花主治血热出血证;目赤,头痛。小蓟主治血热妄行的咯血、衄血、吐血、尿血及崩漏;热毒痈肿。地榆主治下焦血热的便血、痔血、血痢、崩漏;烫伤、湿疹、疮疡痈肿等。大蓟主治血热出血证;热毒痈肿。

涉及考点 | 槐花的主治病证

22. 均能治疗蛔虫、蛲虫证，小儿疳积的药物是

- A.使君子 B.苦楝皮
C.麦芽 D.稻芽
E.槟榔

【答案】A

【解析】使君子功效是杀虫消积，可应用于蛔虫病、蛲虫病和小儿疳积。而麦芽、稻芽属于消食类药物，不具有驱虫的功效，苦楝皮和槟榔虽有驱虫的功效，却无治疗小儿疳积的功效，与题意不符。

涉及考点 | 使君子的主治病证

23. 治疗夏伤暑湿，身热烦渴，小便不利，泄泻者，应首选

- A.茯苓 B.猪苓
C.金钱草 D.滑石
E.泽泻

【答案】D

【解析】茯苓主治水肿，痰饮，脾虚泄泻，心悸、失眠，排除选项 A。猪苓主治水肿，小便不利，泄泻，排除选项 B。金钱草主治湿热黄疸，石淋、热淋；痈肿疔疮、毒蛇咬伤，排除选项 C。泽泻主治水肿，小便不利，泄泻，淋证，遗精，排除选项 E。滑石主治热淋，石淋，尿热疼痛，暑湿，湿温，湿疮，湿疹，痱子；滑石既能利水湿，又能解暑热，是治疗暑热常用药。

涉及考点 | 滑石的应用

24. 桑寄生、五加皮除均可祛风湿外，还具有的功效是

- A.清热安胎 B.利尿消肿
C.定惊止痉 D.温通经络
E.补肝肾，强筋骨

【答案】E

【解析】桑寄生祛风湿，补肝肾，强筋骨，安胎；五加皮祛风湿，补肝肾，强筋骨，利水。桑寄生、五加皮除均可祛风湿外，还能补肝肾、强筋骨。

涉及考点 | 桑寄生、五加皮功效的共同点

25. 既能泻下逐水，又能去积杀虫的药物是

- A.槟榔 B.甘遂
C.使君子 D.牵牛子
E.京大戟

【答案】D

【解析】槟榔杀虫消积，行气利水，截疟，排除选项 A。甘遂泻水逐饮，消肿散结，排除选项 B。使君子杀虫消积，排除选项 C。京大戟泻水逐饮，消肿散结，排除选项 E。牵牛子泻下逐水，去积杀虫。

涉及考点 | 牵牛子的功效

26. 既能清热燥湿，又能泻火解毒，尤善治疗痈疽疔疮的药物是

- A.决明子 B.生地黄
C.大血藤 D.黄连
E.马勃

【答案】D

【解析】这几味药都属于清热药,其中黄连既能清热燥湿,又能泻火解毒,可用于治疗痈肿疔毒。决明子清热明目,润肠通便;马勃清热解毒,利咽,止血;生地黄清热凉血,养阴生津,均不适合治疗痈疽疔疮。大血藤是治疗肠痈的要药,但不能治疗疔疮。

涉及考点 黄连的应用

27. 黄芩具有而黄柏不具有的功效是

- | | |
|--------|--------|
| A. 燥湿 | B. 泻火 |
| C. 解毒 | D. 清肺热 |
| E. 退虚热 | |

【答案】D

【解析】黄芩清热燥湿、泻火解毒、凉血止血、安胎。黄柏清热燥湿、泻火解毒、清退虚热。A、B、C三个选项为两者同有功效,选项D为黄芩有而黄柏没有的功效;选项E为黄柏有而黄芩没有的功效。

涉及考点 黄芩、黄柏功效的不同点

28. 葛根的功效,以下说法错误的是

- | | |
|---------|---------|
| A. 解肌退热 | B. 升阳止泻 |
| C. 透疹 | D. 解痉 |
| E. 生津止渴 | |

【答案】B

【解析】葛根是属于发散风热药。葛根具有解肌退热,生津止渴,透疹,升阳止泻,通经活络,解酒毒的作用。所以B是错误的。

涉及考点 葛根的功效

29. 具有收敛止血、止痢、截疟、补虚功效的药物是

- | | |
|--------|--------|
| A. 苦楝皮 | B. 沙苑子 |
| C. 侧柏叶 | D. 仙鹤草 |
| E. 三七 | |

【答案】D

【解析】苦楝皮的功效是杀虫,疗癣。沙苑子的功效是补肾助阳,固精缩尿,养肝明目。侧柏叶的功效是凉血止血,化痰止咳,生发乌发。仙鹤草的功效是收敛止血,止痢,截疟,补虚。三七的功效是散瘀之血,消肿定痛。

涉及考点 仙鹤草的功效

涉及考点 || 麦门冬汤、旋覆代赭汤的配伍意义

(77~78题共用备选答案)

- | | |
|------|------|
| A.白术 | B.泽泻 |
| C.猪苓 | D.滑石 |
| E.猪苓 | |

77.五苓散中起补气健脾作用的方剂是

【答案】A

78.猪苓汤中起清热利水作用的方剂是

【答案】D

【解析】五苓散的功用是利水渗湿，温阳化气，方中重用泽泻为君，甘淡利水渗湿，臣以茯苓、猪苓淡渗，增强其利水渗湿之力，佐以白术，和茯苓健脾以运化水湿，佐以桂枝温阳化气以助利水，解表散邪以祛表邪。猪苓汤的功用是利水养阴清热，方中猪苓为君，专以淡渗利湿，臣以泽泻、茯苓甘淡，增加猪苓利水渗湿之力，且泽泻性寒能泄热，茯苓尚可健脾运湿，佐以滑石甘寒，利水、清热两彰其功，阿胶滋阴润燥，既益已伤之阴，又防诸药渗利重伤阴血。

涉及考点 || 五苓散、猪苓汤的配伍意义

(79~80题共用备选答案)

- | | |
|-----------|----------|
| A.祛风湿止泻 | B.祛风湿止痛 |
| C.祛风胜湿清热 | D.祛风胜湿化痰 |
| E.祛风湿，补肝肾 | |

79.九味羌活汤和羌活胜湿汤共同点是

【答案】B

80.羌活胜湿汤和独活寄生汤共同点是

【答案】B

【解析】九味羌活汤的功用是发汗祛湿，兼清里热，主治外感风寒湿邪，内有蕴热证。羌活胜湿汤的功用是祛风、胜湿、止痛，主治风湿在表之闭证。九味羌活汤和羌活胜湿汤均可祛风胜湿、治头身痛。独活寄生汤的功用是祛风湿，止痹痛，益肝肾补气血主治痹证日久、肝肾两虚、气血不足证。羌活胜湿汤和独活寄生汤均可祛风胜湿止痛。

涉及考点 || 九味羌活汤、羌活胜湿汤、独活寄生汤的功用

2年 易错考题

1.主治外感风寒湿邪，内有蕴热证的方剂是

- | | |
|-------------|---------|
| A.败毒散 | B.九味羌活汤 |
| C.羌活胜湿汤 | D.柴葛解肌汤 |
| E.麻黄杏仁甘草石膏汤 | |

【答案】B

【解析】九味羌活汤以羌活为君，散表寒，祛风湿，利关节，止痹痛，为治太阳风寒湿邪在表之要药。以苍术、防风解表除湿为臣。细辛、白芷、川芎“分经论治”头痛，生地、黄芩清泄里热，以上五味俱为佐药。甘草调和为使。诸药配伍，既兼治内外，又属六经，协调表里而成发汗祛湿，兼清里热之剂。

涉及考点 | 九味羌活汤的主治证候

2. 银翘散中辛而微温，协君药开皮毛以助祛邪的是
- A. 薄荷、桔梗
 - B. 芦根、竹叶
 - C. 薄荷、牛蒡子
 - D. 荆芥穗、淡豆豉
 - E. 金银花、连翘

【答案】D

【解析】银翘散于辛凉之中配伍少量辛温之品。荆芥穗、淡豆豉辛而微温，解表散邪，虽属辛温，但辛而不烈，温而不燥，配入辛凉解表方中，增强辛散透表之力，是为去性取用之法。

涉及考点 | 银翘散的配伍意义

3. 完带汤中起燥湿运脾作用的药物是
- A. 苍术
 - B. 车前子
 - C. 白术
 - D. 白芍
 - E. 荆芥穗

【答案】A

【解析】完带汤的功用是补脾疏肝，化湿止带。方中重用白术、山药为君，意在补脾祛湿，使脾气健运，湿浊得消；山药并有固肾止带之功。臣以人参补中益气，以助君药补脾之力；苍术燥湿运脾，以增祛湿化浊之力；白芍柔肝理脾，使肝木条达而脾土自强；车前子利湿清热，令湿浊从小便分利。佐以陈皮理气燥湿，既可使补药补而不滞，又可行气以化湿；柴胡、芥穗之辛散，得白术则升发脾胃清阳，配白芍则疏肝解郁；使以甘草调药和中。

涉及考点 | 完带汤的配伍意义

4. 四逆散配伍中体现“一升一降，升清降浊”作用的药物是
- A. 柴胡、芍药
 - B. 甘草、枳实
 - C. 枳实、芍药
 - D. 柴胡、甘草
 - E. 柴胡、枳实

【答案】E

【解析】四逆散中柴胡入肝胆经，升发阳气，疏肝解郁，透邪外出，为君药。佐以枳实理气解郁，泄热破解，与柴胡为伍，一升一降，加强疏畅气机之功，并奏调和肝脾之效。

涉及考点 | 四逆散的配伍意义

5. 清营汤主治证候所见的热象是
- A. 但热不寒
 - B. 往来寒热
 - C. 夜热早凉
 - D. 身热夜甚
 - E. 日晡潮热

【答案】D

【解析】清营汤治热入营分证。邪热传营，伏于阴分，入夜阳气内归于营阴，与热相合，故身热夜甚。

涉及考点 | 清营汤的主治证候

6. 体现叶天士“入血就恐耗血动血，直须凉血散血”的方剂是
- A. 清营汤
 - B. 芍药汤
 - C. 白虎汤
 - D. 黄连解毒汤

E.犀角地黄汤

【答案】E

【解析】犀角地黄汤治热入血分证。热入血分，一则热扰心神；二则热邪迫血妄行，血不循经，溢于脉外则出血，离经之血则为瘀血；三则血分热毒耗伤血中津液，而成瘀。此时不清其热则血不宁，不散其血则瘀不去，不滋其阴则火不息，故叶天士所谓“入血就恐耗血动血，直须凉血散血”，故组方配伍当以清热解毒，凉血散瘀为法。

涉及考点 || 犀角地黄汤的配伍意义

7.仙方活命饮中的君药是

- | | |
|-------|-------|
| A.赤芍 | B.当归 |
| C.陈皮 | D.天花粉 |
| E.金银花 | |

【答案】E

【解析】仙方活命饮主治痈疡肿毒初起。方中金银花善清热解毒疗疮，乃“疮疡圣药”，重用为君。

涉及考点 || 仙方活命饮的配伍意义

8.治疗凉燥的代表方剂是

- | | |
|--------|-------|
| A.银翘散 | B.桂枝汤 |
| C.香薷散 | D.杏苏散 |
| E.小青龙汤 | |

【答案】D

【解析】杏苏散属于清宣外燥剂，有清宣凉燥，理肺化痰的功效。可以治疗外感凉燥证。

涉及考点 || 杏苏散的主治证候

9.下列各项中，既能治疗自汗又能治疗盗汗的是

- | | |
|---------|-------|
| A.四物汤 | B.归脾汤 |
| C.六味地黄丸 | D.肾气丸 |
| E.镇肝息风汤 | |

【答案】B

【解析】归脾汤主治心脾气血两虚证之心悸怔忡，健忘失眠，盗汗食少；脾不统血证之便血，紫癜，崩漏，月经提前，或淋漓不止。其出处《正体类要》所写主治尚有跌仆损伤，自汗，大便不调。

涉及考点 || 归脾汤的主治

10.配伍中体现“阳中求阴”之法的方剂是

- | | |
|---------|---------|
| A.百合固金汤 | B.八珍汤 |
| C.左归丸 | D.清瘟败毒饮 |
| E.右归丸 | |

【答案】C

【解析】左归丸是张介宾由六味地黄丸化裁而成，去“三泻”，加入枸杞、龟板胶、牛膝加强滋补肾阴之力，又加入鹿角胶、菟丝子温润之品。以补阳益阴，阳中求阴，即所谓“善补阴者，必阳中求阴，则阳得阴生而泉源不竭”之义。配伍特点为纯补无泻，阳中求阴。

涉及考点 || 左归丸的全方配伍特点

11.薄荷在逍遙散中的作用是

- A.疏散肺经风热 B.透达肝经郁热
C.辛凉散邪利咽 D.清利头目利咽
E.辛凉解表疏肝

[答案]B

[解析]逍遙散属于调和肝脾剂，具有疏肝解郁，养血健脾的功效。方中加入薄荷少许，疏散郁遏之气，透达肝经郁热。

涉及考点 | 逍遙散的配伍意义

12.以下除哪项外，均是独活寄生汤的功用

- A.补气血 B.降浊气
C.祛风湿 D.益肝肾
E.止痹痛

[答案]B

[解析]独活寄生汤功能祛风湿，止痹痛，益肝肾，补气血。主治痹证日久，肝肾两虚，气血不足证。

涉及考点 | 独活寄生汤的功用

13.下列哪项不是八正散主治证的症状

- A.小便涩痛 B.小腹急满
C.恶心呕吐 D.舌苔黄腻
E.脉数有力

[答案]C

[解析]八正散功能清热泻火，利水通淋。主治湿热淋证。症见尿频尿急，溺时涩痛，淋漓不畅，尿色浑赤，甚或癃闭不通，小腹急满，口燥咽干，舌苔黄腻，脉滑数。

涉及考点 | 八正散主治

14.越鞠丸中以行气为主的药物是

- A.木香 B.沉香
C.香附 D.枳壳
E.厚朴

[答案]C

[解析]越鞠丸的药物组成：香附、川芎、山栀子、苍术、神曲。其中香附行气解郁以治气郁；川芎活血祛瘀以治血郁；栀子清热泻火以治火郁；苍术燥湿运脾以治湿郁；神曲消食导滞以食郁。从越鞠丸的药物组成可排除 A、B、D、E 选项。

涉及考点 | 越鞠丸的配伍意义

15.患者，男，43岁。患乙型肝炎半年余，症见两胁胀满，口苦，食欲不振，有时欲呕，咽喉发干，舌苔薄白，脉弦。宜选何方治疗

- A.四逆散 B.大柴胡汤
C.柴胡疏肝散 D.小柴胡汤
E.逍遙散

[答案]D

[解析]小柴胡汤的主治有七大症，是寒热往来，胸胁苦满，心烦喜呕，不欲饮食，口苦，咽

干，目眩。大柴胡汤应该具备承气汤的阳明证，柴胡疏肝散以气滞为主，而逍遥散应该有血虚之证，都不合适。

涉及考点 | 小柴胡汤的主治

16.患者，男，28岁。高热烦躁，神昏谵语，口干舌燥，痰涎壅盛，舌绛，脉数。治宜选用

- A.安宫牛黄丸
- B.苏合香丸
- C.紫雪
- D.牛黄清心丸
- E.至宝丹

【答案】A

【解析】选项 A 安宫牛黄丸长于清心解毒，常用于邪热内陷心包、痰热壅闭心窍之高热、神昏谵语；选项 B 治疗寒闭；选项 C 清热开窍，息风止痉；选项 D 超纲；选项 E 治疗痰热内闭心包证选项。

涉及考点 | 安宫牛黄丸功效

17.下列各项，不属于苏合香丸主治证候的是

- A.心腹卒痛
- B.高热烦躁
- C.牙关紧闭
- D.苔白
- E.脉迟

【答案】B

【解析】苏合香丸的主要症状表现是，突然昏倒，牙关紧闭，不省人事，苔白脉迟。亦治寒凝气滞，心腹猝痛，及痰厥等。

涉及考点 | 苏合香丸的主治症状

18.血府逐瘀汤的臣药为

- A.桃仁、生地
- B.桔梗、枳壳
- C.桃仁、红花
- D.生地、当归
- E.赤芍、川芎

【答案】E

【解析】血府逐瘀汤主治胸中血瘀证。本方以活血化瘀，行气止痛为法。方中桃仁破血行滞润燥，红花活血祛瘀止痛，共为君药；赤芍、川芎助君药活血祛瘀，牛膝活血通经，祛瘀止痛，引血下行，共为臣药；生地、当归养血益阴，清热活血，桔梗、枳壳，一升一降，宽胸行气，柴胡疏肝解郁，升达清阳，与桔梗、枳壳同用，尤善理气行滞，使气行则血行，以上均为佐药；桔梗并能载药上行，兼有使药之用，甘草调和诸药，亦为使药。

涉及考点 | 血府逐瘀汤的配伍意义

19.咳血方主治证的病机是

- A.肝火犯肺，灼伤肺络
- B.脾阳不足，统血失常
- C.阴虚火旺，损伤肺络
- D.血热妄行，损伤肺络
- E.心脾两虚，气不摄血

【答案】A

【解析】咳血方清火化瘀，敛肺止咳，主治肝火犯肺，灼伤肺络。

涉及考点 | 咳血方的主治证候

20.食积属湿热积滞者，宜选用

- A.保和丸
- B.乌梅丸

- C.香连丸 D.枳实导滞丸
E.健脾丸

[答案]D

[解析]本题所有选项均可用于治疗泻痢。保和丸主治食积。乌梅丸主治蛔厥证。香连丸主治湿热痢疾。枳实导滞丸主治湿热食积。健脾丸主治脾虚停食证。

涉及考点 | 枳实导滞丸的主治证候

(21~22题共用备选答案)

- A.枳实消痞丸 B.金铃子散
C.半夏厚朴汤 D.天台乌药散
E.柴胡疏肝散

21.具有行气散结，降逆化痰功用的方剂是

[答案]C

22.具有行气疏肝，散寒止痛功用的方剂是

[答案]D

[解析]半夏厚朴汤的功用是行气散结、降逆化痰。所以23题选C选项。枳实消痞丸的功用是消痞除满、健脾和胃。金铃子散的功用是疏肝泄热、活血止痛。天台乌药散的功用是行气疏肝、散寒止痛。所以24题选D选项。柴胡疏肝散的功用是疏肝行气、活血止痛。

涉及考点 | 半夏厚朴汤、天台乌药散的功用

(23~24题共用备选答案)

- A.防风 B.细辛
C.白芷 D.川芎
E.羌活

23.川芎茶调散中偏于治阳明经头痛的药物是

[答案]C

24.川芎茶调散中偏于太阳经头痛的药物是

[答案]E

[解析]川芎茶调散主治外感风邪头痛。李东垣谓“头痛须用川芎，如不愈，各加引经药，太阳羌活，阳明白芷”。方中川芎长于治疗少阳、太阳经头痛；羌活长于治疗太阳经头痛；白芷长于治疗阳明经头痛；细辛长于治疗少阴经头痛。

涉及考点 | 川芎茶调散的配伍意义

(25~26题共用备选答案)

- A.桂枝汤 B.归脾汤
C.小建中汤 D.当归补血汤
E.补中益气汤

25.劳倦内伤，气血俱乏，营卫失调，手足烦热，咽干口燥，舌淡苔白，脉细弦者，治宜选用

[答案]C

26.产后血虚，发热头痛，肌热面赤，烦渴欲饮，脉大而虚者，治宜选用

[答案]D

[解析]小建中汤主治虚劳里急证，症见手足烦热。舌淡苔白，脉细弦。其病机特点是气血俱乏。当归补血汤主治血虚发热证，症见肌热面赤，烦渴欲饮，脉大而虚，亦治产后血虚，发

热头痛。

涉及考点 | 小建中汤主治、当归补血汤主治

(27~28题共用备选答案)

A. 胡麻仁、阿胶、麦冬、生地

C. 胡麻仁、阿胶、麦冬

E. 生地、玄参、麦冬、白芍

27. 清燥救肺汤中所用的养阴药是

【答案】C

28. 复脉汤中所用的养阴药是

【答案】A

【解析】清燥救肺汤中养阴药为胡麻仁、阿胶、麦冬。复脉汤重用生地为君，其他养阴药为胡麻仁、阿胶、麦冬。

涉及考点 | 清燥救肺汤、复脉汤组成及含义

金英杰医学教育

【解析】消渴分为上、中、下消。上消肺热津伤证治宜清热润肺，生津止渴，用消渴方。中消胃热炽盛证治宜清胃泻火，养阴增液，用玉女煎；气阴亏虚证治宜益气健脾，生津止渴，用七味白术散。下消肾阴亏虚证治宜滋阴固肾，用六味地黄丸；阴阳两虚证治宜滋阴温阳，补肾固涩，用金匮肾气丸。

涉及考点 消渴的辨证论治

(128~129题共用备选答案)

- | | |
|--------------------|--------------------------|
| A. 痛游走不定，屈伸不利者为 | B. 关节疼痛，局部灼热红肿 |
| C. 肢体关节、肌肉酸楚、重着、疼痛 | D. 关节疼痛较剧，痛有定处，得热痛减，遇寒痛增 |

E. 关节红肿，疼痛剧烈，入夜尤甚，壮热烦渴

128. 行痹的主症是

【答案】A

129. 着痹的主症是

【答案】C

【解析】痹证的辨证，一是要辨邪气的偏盛，二是要辨别虚实。临床痹痛游走不定者为行痹，属风邪盛；痛势较甚，痛有定处，遇寒加重者为痛痹，属寒邪盛；关节酸痛、重着、漫肿者为着痹，属湿邪盛；关节肿胀，肌肤焮红，灼热疼痛为热痹，属热邪盛。关节疼痛日久，肿胀局限，或见皮下结节者为痰；关节肿胀，僵硬，疼痛不移，肌肤紫暗或瘀斑等为瘀。

涉及考点 行痹的辨证论治

2年 易错考题

1. 下列哪项不是时行感冒和普通感冒的鉴别要点

- | | |
|--------------------|--------------|
| A. 普通感冒病情轻 | B. 时行感冒发病急 |
| C. 普通感冒具有流行性 | D. 时行感冒具有传染性 |
| E. 普通感冒在气候变化时发生率升高 | |

【答案】C

【解析】普通感冒病情较轻，全身症状不重，少有传变，在气候变化时发病率可以升高，但无明显流行特点。时行感冒病情较重，发病急，全身症状显著，具有广泛的传染性、流行性。

涉及考点 感冒的病证鉴别

2. 外感咳嗽与内伤咳嗽的鉴别，下列哪项无意义

- | | |
|----------|----------|
| A. 病程的长短 | B. 起病的缓急 |
| C. 疾病的新久 | D. 咳嗽的多少 |
| E. 属实属虚 | |

【答案】D

【解析】外感咳嗽，起病急，病程短，常伴肺卫表证。内伤咳嗽，常反复发作，病程长，多伴其他兼证。

涉及考点 咳嗽的辨证论治

3. 时行感冒与风热感冒的区别，关键在于

- | | |
|-----------|-----------|
| A. 恶寒的轻与重 | B. 发热的轻与重 |
|-----------|-----------|

- C.有无咽喉肿痛
- D.有无流行性
- E.是否脉数

【答案】D

【解析】时行感冒由时行病毒引起,具有广泛的传染性和流行性;感冒风热证由外感风热引起,一般呈散发性。两者最大区别在于有无流行性。

涉及考点 | 感冒的病证鉴别

4.患者,女,65岁。咳喘多年,2天前外感后,症见喘息咳逆,呼吸急促,胸部胀闷,痰多稀薄而带泡沫,色白质黏,头痛,恶寒,口不渴,无汗,舌苔薄白而滑,脉浮紧。治疗应选用的方剂是

- A.苏子降气汤
- B.桑白皮汤
- C.麻黄汤合华盖散
- D.麻杏石甘汤
- E.定喘汤

【答案】C

【解析】根据患者症状,诊断为喘证之风寒壅肺证。方剂选择麻黄汤合华盖散治疗。

涉及考点 | 喘证的辨证论治

5.哮病发作的病因病机关键是

- A.宿痰内伏于肺
- B.邪客于肺,气道不利
- C.痰气相激,气道被阻
- D.外邪侵袭,触动伏痰
- E.脏腑虚弱,气失所主

【答案】D

【解析】哮病的病理因素以痰为主。发作时的基本病机为“伏痰”遇感引触,痰随气升,气因痰阻,相互搏结,壅塞气道,气道挛急,通畅不利,肺气宣降失常,引动停积之痰,而致痰鸣如吼,气息喘促。

涉及考点 | 哮病的病因病机

6.患者,男,65岁。膏淋病久不已,反复发作,淋出如脂,涩痛不甚,形体日见消瘦,头昏无力,腰膝酸软,舌淡,苔腻,脉细无力。治疗应首选的方剂是

- A.沉香散
- B.膏淋汤
- C.补中益气汤
- D.七味都气丸
- E.程氏萆薢分清饮

【答案】B

【解析】患者膏淋病久不已,反复发作,淋出如脂,诊断为膏淋虚证;膏淋日久反复不愈,脾肾两虚,气不固摄,故见淋出如脂,涩痛不甚,形体日见消瘦,头昏无力,腰膝酸软,舌淡等虚证。治宜益肾固涩,方选膏淋汤。

涉及考点 | 淋证的辨证论治

7.治疗黄疸(阳黄)热重于湿证,首选的方剂是

- A.茵陈术附汤
- B.大柴胡汤
- C.茵陈五苓散
- D.茵陈蒿汤
- E.龙胆泻肝汤

【答案】D

【解析】茵陈蒿汤具有清热,利湿,退黄之功效。主治湿热黄疸。一身面目俱黄,黄色鲜

明,发热,无汗或但头汗出,口渴欲饮,恶心呕吐,腹微满,小便短赤,大便不爽或秘结,舌红苔黄腻,脉沉数或滑数有力。

涉及考点 || 黄疸的辨证论治

- 8.下列哪一项不属于水肿与鼓胀的鉴别要点
- A.肿胀部位
 - B.小便通利与否
 - C.肿处皮肤的色泽
 - D.肿胀的先后顺序
 - E.腹壁青筋有无暴露

【答案】B

【解析】鼓胀与水肿的鉴别:鼓胀主要为肝、脾、肾受损,气血水互结于腹中。以腹部膨大为主,四肢肿不甚明显。晚期方伴肢体浮肿,每兼见面色青晦,面颈部有血痣赤缕,胁下癰积坚硬,腹皮青筋显露等。水肿主要为肺、脾、肾功能失调,水湿泛溢肌肤。其浮肿多从眼睑开始,继则延及头面及肢体,或下肢先肿,后及全身,每见面色㿠白、腰酸倦怠等,水肿较甚者亦可伴见腹水。

涉及考点 || 水肿的鉴别诊断

- 9.治疗痿证之肝肾亏损证,应首选的方剂是
- A.圣愈汤
 - B.虎潜丸
 - C.鹿角胶丸
 - D.补血荣筋丸
 - E.独活寄生汤

【答案】B

【解析】痿证日久,多累及肝肾,阴虚生内热,故肝肾亏损宜滋补肝肾,滋阴清热,用虎潜丸最合适。圣愈汤偏于补气血;鹿角胶丸用于久病阴损及阳;补血荣筋丸治肝衰筋缓;独活寄生汤治风湿痹证。

涉及考点 || 瘦证的辨证论治

- 10.按痰饮停积的部位分类,饮留胃肠的是
- A.痰饮
 - B.支饮
 - C.溢饮
 - D.悬饮
 - E.伏饮

【答案】A

【解析】水饮属于阴类,非阳不运,若阳气虚衰,气不化津,则阴邪偏盛,寒饮内停。饮留肠胃,则为痰饮。饮留胁下,则为悬饮。饮留肢体,则为溢饮、聚于胸肺,则为支饮。

涉及考点 || 痰饮的辨证论治

- 11.下列哪项不属于胁痛的病理因素
- A.肝气郁结
 - B.肝阴不足
 - C.瘀血凝滞
 - D.肝胆湿热
 - E.胃气上逆

【答案】E

【解析】病理性质有虚有实,而以实为多。实证中以气滞、血瘀、湿热为主,三者又以气滞为先。虚证多属阴血亏损,肝失所养。一般说来,胁痛初病在气,日久气滞转为血瘀,或气滞血瘀并见。实证日久,化燥伤阴,故临床可见虚实夹杂之证。

涉及考点 || 胁痛的病理病机

12.患者，女，65岁。身体素弱，饮食稍有不慎即呕吐未消化食物，面色㿠白，倦怠乏力，四肢不温，便溏，舌淡苔白，脉濡弱。治疗应首选的方剂是

- A.吴茱萸汤 B.理中汤
C.黄芪建中汤 D.苓桂术甘汤
E.四君子汤

【答案】B

【解析】辨证为呕吐之脾胃阳虚证，治法为温中健脾，和胃降逆。代表方剂选用理中汤加减。

涉及考点 | 胁痛的病理病机

13.患者，男，71岁。平时头痛耳鸣，腰酸，突然发生口眼歪斜，语言不利，口角流涎，手足抽搐，半身不遂，舌质红，苔腻，脉弦细数。其证候是

- A.风痰入络证 B.风阳上扰证
C.阴虚风动证 D.痰浊瘀闭证
E.痰火瘀闭证

【答案】C

【解析】平时头痛耳鸣，腰酸，突然发生口眼歪斜，舌质红，苔腻，脉弦细数，肝肾阴虚，风阳内动，风痰瘀阻经络，诊断为中风中经络之阴虚风动证。

涉及考点 | 中风的辩证论治

14.治疗中风后遗症半身不遂，气虚血瘀证。应选用的方剂是

- A.天麻钩藤饮 B.半夏白术天麻汤
C.镇肝息风汤 D.补阳还五汤
E.局方至宝丹

【答案】D

【解析】中风恢复期的分证论治，气虚络瘀证治法应益气养血，化瘀通络，方剂选用补阳还五汤加减。

涉及考点 | 中风的辩证论治

15.患者，男，31岁。发热，咳嗽，胸痛，咳吐腥臭浊痰，甚则脓血相兼，其诊断为

- A.风热咳嗽 B.痰热咳嗽
C.肝火犯肺咳嗽 D.虚热肺痿
E.肺痈

【答案】E

【解析】患者发热，咳嗽，胸痛，咳吐腥臭浊痰，甚则脓血相兼，诊断为肺痈。

涉及考点 | 肺痈的诊断

16.下列不属于郁证常见病因的是

- A.痰气郁结证 B.心神失养证
C.津液亏虚证 D.肝气郁结证
E.气郁化火证

【答案】C

【解析】郁证的病因总属情志所伤，发病与肝的关系最为密切，其次涉及心、脾。肝失疏泄、脾失健运、心失所养、脏腑阴阳气血失调是郁证的主要病机，故临床可见肝气郁结证，气郁

化火证,痰气郁结证,心神失养证,心脾两虚证,心肾阴虚证。

涉及考点 郁证的辨证

17.治疗咳嗽,应以治肺为主,还应注意治疗

- | | |
|---------|---------|
| A.肝、胃、肾 | B.心、肝、肾 |
| C.心、脾、肾 | D.心、肝、脾 |
| E.肝、脾、肾 | |

【答案】A

【解析】咳嗽的病位在肺,与肝、脾有关,久则及肾。咳嗽除了肺脏本身的病变外,还可因脾虚生痰,痰浊壅肺,肺气上逆发为咳嗽;肝火犯肺,肃降无权,肺气上逆,发为咳嗽;肾虚,肾不纳气,上逆而咳。与心、胃关系不密切。

涉及考点 咳嗽的辨证论治

18.哮病夙根的形成原因是

- | | |
|---------------|-------------|
| A.禀赋不足,病后体弱 | B.肝气郁结,气机不畅 |
| C.过食生冷,寒饮内停 | D.外感风寒或风热之邪 |
| E.津液运化失常,凝聚成痰 | |

【答案】E

【解析】哮病的病理因素以痰为主。痰的产生主要由于人体津液代谢失常,凝聚而成,痰伏藏于肺,成为发病的“夙根”。

涉及考点 哮病的病机

19.肺痨的辨证,应首辨的要点是

- | | |
|--------|------|
| A.脏腑 | B.表里 |
| C.寒热 | D.虚实 |
| E.外感内伤 | |

【答案】A

【解析】对于肺痨的辨证,当首先辨病变脏器及病理性质。其病变脏器主要在肺,以肺阴虚为主。久则损及脾肾两脏,肺损及脾,以气阴两伤为主;肺肾两伤,元阴受损,则表现阴虚火旺之象;甚则由气虚而致阳虚,表现阴阳两虚之候。

涉及考点 肺痨的辨证要点

20.患者,女性,61岁。反复发作的气急痰鸣二十余年。现短气息促,动则为甚,吸气不利,咳痰质黏起沫,脑转耳鸣,腰酸腿软,心慌,不耐劳累。五心烦热,颧红,口干,舌质红少苔,脉象细数。其诊断是

- | | |
|---------------|---------------|
| A.喘证之肺气虚耗证 | B.哮病发作期之风痰哮证 |
| C.哮病缓解期之肺肾两虚证 | D.哮病缓解期之肺脾气虚证 |
| E.喘证之肾虚不纳证 | |

【答案】C

【解析】患者反复发作气急痰鸣二十余年,诊断为哮病。哮病久发,精气亏乏,肺肾摄纳失常,气不归原,津凝为痰,可见短气息促;动则为甚,吸气不利,咳痰质黏起沫;肾阴亏虚可见五心烦热,颧红,口干,舌质红少苔,脉细数;肾阳亏虚可见畏寒肢冷,面色苍白,舌苔淡白,质胖,脉沉细。辨证为肺肾两虚证,治当补肺益肾,方选生脉地黄汤合金水六君煎加减。

涉及考点 哮病的诊断

21.用于治疗中风中脏腑之阳闭证的方剂是

- A.天麻钩藤饮 B.半夏白术天麻汤合桃仁红花煎
C.星萎承气汤 D.涤痰汤合用苏合香丸
E.羚羊角汤合安宫牛黄丸

【答案】E

【解析】中风中脏腑之阳闭证代表方：羚羊角汤合用安宫牛黄丸。阴闭证代表方：涤痰汤合用苏合香丸。

涉及考点 | 中风的辨证论治

22.患者，男，43岁。突发黄疸，黄疸迅速加深，其色如金，皮肤瘙痒，高热口渴，胁痛腹满，神昏谵语，烦躁抽搐，或见衄血、便血，肌肤瘀斑，舌质红绛，苔黄而燥，脉弦滑或数。其治法是

- A.清热通腑，利湿退黄 B.利湿化浊运脾，佐以清热
C.清热解毒，凉血开窍 D.疏肝泄热，利胆退黄
E.利湿清热，以除余邪

【答案】C

【解析】根据患者临床表现，诊断为黄疸。湿热疫毒炽盛，故见黄疸色如金黄，皮肤瘙痒，高热口渴；热入营血，内陷心肝，故见胁痛胀满，神昏谵语，烦躁抽搐，或见衄血、便血，肌肤瘀斑；舌质红绛，舌黄而燥，脉弦滑为湿热疫毒炽盛的表现，辨证为疫毒炽盛证，治宜清热解毒，凉血开窍。

涉及考点 | 黄疸的辨证论治

23.不寐实证，其病位多在

- A.肝、胆、脾 B.心、肝、小肠
C.心、肺、大肠 D.心、脾、肝
E.心、肝、胃

【答案】E

【解析】不寐辨证首分虚实。虚证多属阴血不足，心失所养。实证为邪热扰心次辨病位，病位主要在心，且与肝、胆、脾、胃、肾相关。如急躁易怒而不寐，多为肝火内扰；脘闷苔腻而不寐，多为胃腑宿食，痰热内盛；心烦心悸，头昏健忘而不寐，多为阴虚火旺，心肾不交；面色少华，肢倦神疲而不寐，多属脾虚不运，心神失养；心烦不寐，触事易惊，多属心胆气虚等。

涉及考点 | 不寐的病位

24.下列各项，不属于肺痈逆证表现的是

- A.饮食少进 B.气喘鼻扇
C.脉象缓滑 D.音嘎无力
E.爪甲青紫带弯

【答案】C

【解析】肺痈溃脓期是病情顺与逆的转折点，逆症表现为：溃后音嘎无力，脓血如败肉，腥臭异常，气喘，鼻扇，胸痛，坐卧不安，饮食少进，身热不退，颧红，爪甲青紫带弯，脉短促或弦急，为肺叶腐败之恶候。

涉及考点 | 肺痈的转归预后

25.阳明头痛的“引经药”应首选

- A.葛根、白芷、知母 B.羌活、川芎、蔓荆子

- C.柴胡、黄芩、川芎
E.细辛、白芷、羌活

- D.藁本、吴茱萸、钩藤

【答案】A

【解析】头痛归经不同治疗选用不同的引经药，对发挥药效有重要的意义。选项B用于太阳头痛；选项A用于阳明头痛；选项C少阳头痛；选项D用于厥阴头痛。

涉及考点 | 根据头痛的不同部位选用不同的“引经药”

26.眩晕的证候分类中不包括的是

- | | |
|---------|---------|
| A.肝阳上亢证 | B.肝火上炎证 |
| C.气血两虚证 | D.瘀血阻窍证 |
| E.肾精不足证 | |

【答案】B

【解析】眩晕病在清窍，与肝、脾、肾三脏功能失调密切相关。眩晕的证候可分为肝阳上亢证、气血亏虚证、肾精不足证、痰湿中阻证、瘀血阻窍证。肝火上炎证不是其分类。

涉及考点 | 眩晕的辨证论治

27.痫病的辨证，应首先辨别的要点是

- | | |
|--------|--------|
| A.证候虚实 | B.脏腑经络 |
| C.病情轻重 | D.外感内伤 |
| E.寒热虚实 | |

【答案】C

【解析】判断本病之轻重要注意两个方面，一是病发持续时间之长短，一般持续时间长则病重，短则病轻；二是发作间隔时间之久暂，即间隔时间短暂则病重，间隔时间长久则病轻。其临床表现的轻重与痰浊之浅深和正气之盛衰密切相关。

涉及考点 | 痫病的辨证论治

28.噎膈与梅核气最主要的鉴别要点是

- | | |
|----------------|----------------|
| A.有无进行性消瘦 | B.有无吞咽困难 |
| C.有无自觉咽中梗塞不舒 | D.有无情志不畅、酒食不节史 |
| E.有无胸骨后不适，呈烧灼感 | |

【答案】B

【解析】二者均见咽中梗塞不舒的症状。噎膈是有形之物瘀阻于食道，吞咽困难。梅核气则为气逆痰阻于咽喉，为无形之气，无吞咽困难及饮食不下的症状。痰气窒塞于咽喉之间，咳之不出，咽之不下，状如梅核，即咽中有梗塞不舒的感觉，无食物哽噎不顺，或吞咽困难，食入即吐的症状。

涉及考点 | 噎膈的病证鉴别

29.便秘之热秘，服药后大便不爽者、治疗宜选用的方剂是

- | | |
|--------|-------|
| A.麻子仁丸 | B.六磨汤 |
| C.青麟丸 | D.更衣丸 |
| E.大承气汤 | |

【答案】C

【解析】便秘属热秘者，当泻热导滞，润肠通便，方选麻子仁丸。若兼郁怒伤肝，易怒目赤者，加服更衣丸以清肝通便，若燥热不甚，或药后大便不爽者，可用青麟丸以通腑缓下，若热势

较盛，胃痞燥实坚者，可用大承气汤急下存阴。六磨汤则适用于便秘属气秘者。

涉及考点 || 便秘的辨证论治

30. 肺胀的病位在肺，继影响到

- A. 心、脾，后期病及于肾
- B. 脾、肾，后期病及于心
- C. 肝、肾，后期病及于心
- D. 肝、脾，后期病及于心
- E. 心、肝，后期病及于肾

【答案】B

【解析】病变首先在肺，继则影响脾、肾，后期病及于心、肝。因肺主气，开窍于鼻，外合皮毛，主表卫外，故外邪从口鼻、皮毛入侵，每多首先犯肺。若肺病及脾，子盗母气，脾失健运，则可导致肺脾两虚。肺为气之主，肾为气之根，肺伤及肾。肺与心脉相通，肺气辅佐心脏运行血脉，肺虚治节失职，则血行涩滞，循环不利，血瘀肺脉，肺气更加壅塞，造成气虚血滞，血滞气郁，由肺及心的恶性后果。心阳根于命门真火，肾阳不振，进一步导致心肾阳衰，可呈现喘脱危候。

涉及考点 || 肺胀的病机

31. 自觉咽中如物梗塞，吐之不出，吞之不下，但不妨碍进食的病证是

- A. 反胃
- B. 梅核气
- C. 嗳气
- D. 呃逆
- E. 噎膈

【答案】B

【解析】反胃见食后脘腹胀满，朝食暮吐，暮食朝吐。噎膈见吞咽时哽咽不顺，饮食不下，或食入即吐。呃逆症见气逆上冲，喉间呃呃连声，声短而频，不能自止，呃声或高或低，或疏或密，间歇时间不定。梅核气症见自觉咽中如物梗塞，吐之不出，吞之不下，但不妨碍进食。

涉及考点 || 噎膈/梅核气的鉴别诊断

32. 瘰闭的基本病机是

- A. 膀胱气化失调
- B. 膀胱气化不利
- C. 膀胱气化无权
- D. 肾失封藏
- E. 肾脏分清泌浊失常

【答案】A

【解析】①《素问》膀胱不利为癃，阐明了膀胱气化失调是癃闭的基本病机。②肾阳不足气化不及州都，则膀胱气化无权，亦可发生癃闭，与肾失封藏，肾脏分清泌浊失常无关。

涉及考点 || 瘰闭的病因病机

33. 下列各项，不属于淋证病因的是

- A. 外感湿热
- B. 饮食不节
- C. 情志内伤
- D. 禀赋不足
- E. 瘀浊内停

【答案】E

【解析】①饮食不节：多食辛热肥甘之品，或嗜酒太过，脾胃运化失常，积湿生热，下注膀胱，乃成淋证。②外感湿热：因下阴不洁，秽浊之邪从下侵入人体，上犯膀胱，发为淋证。③情志失调：肝郁化火，气火郁于膀胱，导致淋证。④禀赋不足：肾和膀胱先天畸形。

涉及考点 || 淋证的病因

34.水肿风水相搏证，其病位在

- A.心
- B.肺
- C.肝
- D.脾
- E.肾

【答案】B

【解析】肺主一身之气，有主治节，通调水道，下输膀胱的作用。风邪犯肺，肺气失于宣降，不能通调水道，风水相搏，发为水肿。水化于气，故其标在肺。

涉及考点 | 水肿的病位

金英杰医学教育

涉及考点 | 脱疽的辨证论治

(73~74题共用备选答案)

- A.痈 B.瘰疬
 C.流痰 D.有头疽
 E.红丝疔

73.易发生内陷的疾病是

【答案】D

74.可发生走黄的疾病是

【答案】E

【解析】选项 A 不仅局部病变比疖重,且易并发全身性化脓性感染。选项 B 预后一般良好,少数体虚的人可继发流痰,治愈后每因体虚或过度劳累而复发。选项 C 起病缓慢,漫肿酸痛,不红不热,化脓亦迟,溃出脓水清稀,并夹有豆腐花样物质,形成窦道后,迁延不愈,易损筋坏骨,轻则致残,重则成为虚痨,危及生命。选项 D 若治疗失控或处治失时或误治,往往造成内陷之并发。选项 E 好发于前臂及小腿的内侧,病变在深部,皮色暗红,或不见红丝,但可见条索状肿胀和压痛,如不消退则化脓,严重者可引起“走黄”。

涉及考点 | 有头疽、红丝疔的特点

(75~76题共用备选答案)

- A.程氏萆薢分清饮 B.三金排石汤
 C.金铃子散合石韦散 D.十全大补汤
 E.八正散或龙胆泻肝汤

75.治疗尿石症之气血瘀滞证,应首选的方剂是

【答案】C

76.治疗尿石症之湿热蕴结证,应首选的方剂是

【答案】B

【解析】尿石症的气血瘀滞证,应治以理气活血,通淋排石,选用金铃子散合石韦散加减。湿热蕴结证,应治以清热利湿,通淋排石,选用三金排石汤加减。

涉及考点 | 尿石症的治疗方法

2年 易错考题

1.下列各项,不属于外科疾病成脓期特点的是

- A.疼痛剧烈呈鸡啄样 B.皮肤肿胀,皮薄光亮
 C.局部皮肤瘙痒 D.局部皮肤温度增高
 E.肿块变软

【答案】C

【解析】成脓的特点应从以下四点辨别。疼痛:阳证脓疡,局部按之灼热痛甚,拒按明显。阴证脓疡,则痛热不甚,而酸胀明显。肿胀:皮肤肿胀,皮薄光亮为有脓。深部脓肿,皮肤变化不明显,但胀感较甚。温度:用手仔细触摸患部,与周围正常皮肤相比,若为阳证脓疡,则局部温度增高。硬度:《外科理例》云:“按之牢硬未有脓,按之半软半硬已成脓,大软方是脓成。”《疡医大全》又谓:“凡肿疡按之软隐者,随手而起者,为有脓;按之坚硬,虽按之有凹,不既随手

起者，为脓尚未成。”肿块已软，为脓已成。

涉及考点 辨脓

2.患者，女，50岁。面部出现小结节，红肿热痛、逐渐肿大并隆起，出现脓栓，其诊断是

- A.疖
- B.痈
- C.疽
- D.丹毒
- E.痰核

【答案】A

【解析】疖见皮肤上红色结块，约3cm，灼热疼痛，突起根浅，中心有一脓头，出脓即愈。疖病好发于项后发际、背部、臀部，也可在身体各处散发疖肿，一处将愈，他处续发，或间隔周余、月余再发。患消渴病、习惯性便秘或营养不良者易患本病。选项B、C、D多伴发热等全身症状，选项E多为阴证表现。

涉及考点 疖的临床表现

3.阴证疮疡的首选外敷药物是

- A.冲和膏
- B.阳和解凝膏
- C.疯油膏
- D.玉露膏
- E.太乙膏

【答案】B

【解析】选项A冲和膏适用于半阴半阳证。选项B阳和解凝膏温经散寒，化瘀通络，用于疮形不红不热，漫肿无头之阴证疮疡未溃者。选项C润燥杀虫止痒，适用于牛皮癣、慢性湿疮、皲裂等。选项D玉露膏清热解毒、消肿止痛、散瘀化瘀，适用于疮疡阳证。选项E太乙膏消肿解毒，用于红肿热痛明显之阳证疮疡，为肿疡、溃疡通用方。所以本选B。

涉及考点 膏药、油膏的临床应用

4.疮疡破溃后，不宜使用的外用药是

- A.膏药
- B.箍围药
- C.油膏
- D.酊剂
- E.腐蚀药

【答案】D

【解析】选项A适用于一切外科疾病的初起、成脓、溃后各个阶段。选项B适用于外疡不论初起，成脓及溃后，肿势散漫不聚而无集中之硬块者。选项C适用于肿疡、溃疡，皮肤病糜烂结痴渗液不多者及肛门病等。选项D一般用于疮疡未溃及皮肤病等。选项E均可用于凡肿疡在脓未溃时，或痔疮、瘰疬、赘疣、息肉等病；或溃疡破溃以后，疮口太小，引流不畅；或疮口僵硬，或胬肉突出，或腐肉不脱等妨碍收口时。

涉及考点 捻药的种类及临床应用

5.治疗体表脓肿，实施切开引流的有利时机是

- A.肿疡初起
- B.肿疡溃后
- C.脓肿肿疡出现透脓点
- D.肿疡肉芽暗红
- E.脓肿周围肿硬

【答案】C

【解析】当肿疡成脓之后，脓肿中央出现透脓点（脓腔中央最软的一点），即为脓已成熟，此时予以切开最为适宜。切口位置应以便于引流为原则，选择脓腔最低点或最薄弱处进刀。

涉及考点 | 切开法的具体应用

6.下列属于无头疖的特点是

- A.皮肤上有一红色结块,范围约3 cm左右,无脓头
- B.红色结块,范围约3 cm大小,灼热疼痛,突起根浅,中心有一脓头
- C.多发于儿童头部
- D.不易成脓易溃、易敛
- E.不易溃烂、不易收敛

【答案】A

【解析】无头疖:无脓头。

涉及考点 | 无头疖的特点

7.蛇头疔溃脓期的治疗应

- A.甲旁0.2 cm挑开引流
- B.在指掌面一侧作纵行切口,必要时可对口引流
- C.在指掌面正中切开,务必引流通畅
- D.在手指侧面作纵行切口,切口长度不得超过上下指关节面
- E.沿掌横纹切开,切口应够大,保持引流通畅

【答案】B

【解析】成脓期脓成应切开排脓,一般应尽可能循经切开,根据患病部位不同,而选择不同的切口。选项A适用于蛇眼疔。选项B适用于蛇头疔。选项C适用于蛇肚疔。选项E适用于托盘疔。

涉及考点 | 手足部疔疮成脓期切开引流要求

8.下列各项,不属于发的临床特点的是

- | | |
|---------------|----------|
| A.初起仅有单个脓头 | B.红肿蔓延成片 |
| C.灼热疼痛 | D.全身症状明显 |
| E.红肿中央明显,四周较淡 | |

【答案】A

【解析】发的特点是初起无头,红肿蔓延成片,灼热疼痛,红肿以中心最为明显,而四周较淡,边界不清,有的3~5天后中央色褐腐溃,周围湿烂,伴有明显的全身症状。

涉及考点 | 发的含义与特点

9.精浊的病机

- | | |
|------------|------------|
| A.肾虚、湿热、瘀滞 | B.湿热、瘀滞、血热 |
| C.肾虚、瘀滞、痰浊 | D.肾虚、血热、瘀滞 |
| E.肝郁、湿热、肾虚 | |

【答案】A

【解析】急性精浊,多由饮食不节,恣食醇酒肥甘,酿生湿热,注于下焦;或因外感湿热之邪壅聚于下焦而成。慢性精浊多因性交欲念不遂,心肾不交,或房劳过度,湿热壅滞,气血瘀滞而成。

涉及考点 | 精浊的病机

10.患儿,女,7岁。结喉处红肿绕喉,根盘散漫,肿势延及颈部两侧,按之中软,有应指感,治疗应首选的方剂是

- A. 内服普济消毒饮
- B. 外治以菊花汁调制玉露散箍围束毒
- C. 半流质饮食
- D. 切开排脓
- E. 药线引流

【答案】D

【解析】据患者临床症状,可诊为癰痈,肿处按之中软,可知脓已形成,治疗以切开排脓为主。

涉及考点 | 癰痈的外治法

11.患者,男,40岁。结喉两侧各有1个3 cm×2 cm×1 cm,表面光滑,质地韧,无压痛,随吞咽上下活动的肿物。为明确诊断,应首选的方法是

- A. 胸颈部X线
- B. 血常规
- C. 血气分析
- D. T₃、T₄
- E. ¹³¹I扫描

【答案】E

【解析】位于喉结两侧,随吞咽上下活动的肿物,诊断考虑石瘿可能性大。为明确诊断,可用同位素¹³¹I扫描,或者穿刺加活检。

涉及考点 | 石瘿的特点

12.患者,男,40岁。左肩部可见一肿块,呈扁平团块状,边界清楚,暗红色,触之柔软,推之可动,无明显疼痛。应首先考虑的是

- A. 血瘤
- B. 血肿
- C. 肾岩
- D. 肉瘤
- E. 肉瘤

【答案】A

【解析】血瘤是指人体的体表血络扩张,纵横丛集而形成的肿瘤,可发生于身体任何部位,大多数为先天性,其特点是病变局部色泽鲜红或暗紫,或呈局限性柔软肿块,边界不清,触之如海绵状,相当于西医疾病的血管瘤。

涉及考点 | 血瘤

13.下列各项,不属于精癃常见的临床症状是

- A. 夜尿次数增多、排尿困难
- B. 慢性尿潴留
- C. 无痛性血尿
- D. 尿频、尿急、尿痛
- E. 假性尿失禁

【答案】D

【解析】精癃是指精室肥大以排尿困难和尿潴留为主要表现的泌尿男性生殖器疾病。相当于西医的前列腺增生症或前列腺肥大。当病人持续处于尿潴留状态,由于膀胱过胀,膀胱内尿液超过尿道括约肌阻力时,尿液常可从尿道外口溢出,出现充溢性尿失禁现象。并发泌尿系感染,可出现尿频,尿急,尿痛,发热,腰痛等症。

涉及考点 | 精癃的临床特点

14.患者胸腹部皮肤红肿蔓延,摸之灼手,肿胀疼痛,伴口苦且干,舌红,苔黄腻,脉弦滑数。治疗首选的方剂是

- A. 仙方活命饮
- B. 普济消毒饮
- C. 银翘解毒丸
- D. 化斑解毒汤

E. 黄连解毒汤

【答案】D

【解析】患者皮肤红肿蔓延，其病为丹毒，因其发于胸腹部，故为内发丹毒；摸之灼手，肿胀疼痛，为火热之象，其口苦且干，舌红，苔黄腻，脉弦滑数，为肝脾湿火证。治法为清肝泻火利湿。方用柴胡清肝汤、龙胆泻肝汤或化斑解毒汤加减。

涉及考点 || 丹毒的内治法

15. 患者，男，30岁。两大腿内侧可见3枚钱币形红斑，边界清楚，中心消退，外围扩张，无明显疼痛，痛痒感明显，多在夏季加重。应首先考虑的是

- A. 圆癣
- C. 白秃疮
- E. 肥疮

- B. 紫白癩风
- D. 鹅掌风

【答案】A

【解析】圆癣初起为丘疹或水疱，逐渐形成边界清楚的钱币形红斑，其上覆盖细薄鳞屑。病灶中央皮疹消退，呈自愈倾向，但向四周蔓延，有丘疹、水疱、脓疱、结痂等损害。

涉及考点 || 圆癣的诊断

16. 患者因牙痛服用去痛片。7天后四肢出现豌豆至蚕豆大圆形或椭圆形水肿性红斑，有些部位中央有水疱。其药毒的类型是

- A. 多形红斑样型
- C. 固定红斑型
- E. 大疱性表皮松解型药毒

- B. 湿疹皮炎样型
- D. 紫癜型药毒

【答案】A

【解析】选项 A 皮损为豌豆至蚕豆大圆形或椭圆形水肿性红斑、丘疹，红斑中心呈紫红色或有水疱。选项 B 皮损为湿疹样皮炎。选项 C 皮损为圆形或椭圆形水肿性紫红斑，边界清楚，重者红斑中央形成水疱或大疱。选项 D 出现针头至豆大的或更大的紫红色瘀点或瘀斑，散在或密集分布。选项 E 是最严重的一型，为紫红或暗红色略带铁灰色斑，扩大、增多、融合，红斑上出现松弛性水疱及表皮松解，水疱易破，该处表皮极松，一推即成糜烂面。

涉及考点 || 药毒的诊断

17. 患者，男，31岁。颈项部皮肤增厚，干燥，瘙痒较剧，情绪波动时，瘙痒随之加剧，部分皮肤因反复搔抓形成苔藓样变化。其诊断是

- A. 接触性皮炎
- C. 白疕
- E. 紫白癩风

- B. 牛皮癣
- D. 慢性湿疮

【答案】B

【解析】牛皮癣特点：皮损多呈圆形或多角形的扁平丘疹融合成片，剧烈瘙痒，搔抓后皮损肥厚，皮沟加深，皮嵴隆起，极易形成苔藓样变。

涉及考点 || 牛皮癣特点

18. 属皮肤病原发性皮损的是

- A. 鳞屑
- C. 疼痛
- E. 斑疹

- B. 瘙痒
- D. 灼热

【答案】E

【解析】原发性皮损指皮肤病在其病变过程中直接发生及初次出现的皮损。常见的原发性皮损有斑、丘疹、风团、结节、疱疹等5种。

涉及考点 || 麻疹样型皮损特性

19.患者，男，38岁。患急性子痈2天，恶寒发热，左侧睾丸肿大疼痛，舌红苔黄腻，脉滑数。证属湿热下注，气血壅滞，经络阻隔为患。治宜清热解毒，利湿消肿。应首选的方剂是

- A.透脓散 B.滋阴除湿汤
C.萆薢化毒汤 D.龙胆泻肝汤
E.枸橘汤加减

【答案】E

【解析】湿热下注，气血壅阻，经络不畅，故见睾丸或附睾肿大疼痛。苔黄腻、脉滑为湿热之象。故辨证属子痈之湿热下注证，治法为清热利湿，解毒消肿。方药为选枸橘汤加减。选项A主治痈疽诸毒，内脓已成，不穿破者。选项B合透脓散主治子痈之阴虚内热证。选项C主治湿热痈疮，气血实者。选项D主治肝胆实火上炎证。

涉及考点 || 子痈的治疗

20.男，43岁。尿道中有白色分泌物滴出3年，劳累后更为明显，伴腰膝酸冷，放射至会阴部，形寒肢冷，精神不振，头晕。首选的方剂是

- A.龙胆泻肝丸 B.知柏地黄丸
C.左归丸 D.济生肾气丸
E.独活寄生汤

【答案】D

【解析】慢性前列腺炎：肾阳虚损证治法为补肾助阳，方药用济生肾气丸加减。

涉及考点 || 慢性前列腺炎的治法方药

21.下列疔疮，容易损筋伤骨的是

- A.烂疔 B.红丝疔
C.颜面疔 D.疫疔
E.手足疔

【答案】E

【解析】发于颜面部的疔疮很容易走黄而有生命危险；发于手足部的疔疮则易损筋伤骨。

涉及考点 || 走黄

(22~23题共用备选答案)

- A.失笑散 B.沉香散
C.前列腺汤 D.归脾汤
E.血府逐瘀汤

22.治疗精浊之气滞血瘀证，应首选的方剂是

【答案】C

23.治疗精癃之气滞血瘀证，应首选的方剂是

【答案】B

【解析】精浊相当于西医学的前列腺炎，气滞血瘀证的治法为活血化瘀，行气止痛，方用前列腺汤加减。精癃相当于西医学的前列腺增生症，气滞血瘀证的治法为行气活血，通窍利尿，

方用沉香散加减。

涉及考点 | 精浊、精癃的辨证论治

(24~25题共用备选答案)

- A.红丝疔
- B.蛇头疔
- C.蛇眼疔
- D.蛀节疔
- E.蛇肚疔

24.生于手指骨节间的疔疮称为

【答案】D

25.生于指腹部的疔疮称为

【答案】E

【解析】选项A生于四肢。选项B生于指头顶端。选项C生于指甲缘。选项D生于手指骨节间。选项E生于指腹部。

涉及考点 | 疔的种类

(26~27题共用备选答案)

- A.五味消毒饮
- B.仙方活命饮
- C.黄连解毒汤
- D.犀角地黄汤
- E.清骨散

26.疮疡内治,清气分热之常用方剂是

【答案】C

27.疮疡内治,清血分热之常用方剂是

【答案】D

【解析】疮疡内治,清气分热之常用方剂是黄连解毒汤。疮疡内治,清血分热之常用方剂是犀角地黄汤。

涉及考点 | 疔疡内治常用方剂

【答案】C

【解析】气滞情志久郁，经行不畅，气机受阻，升降失司，水道通调不利，水湿不运，水泛为肿，按之随手而起。气滞则血瘀，经色暗红有块，舌紫暗，脉弦涩。脘闷胁胀，善叹息，均属于气滞之象。故辨证属经行浮肿之气滞血瘀证。治法为理气行滞，养血调经。方剂为八物汤。选项 D 肾气丸合选项 A 苓桂术甘汤主治经行浮肿之脾肾阳虚证。选项 B 参苓白术散主治中气下陷证。选项 E 丹栀逍遥散主治肝脾不和证。

涉及考点 | 经行浮肿的辨证论治

81.患者，女，29岁。已婚2年一直未孕，既往月经周期26~28天，行经期4~6天。现停45天，突然左下腹撕裂样剧痛，并伴头晕恶心，面色苍白。不应采取的措施是

- | | |
|---------|--------|
| A.妊娠试验 | B.腹部叩诊 |
| C.后穹隆穿刺 | D.立即转院 |
| E.妇科检查 | |

【答案】D

【解析】患者出现停经，突然出现左下腹撕裂样剧痛，应首先考虑异位妊娠。如果妊娠试验阳性，行腹部叩诊，看是否有移动性浊音以确定是否有内出血，也可以做妇科检查、后穹隆穿刺以确定是否发生异位妊娠破裂，所以 A、B、C、E 均正确。不可立即转院，以免途中发生意外。

涉及考点 | 异位妊娠的急症处理

82.下列各项，不属于妇人癥瘕主要症状的是

- | | |
|---------|---------|
| A.下腹部胀满 | B.下腹部疼痛 |
| C.腰腹部疼痛 | D.下腹部结块 |
| E.异常出血 | |

【答案】C

【解析】妇人下腹部结块，伴有或胀或痛或满，甚或出血者称为“癥瘕”，故腰腹部疼痛不属于。

涉及考点 | 癆瘕的含义

2年 易错考题

1.患者，女，31岁，已婚。曾孕3次，均自然流产，平日头晕耳鸣，腰膝酸软，精神萎靡，现又妊娠33天，夜尿频多，面色晦暗，舌淡苔白，脉沉弱。治疗应首选的方剂是

- | | |
|---------|---------|
| A.加味阿胶汤 | B.补肾安胎饮 |
| C.泰山磐石散 | D.补肾固冲丸 |
| E.以上均非 | |

【答案】D

【解析】患者曾堕胎3次，可诊为滑胎病。同时，头晕耳鸣，腰膝酸软，精神萎靡，夜尿频多，属肾气不足证。选方补肾固冲丸。补肾安胎饮用于滑胎之气血两虚证。

涉及考点 | 滑胎的辨证论治

2.患者，女，27岁，已婚。产后腰脊酸痛，腿膝乏力，头晕耳鸣，舌淡红苔薄，脉沉细。治疗应首选的方剂是

- | | |
|---------|-----------|
| A.身痛逐瘀汤 | B.黄芪桂枝五物汤 |
|---------|-----------|

- C.养荣壮肾汤 D.独活寄生汤
 E.防风汤

【答案】C

【解析】主症为产后腰脊酸痛，腿膝乏力，伴头晕耳鸣，辨证为产后身痛之肾虚证。治法为补肾养血，强腰壮骨。方剂为养荣壮肾汤。选项 A 身痛逐瘀汤用于产后身痛之血瘀证。选项 B 黄芪桂枝五物汤用于产后身痛之血虚证。选项 D 独活寄生汤或选项 E 防风汤用于产后身痛之风寒证，亦可用趁痛散。

涉及考点 | 产后身痛的辨证论治

3.患者，女，30岁，已婚。产后乍寒乍热，伴恶露虽下甚少，色紫暗有块，小腹疼痛拒按，舌紫暗，有瘀斑，脉弦涩有力，治疗应首选的方剂是

- | | |
|---------|-------|
| A.少腹逐瘀汤 | B.八珍汤 |
| C.保阴煎 | D.生化汤 |
| E.血府逐瘀汤 | |

【答案】D

【解析】主症为产后乍寒乍热，伴恶露虽下甚少，色紫暗有块，小腹疼痛拒按，舌紫暗，有瘀斑，脉弦涩有力，辨证为产后发热之血瘀证。治法为活血化瘀，和营退热。方剂为生化汤加味或桃红消瘀汤。

涉及考点 | 产后发热的辨证论治

4.患者，女，24岁，已婚。妊娠6个半月，面目四肢浮肿，皮薄光亮，按之没指，纳呆便溏，舌胖嫩苔黄腻，脉滑缓无力。治疗应首选的方剂是

- | | |
|---------|-------|
| A.茯苓导水汤 | B.真武汤 |
| C.天仙藤散 | D.猪苓汤 |
| E.白术散 | |

【答案】E

【解析】患者妊娠期间面目四肢浮肿，可诊为子肿。浮肿部位皮薄光亮，按之没指，纳呆便溏，是脾虚不运所致，应为脾虚证。治法为健脾利水。方剂为白术散加砂仁或健脾利水汤。选项 B 治疗子肿之肾虚证。选项 C 治疗子肿之气滞证。

涉及考点 | 子肿的辨证论治

5.下列除哪项外均是玉门的别称

- | | |
|------|------|
| A.胞门 | B.阴门 |
| C.产门 | D.子门 |
| E.龙门 | |

【答案】D

【解析】子门，是指子宫颈口的部位。又名子户。

涉及考点 | 宫颈口的名称

(6~7题共用备选答案)

- | | |
|------|------|
| A.激经 | B.暗经 |
| C.季经 | D.避年 |
| E.居经 | |

6.妇女终身不来潮而能受孕者，称为

【答案】B

【解析】选项 A 激经为受孕初期仍能按月经周期有少量出血而无损于胎儿者。选项 B 暗经为女性终生不潮而却能受孕者。选项 C 居经或选项 E 季经为月经三个月一潮者。选项 D 避年为月经 1 年一行者。

7. 受孕初期仍按月经少量出血而无损胎儿者，称为

【答案】A

【解析】选项 A 激经为受孕初期仍能按月经周期有少量出血而无损于胎儿者。选项 B 暗经为女性终生不潮而却能受孕者。选项 C 居经或选项 E 季经为月经三个月一潮者。选项 D 避年为月经 1 年一行者。

涉及考点 | 特殊生理性月经的定义

8. 下列关于生理性带下的描述，错误的是

- A. 色白或无色透明
- B. 质地黏稠
- C. 其量适中
- D. 无特殊气味
- E. 从阴道内排出的一种阴液

【答案】B

【解析】生理性带下：色白或无色透明，其量适中，质地黏而不稠，滑润如膏，无异臭气味，色白或无色透明。

涉及考点 | 生理性带下的性状

9. 围生期是指

- A. 孕期 28 周到生后 1 周
- B. 孕期 28 周到生后 2 周
- C. 孕期 29 周到生后 1 周
- D. 孕期 29 周到生后 2 周
- E. 孕期 29 周到生后 4 周

【答案】A

涉及考点 | 围生期的定义

10. 血虚致冲任血海不能由满而溢，或失于濡养，不会发生下列哪种疾病

- A. 痛经
- B. 月经后期
- C. 月经过少
- D. 闭经
- E. 月经先期

【答案】E

【解析】血虚致冲任血海匮乏不能由满而溢，或失于濡养，可发生月经后期、月经过少、闭经、痛经、妊娠腹痛、胎动不安、滑胎、胎萎不长、产后缺乳、产后身痛、产后血虚、不孕。

涉及考点 | 血虚致病

11. 下列月经病的治疗，错误的是

- A. 重在治本调经
- B. 分清先病和后病
- C. 急则治标，缓则治本
- D. 顺应不同年龄阶段论治
- E. 多用辛温暖宫之品

【答案】E

【解析】月经病的治疗原则：①治本调经。②分清先病和后病的论治原则。③本着“急则治其标，缓则治其本”的原则。

涉及考点 | 月经病的治疗原则

12.患者,女,19岁。月经29天一行,量多,色紫红,质稠,心烦,口渴,舌红苔黄,脉滑数有力。其诊断是

- A.月经过多血热证
- B.月经先期血热证
- C.月经先期虚热证
- D.月经先期肝热证
- E.月经过多气虚证

【答案】A

【解析】月经过多之血热型主要证候:经行量多,色鲜红或深红,质黏,或有血块,口渴饮冷,心烦,尿黄便结,舌红,苔黄,脉滑数。治法:清热凉血,固冲止血。代表方:保阴煎加地榆、茜草。

涉及考点 | 月经过多的辨证论治

13.患者,女,36岁,已婚。两次月经中间,阴道少量出血,色鲜红,头晕腰酸,夜寐不宁,五心烦热,舌质红,苔薄,脉细数。其治法是

- A.益气补肾,固冲止血
- B.滋肾养阴,固冲止血
- C.养阴清热,固冲止血
- D.补肾养肝,固冲止血
- E.益气养阴,凉血清热

【答案】B

【解析】两次月经中间,阴道少量出血判断为经间期出血,由色鲜红,头晕腰酸,夜寐不宁,五心烦热,舌质红,苔薄,脉细数,辨证为肾阴虚证。治法为滋肾养阴,固冲止血。

涉及考点 | 经间期出血的辨证论治

14.下列各项,不属于痛经气血虚弱证主症的是

- A.月经量少,色淡,质稀
- B.腹痛出现在行经之后
- C.神疲乏力,面色无华
- D.头晕眼花,腰痛如折
- E.头晕心悸,舌质淡,脉细无力

【答案】D

【解析】痛经气血虚弱证候表现为:经期或经后小腹隐痛喜按,小腹及阴部空坠不适,月经量少,色淡质稀,神疲乏力,头晕心悸,面色无华,舌淡,脉细无力。头晕眼花,腰痛如折属于肾虚证。

涉及考点 | 痛经的辨证论治

15.血虚引起经行头痛的特点是

- A.头晕,头部绵绵作痛
- B.巅顶掣痛,头晕目眩
- C.头痛剧烈,痛如锥刺
- D.头部胀痛重着
- E.头痛如裹,头晕目眩

【答案】A

【解析】头部绵绵作痛血虚头痛特点。选项B巅顶掣痛,头晕目眩是属于肝火头痛特点。选项C头痛剧烈,痛如锥刺是血瘀特点。选项D头部胀痛重着属于气滞特点。选项E头痛如裹,头晕目眩属于痰湿特点。

涉及考点 | 经行头痛

16.患者,女,20岁,未婚。每于经期鼻衄,量多、色深红,心烦易怒,口苦咽干,尿黄便结,近3个月来,月经提前7天,量少、色红,舌红苔黄,脉弦数。其诊断是

- A.逆经肺肾阴虚证
- B.月经先期血热证

- C.逆经肝经郁火证
E.月经过少血虚证
D.月经先期肝郁化热证

【答案】C

【解析】 经行吐衄的定义是每逢经行前后，或正值经期，出现周期性的吐血或衄血，亦有倒经、逆经之称。由题干每于经期鼻衄，辨病为逆经，由心烦易怒，口苦咽干，尿黄便结，舌红苔黄，脉弦数，辨证为肝经郁火证。

涉及考点 || 经行吐衄

- 17.下列各项，不属于绝经前后诸证临床表现的是
A.烘热汗出，烦躁易怒
B.潮热面红，眩晕耳鸣
C.心悸失眠，腰背酸楚
D.面浮肢肿，情志不宁
E.四肢抽搐，肌肉酸楚

【答案】E

【解析】 妇女在绝经前后伴随月经紊乱或绝经出现如阵发型烘热汗出、烦躁易怒、潮热面红、眩晕耳鸣、心悸失眠、皮肤蚁行感；或体倦乏力，面浮肢肿等症状，为绝经前后诸症。

涉及考点 || 绝经前后诸证的含义

- 18.下列除哪项外，均是妊娠禁药
A.峻下剂
B.破血剂
C.逐瘀剂
D.和血剂
E.有毒剂

【答案】D

【解析】 凡峻下、滑利、祛瘀、破血、耗气、散气及一切有毒药品，都应慎用或禁用。

涉及考点 || 妊娠的禁忌药

- 19.下列各项，不属于妊娠病常见发病机理的是
A.冲气上逆
B.瘀血内阻
C.阴血虚
D.气滞
E.脾肾虚

【答案】B

【解析】 妊娠病的发病机理有三：一是孕后阴血下聚冲任养胎，机体属于阴血偏虚，阳气偏亢的生理状态。二是胎儿逐渐长大，胎体上升影响气机的升降。三是素体脾胃虚弱，生化之源不足，胎失所养，或先天肾气不足，胞失所系。

涉及考点 || 妊娠病的发病机理

- 20.下列哪项是产后用药“三禁”
A.活血、通便、消导
B.大汗、峻下、利小便
C.清热、凉血、滋阴
D.祛寒、开郁、化瘀
E.以上均非

【答案】B

【解析】 产后用药“三禁”：①禁大汗以防亡阳。②禁峻下以防亡阴。③禁通利小便以防亡津液。

涉及考点 || 产后三禁

- 21.下列各项，不属于放置宫内节育器禁忌证的是

- A.滴虫性阴道炎
- B.月经过多
- C.重度痛经
- D.宫颈口松
- E.足月产后3月

【答案】E

【解析】放置宫内节育器禁忌证：月经过多过频；生殖道急性炎症；生殖器官肿瘤；子宫畸形；宫颈过松、重度陈旧宫颈裂或子宫脱垂；严重全身性疾病。

涉及考点 || 宫内节育器禁忌症

- 22.下列各项，不属于人工流产并发症的是
- A.人流综合征
 - B.子宫穿孔
 - C.人流后宫缩不良
 - D.人流不全
 - E.人流术后感染

【答案】C

【解析】人工流产综合征、子宫穿孔、人流不全、宫腔或颈管内口粘连、术后感染均属于人工流产并发症。

涉及考点 || 人工流产并发症

- (23~24题共用备选答案)
- A.血热证
 - B.脾肾虚弱证
 - C.肾阳亏虚证
 - D.气血虚弱证
 - E.血瘀证

23.胎动不安可用胎元饮治疗的证候是

【答案】D

24.滑胎可用泰山磐石散治疗的证候是

【答案】D

【解析】胎元饮补气养血，固肾安胎，用于气血虚弱导致的胎动不安。泰山磐石散益气养血，固冲安胎，适用于气血虚弱导致的滑胎。

涉及考点 || 胎动不安、滑胎的辨证论治

- (25~26题共用备选答案)
- A.血瘀
 - B.风寒
 - C.肾虚
 - D.血虚
 - E.气虚

25.产后肢体关节疼痛，屈伸不利，痛无定处。其证候是

【答案】B

26.产后遍身关节酸楚，肢体麻木，头晕心悸。其证候是

【答案】D

【解析】肢体关节疼痛；屈伸不利，痛无定处是风寒证的证候，遍身关节酸楚，肢体麻木，头晕心悸，是血虚证的主要证候。

涉及考点 || 产后身痛的辨证

- 27.下列各项，不属于产后身痛的是
- A.产后痛风
 - B.产后关节痛
 - C.产后痹证
 - D.儿枕痛

E.产后风

【答案】C

【解析】妇女在产乳期内出现肢体关节酸痛，麻木重着者，称为“产后身痛”亦称“产后遍身疼痛”，“产后关节痛”，“产后痛风”，俗称“产后风”。

涉及考点 | 产后身痛的含义

28.患者，女，27岁，已婚。产后恶露35天不止，色深红、质稠黏，有臭气，口燥咽干，舌红，脉虚细而数。治疗应首选的方剂是

A.清热固经汤

B.保阴煎

C.清热调血汤

D.清经散

E.牡丹散

【答案】B

【解析】患者产后恶露持续35天不止，可诊为产后恶露不绝病。恶露色深红，质黏稠，有臭气，口燥咽干，舌红，脉虚细数，是血热内扰所致，为血热证。治法为养阴清热止血。方剂为保阴煎。

涉及考点 | 产后恶露不绝的辨证论治

29.患者，女，27岁，已婚。产后恶露1个月未止。量多、色淡、无臭气，小腹空坠，神倦懒言，舌淡，脉缓弱。治疗应首选的方剂是

A.举元煎

B.固本止崩汤

C.生化汤

D.八珍汤

E.补中益气汤

【答案】E

【解析】患者产后恶露持续1月不止，可诊为产后恶露不绝病。恶露量多、色淡、无臭气，小腹空坠，神倦懒言，舌淡，脉缓弱均为气虚之象，故为气虚证。治法为补气摄血固冲。方剂为补中益气汤。生化汤主治产后恶露不绝之血瘀证。

涉及考点 | 产后恶露不绝的辨证论治

30.患者，女，37岁，已婚。下腹部肿块，热痛起伏，触之痛剧，痛连腰骶，经行量多，经期延长，带下量多，色黄如脓，或赤白兼杂。兼见身热口渴，心烦不宁，大便秘结，小便黄赤，舌暗红，有瘀斑，脉弦滑数。治疗应首选的方剂是

A.膈下逐瘀汤

B.少腹逐瘀汤

C.大黄牡丹汤

D.理冲汤

E.止带方

【答案】C

【解析】根据患者症状可诊断为瘕瘕之湿热瘀阻证。治法为清热利湿，化瘀消癥。方剂为大黄牡丹汤。选项A治疗慢性盆腔炎之气滞血瘀证。选项B治疗慢性盆腔炎之寒湿凝滞证。选项D治疗慢性盆腔炎之气虚血瘀证。选项E治疗带下量多之湿热下注证。

涉及考点 | 瘕瘕的辨证论治

肾精不足，骨失所养，久致骨骼畸形者，称为骨疳。

涉及考点 | 痘证的病因病机

77. 胎儿期体重增长快的阶段是

- A. 妊娠中期 15 周
- B. 妊娠晚期 13 周
- C. 妊娠中期 10 周
- D. 妊娠早期 4 周
- E. 妊娠早期 12 周

【答案】B

【解析】妊娠早期 12 周的胚胎期，从受精卵细胞至基本形成胎儿，最易受到各种病理因素，如感染、药物、劳累、物理、营养缺乏以及不良心理因素等伤害，造成流产、死胎或先天畸形。妊娠中期 15 周，胎儿各器官迅速增长，功能也渐成熟。妊娠晚期 13 周，胎儿以肌肉发育和脂肪积累为主，体重增长快。后两个阶段若胎儿受到伤害，易发生早产。

涉及考点 | 胎儿的体重增长

2年 易错考题

1. 按公式计算，9 个月婴儿正常体重是

- A. 9.8 kg
- B. 9.5 kg
- C. 9 kg
- D. 8.5 kg
- E. 8.25 kg

【答案】E

【解析】小儿体重公式： <6 个月，体重(kg) = $3 + 0.7 \times \text{月龄}$ ， $7 \sim 12$ 个月体重(kg) = $6 + 0.25 \times \text{月龄}$ 。 2 岁以上体重(kg) = $8 + 2 \times \text{年龄}$ 。9 个月体重(kg) = $6 + 0.25 \times 9 = 8.25$

涉及考点 | 体重测量方法

2. 按公式计算，1 岁小儿正常身高是

- A. 105 cm
- B. 100 cm
- C. 95 cm
- D. 90 cm
- E. 75 cm

【答案】E

【解析】小儿出生时身长约 50 cm，生后一年身长增长最快，约 25 cm。

涉及考点 | 身长(高)测量方法

3. 生理性胎黄的特点是

- A. 早产儿黄疸轻，消退早
- B. 黄疸常于生后 1 周内消退
- C. 早产儿与足月产儿无明显差别
- D. 早产儿 24 小时内出现黄疸
- E. 黄疸常于生后 2~3 天出现

【答案】E

【解析】生理性黄疸生后第 2~3 日出现，第 4~6 日达高峰。足月儿在生后 2 周消退，早产儿可延迟至 3~4 周消退。

涉及考点 | 胎黄的诊断

4. 足月儿生理性黄疸正常消退的时间是

- A. 生后 20~24 天
- B. 生后 4~6 天

- C. 生后 2~3 天
E. 生后 10~14 天

D. 生后 15~18 天

【答案】E

【解析】生理性黄疸生后第 2~3 日出现黄疸，第 4~6 日达高峰。足月儿在生后 2 周消退，早产儿可延迟至 3~4 周消退。

涉及考点 | 胎黄的诊断

5. 治疗干疳的首选方剂是

- A. 资生健脾丸
C. 泻心导赤汤
E. 肥儿丸
- B. 八珍汤
D. 防己黄芪汤

【答案】B

【解析】干疳证的治法为补益气血，方用八珍汤。资生健脾丸为疳气证的代表方，泻心导赤汤为口疳的代表方，肥儿丸为疳积证的代表方，防己黄芪汤为疳肿胀证的代表方。

涉及考点 | 痰证的辨证论治

6. 患儿，2 岁。持续壮热 5 天，起伏如潮，肤有微汗，烦躁不安，目赤眵多，皮疹布发，疹点由细小稀少而逐渐稠密，疹色先红后暗，皮疹凸起，触之碍手，压之褪色，大便干结，小便短黄，舌质红赤，舌苔黄腻，脉数有力。治疗应首选的方剂是

- A. 羚角钩藤汤
C. 宣毒发表汤
E. 清解透表汤
- B. 沙参麦冬汤
D. 麻杏石甘汤

【答案】E

【解析】此患儿为麻疹出疹期。持续壮热，目赤眵多，疹色先红后暗，大便干结，小便短少，舌质红赤，舌苔黄腻，脉数有力，为邪入肺胃之表现。治以清凉解毒，透疫达邪，方用清解透表汤。宣毒发表汤主治邪犯肺卫，沙参麦冬汤主治阴津耗伤，麻杏石甘汤主治邪毒闭肺，羚角钩藤汤主治邪陷心肝。

涉及考点 | 麻疹的辨证论治

7. 治疗小儿痫证痰痫证，应首选的方剂是

- A. 菖蒲丸
C. 温胆汤
E. 二陈汤
- B. 定痫丸
D. 涤痰汤

【答案】D

【解析】痰痫证的治法为豁痰开窍，方用涤痰汤。

涉及考点 | 痫证的辨证论治

8. 补中益气汤合缩泉丸治疗遗尿的证候是

- A. 肝经郁热证
C. 脾肾气虚证
E. 心肾失交证
- B. 肺脾气虚证
D. 肾气不足证

【答案】B

【解析】遗尿肺脾气虚证的治法为补肺益脾，固涩膀胱，方用补中益气汤合缩泉丸。

涉及考点 | 遗尿的辨证论治

9.风疹、水痘、奶麻初期，均可选用的方剂是

- | | |
|---------|---------|
| A.宣毒发表汤 | B.柴胡葛根汤 |
| C.解肌透痧汤 | D.透疹凉解汤 |
| E.银翘散 | |

【答案】E

【解析】风疹初期，邪郁肺卫证的治法为疏风解表清热，方用银翘散；水痘初期，邪伤肺卫证的治法为疏风清热，利湿解毒，方用银翘散；奶麻初期，邪郁肌表证的治法为解表清热，方用银翘散。

涉及考点 | 风疹、水痘、奶麻的辨证论治

10.以下关于手足口病的叙述，正确的是

- | |
|--------------------------|
| A.皮疹以口腔、四肢为主，口腔疱疹破溃后形成溃疡 |
| B.疹退后局部留有瘢痕 |
| C.疱疹质地坚硬，疱浆清亮 |
| D.皮疹呈向心性分布 |
| E.疹退后在皮疹部位有色素沉着 |

【答案】B

【解析】手足口病的临床表现：发热，口腔黏膜出现分散状疱疹；疼痛明显，破溃后形成溃疡；手掌或脚掌部出现米粒大小疱疹；臀部可受累，疱疹周围有炎性红晕，疱内液体较少。该病以手、足和口腔黏膜疱疹或破溃后形成溃疡为主要临床症状。

涉及考点 | 手足口病的发病特点

11.治疗蛔虫病肠虫证，应首选的方剂是

- | | |
|-------|--------|
| A.驱虫粉 | B.化虫丸 |
| C.追虫丸 | D.使君子散 |
| E.乌梅丸 | |

【答案】D

【解析】蛔虫病肠虫证的治法为驱蛔杀虫，调理脾胃，方用使君子散。

涉及考点 | 蛔虫病的辨证论治

12.治疗佝偻病脾虚肝旺证，应首选的方剂是

- | | |
|----------|---------|
| A.健脾丸 | B.健脾益气汤 |
| C.补肾地黄丸 | D.益脾镇惊散 |
| E.人参五味子汤 | |

【答案】D

【解析】佝偻病脾虚肝旺证的治法为健脾助运，平肝息风，方用益脾镇惊散。

涉及考点 | 维生素 D 缺乏性佝偻病的辨证论治

13.患儿，5岁。臀部及下肢紫癜1天，呈对称痒，发热，舌红，苔薄黄，脉浮数。治疗应首选的方剂是

- | | |
|---------|---------|
| A.大补阴丸 | B.化斑汤 |
| C.归脾汤 | D.连翘败毒散 |
| E.犀角地黄汤 | |

【答案】D

【解析】紫癜色鲜红，瘙痒，发热，舌红，苔薄黄，脉浮数，为风热伤络之表现。治以疏风散邪、清热凉血，方用连翘败毒散。犀角地黄汤主治血热妄行；归脾汤主治气不摄血；化斑汤非主治紫癜；大补阴丸主治阴虚火旺。

涉及考点 | 紫癜的辨证论治

14.患儿，男。出生后黄疸日久不退，面目皮肤发黄，颜色晦滞，腹部胀满，右胁下痞块，小便短黄，大便不调或灰白，舌紫暗，有瘀斑，苔苔黄。治疗应首选的方剂是

- A.茵陈五苓散 B.血府逐瘀汤
C.茵陈蒿汤 D.茵陈理中汤
E.茵陈术附汤

【答案】B

【解析】面目皮肤发黄，颜色晦滞，右胁下痞块，舌紫暗，有瘀斑，皆为瘀象。辨证为胎黄常证之气滞血瘀证，治宜行气化瘀消积，用血府逐瘀汤。

涉及考点 | 胎黄的辨证论治

15.患儿，9个月。发热，微汗，鼻塞流涕，咽红，夜间体温升高，又见惊惕啼叫，夜卧不安，舌质红，苔薄白，指纹浮紫。其诊断是

- A.夜啼 B.感冒夹惊
C.急惊风 D.感冒夹痰
E.小儿暑温

【答案】B

【解析】小儿神气怯弱，感邪之后，易致心神不宁，睡卧不实，惊惕抽风，此为感冒夹惊。小儿感冒还可夹痰、夹滞，一见咳嗽痰盛；一见脘胀纳呆，呕吐泄泻。小儿夜啼是夜啼哭不安，并无外感和惊惕的表现；小儿惊风以高热、抽风、昏迷为主要表现；小儿暑温是夏天发生的季节性疾病。

涉及考点 | 感冒的诊断

16.患儿，10岁。昨天受凉后，见喷嚏、鼻塞、流清涕，今晨起喘咳，咳痰黄稠，口渴欲饮，大便干燥，查体：鼻扇，口周发绀，咽红，双肺满布哮鸣音，舌质红，苔薄白，脉滑数。其证候是

- A.外寒内热 B.热性哮喘
C.肺肾阴虚 D.寒性哮喘
E.肺实肾虚

【答案】A

【解析】哮喘外寒内热证以外有风寒之表证，内有痰热之里证为要点。受凉后见喷嚏、鼻塞、流涕为外寒之症；口渴引饮，咳痰黏稠色黄，便秘，咽红为内热之症。辨证属哮喘之外寒内热证。

涉及考点 | 哮喘的辨证

17.患儿，女，2岁。舌边尖溃烂，色赤疼痛，烦躁多啼，口干欲饮，小便短黄，舌尖红，苔薄黄，指纹紫。其证候是

- A.热毒内盛 B.心火上炎
C.风热乘脾 D.心脾积热
E.虚火上炎

【答案】B

【解析】口疮常见风热乘脾、心火上炎、虚火上浮三个证型。其中风热乘脾证与心火上炎

证症状相似，但风热乘脾证可见口臭涎多，大便秘结；心火上炎证可见心烦不安，口干欲饮。虚火上浮证虚象明显，不易与此两证混淆。此患儿见烦躁，口干欲饮，辨证为心火上炎。

涉及考点 | 口疮的辨证

18.患儿，男，3岁。形体明显消瘦，肚腹膨胀，面色萎黄无华，发结如穗，夜卧不宁，食欲减退，多食多便，舌淡苔腻，脉沉细而滑。其治法是

- | | |
|--------|--------|
| A.导滞和中 | B.消积理脾 |
| C.消食导滞 | D.理气和胃 |
| E.和脾助运 | |

【答案】B

【解析】患儿形体明显消瘦，肚腹膨胀，面色萎黄无华，辨病为疳证；发结如穗，夜卧不宁，食欲减退，多食多便，舌淡苔腻；脉沉细而滑，辨证为疳积证。治法为消积理脾，方用肥儿丸。

涉及考点 | 痢证的辨证论治

19.患儿，11个月。早产，生后一直人工喂养，经常泄泻，近四个月来食欲不振，面色㿠白，唇爪甲苍白，毛发稀黄，精神萎靡，手足欠温，舌淡苔白，指纹淡。检查：血红蛋白60 g/L。治疗应首选的方剂是

- | | |
|---------|--------|
| A.右归丸 | B.小建中汤 |
| C.金匮肾气丸 | D.理中丸 |
| E.六味地黄丸 | |

【答案】A

【解析】唇舌爪甲苍白，毛发稀黄，精神萎靡，手足欠温，舌淡苔白，指纹淡，为脾肾阳虚之表现。辨证属脾肾阳虚证，治以温补脾肾、益阴养血，方用右归丸。选项B温中补虚，和里缓急，主治中焦虚寒，肝脾不和证。选项C温补肾阳，化气行水，用于肾虚水肿，腰膝酸软，小便不利，畏寒肢冷。选项E治疗肾阴虚证。选项D温中祛寒，补气健脾，常用于急慢性胃肠炎、胃及十二指肠溃疡、胃痉挛、胃下垂、胃扩张、慢性结肠炎等属脾胃虚寒者。

涉及考点 | 贫血的辨证论治

20.患儿，男，2岁。精神疲惫，面色萎黄，低热，手足心热，易汗出，大便干结，肢体拘挛，抽搐时轻时重，舌绛少津，苔少，脉细数。治疗应首选的方剂是

- | | |
|---------|--------|
| A.镇肝息风汤 | B.大定风珠 |
| C.左归丸 | D.大补阴丸 |
| E.六味地黄丸 | |

【答案】B

【解析】惊风首要辨别急惊风与慢惊风。急惊风为痰、热、惊、风四证俱备，临床以高热、抽风、神昏为主要表现。慢惊风来势缓慢，抽搐无力，时作时止，反复难愈，常伴昏迷、瘫痪等症。此患儿主症为抽搐时轻时重，伴低热，可知为慢惊风。手足心热，易汗出，舌绛少津，苔少，脉细数，皆为阴虚之象，辨证为慢惊风阴虚风动证，治宜育阴潜阳，滋肾养肝，用大定风珠。

涉及考点 | 惊风的辨证论治

21.患儿，女，7岁。癫痫发作时突然仆倒，神清，颈项强直，四肢抽搐，两目上视，牙关紧闭，口吐白沫，口唇及面部色青，舌苔白，脉弦滑。治疗应首选的方剂是

- | | |
|-------|---------|
| A.定痫丸 | B.六君子汤 |
| C.镇惊丸 | D.通窍活血汤 |

E.涤痰汤

【答案】A

【解析】痫证发作期以病因辨证为主，常见的病因有惊、风、痰、瘀等。惊痫发病前常有惊吓史，发作时多伴有惊叫、恐惧等精神症状；风痫发作时抽搐明显，易由外感发热诱发，或伴有发热等症；痰痫发作以神识异常为主，常有失神、摔倒、手中持物坠落等；瘀血痫通常有明显的颅脑外伤史，头部疼痛位置较为固定。痫证虚证的辨证，以病位为主，区分脾虚痰盛与脾肾两虚。此患儿辨证为风痫，治宜息风止痉，用定痫丸。镇惊丸用于惊痫；涤痰汤用于痰痫；通窍活血汤用于瘀血痫；六君子汤用于脾虚痰盛。

涉及考点 | 痫证的辨证论治

22.患儿，男，6岁。睡中遗尿，可达数次，小便清长，面白少华，神疲乏力，智力稍差，肢寒畏冷，舌质淡，苔白滑，脉沉无力。其证候是

A.肝经湿热

B.肺脾气虚

C.肾阴亏虚

D.肾气不足

E.心肾失交

【答案】D

【解析】遗尿常见4种证型。肺脾气虚证见夜间遗尿，日间尿频而量多，伴经常感冒，面色少华，神疲乏力，食欲不振，大便溏薄，舌质淡红，苔薄白；肾气不足证见寐中多遗，可达数次，伴面白少华，神疲乏力，智力较同龄儿稍差，肢冷畏寒，舌质淡，苔白滑；心肾失交证见梦中遗尿，寐不安宁，伴烦躁叫扰，白天多动少静，难以自制，或五心烦热，形体较瘦，舌质红，苔薄少津；肝经湿热证见寐中遗尿，小便量少色黄，伴性情急躁，夜梦纷纭，性情急躁，目睛红赤，舌质红，苔黄腻。

涉及考点 | 遗尿的辨证

(23~24题共用备选答案)

A.四神丸

B.附子理中汤

C.保和丸

D.藿香正气散

E.参苓白术散

23.患儿，男，12岁。大便清稀，夹有泡沫，臭气不甚，肠鸣腹痛，伴有恶寒发热，鼻流清涕，舌质淡，苔薄白，脉浮紧。治疗应首选的方剂是

【答案】D

24.患儿，男，12岁。大便稀溏，臭气不甚，食后作泻，面色萎黄，形体消瘦，神疲倦怠，舌质淡，苔白，脉缓。治疗应首选的方剂是

【答案】E

【解析】大便清稀，夹有泡沫，臭气不甚，肠鸣腹痛，伴有恶寒发热，鼻流清涕，为风寒泻，治宜疏风散寒，化湿和中，用藿香正气散。大便稀溏，臭气不甚，食后作泻，面色萎黄，形体消瘦，神疲倦怠，为脾虚泻，治宜健脾益气，助运止泻，用参苓白术散。故26题选D，27题选E。

涉及考点 | 泄泻的辨证论治

(25~26题共用备选答案)

A.养阴润肺，益气健脾

B.清肝泻火，活血止痛

C.疏风清热，散结消肿

D.清热涤痰，开肺定喘

E.清气凉营，泻火解毒

25.肺炎喘嗽痰热闭肺证的治法是

【答案】D

26.流行性腮腺炎毒窜睾腹证的治法是

【答案】B

【解析】选项 C 痒腮邪犯少阳证的治法。选项 D 为肺炎喘嗽痰热闭肺证的治法。选项 E 为丹痧毒炽气营证的治法。顿咳气阴耗伤证的证候为痉咳缓解，咳嗽逐渐减轻，仍有干咳无痰，或痰少而稠，声音嘶哑，伴低热，午后颧红，烦躁，夜寐不宁，盗汗，口干，舌红，苔少或无苔，脉细数。治法，养阴润肺，健脾益气。流行性腮腺炎毒窜睾腹证的证候为腮部肿胀消退后，一侧或双侧睾丸肿胀疼痛，或脘腹、少腹疼痛，痛时拒按，舌红，苔黄，脉数。治法，清肝泻火，活血止痛。

涉及考点 | 肺炎喘嗽、痄腮的辨证论治

金英杰医学教育

【答案】D

【解析】痹症属着痹者取梁丘、犊鼻、阴陵泉、足三里、商丘。痹症属热痹者取大椎、曲池、梁丘、血海、膝眼、阳陵泉。

涉及考点 | 痹症的治疗

(77~78题共用备选答案)

- | | |
|----------|----------|
| A.大椎、曲池 | B.风门、肺俞 |
| C.天枢、足三里 | D.脾俞、足三里 |
| E.太溪、太冲 | |

77.治疗瘾疹之血虚风燥证,除主穴外,还应选取的配穴是

【答案】D

78.治疗瘾疹之胃肠积热证,除主穴外,还应选取的配穴是

【答案】C

涉及考点 | 瘰疹的治疗

(79~80题共用备选答案)

- | | |
|-------|------|
| A.隐白 | B.公孙 |
| C.内庭 | D.丰隆 |
| E.阴陵泉 | |

79.治疗痰邪所致病症,应选取的腧穴是

【答案】D

80.治疗月经过多、崩漏等妇科疾病应选取的腧穴是

【答案】A

【解析】丰隆主治:①头痛、眩晕、癫痫。②咳嗽、痰多等痰饮病证。③下肢痿痹;④腹胀,便秘。隐白(井穴)主治:①月经过多、崩漏等妇科病。②便血、尿血等出血证。③癫痫,多梦;④惊风;⑤腹满,暴泄。

涉及考点 | 丰隆穴、隐白穴的主治

2年 易错考题

1.循行“起于中焦,下络大肠”的经络是

- | | |
|----------|----------|
| A.手厥阴心包经 | B.手太阴肺经 |
| C.足阳明胃经 | D.手阳明大肠经 |
| E.手太阳小肠经 | |

【答案】B

【解析】《灵枢·经脉》原文指出:“肺手太阴之脉,起于中焦,下络大肠,还循胃口,上膈属肺”。

涉及考点 | 手太阴肺经的循行

2.手厥阴经腧穴除主治心、心包、胸、神志病外,还主要用于治疗

- | | |
|------|------|
| A.胃病 | B.肾病 |
| C.肝病 | D.胆病 |
| E.脾病 | |

【答案】A

【解析】主治概要:①心胸、神志病,如心痛,心悸,心烦,胸闷,癫痫等。②胃腑病证,如胃痛,呕吐等。③经脉循行部位的其他病证,如上臂内侧痛,肘臂挛麻,腕痛,掌中热等。

涉及考点 | 手厥阴经腧穴主治病证

3.根据“子母补泻法”,肾经实证应取

- | | |
|------|------|
| A.复溜 | B.阴谷 |
| C.然谷 | D.涌泉 |
| E.太溪 | |

【答案】D

【解析】根据“子母补泻法”,肾经实证的取穴原则是实则泻其子,所以肾经实证应选取涌泉穴来进行治疗。

涉及考点 | 子母补泻法

4.足阳明胃经与足太阴脾经在何处交接

- | | |
|---------|---------|
| A.示指端 | B.胸中 |
| C.目内眦 | D.足大趾内端 |
| E.足小趾内端 | |

【答案】D

【解析】相表里的阴经和阳经在手足末端交接,肺经和大肠经交接于示指端,胃经和脾经交接于足大趾内端,膀胱经和肾经交接于足小趾内端;同名的阳经与阳经在头面部交接,小肠经和膀胱经交接于目内眦;相互衔接的阴经和阴经在胸中交接,肾经与心包经交接于胸中。

涉及考点 | 经脉交接

5.按照腧穴分经论治规律,足太阳经腧穴的主治特点是

- | | |
|--------------|-------------|
| A.后头、肩胛、耳病 | B.前头、口齿、胃肠病 |
| C.前头、鼻、口、齿病 | D.侧头、耳病、胁肋病 |
| E.后头、背腰病、脏腑病 | |

【答案】E

涉及考点 | 足太阳经腧穴的主治特点

6.出于腋下大包穴,散布于胸肋部的络脉是

- | | |
|---------|---------|
| A.心包络 | B.督脉的别络 |
| C.任脉的别络 | D.脾之大络 |
| E.胃之别络 | |

【答案】D

【解析】脾之大络是大包穴,位于腋下散布于胸肋部。

涉及考点 | 特定穴

7.悬钟穴位于

- | | |
|------------------|----------------|
| A.外踝后缘中点上3寸,腓骨前缘 | B.外踝高点上3寸,腓骨后缘 |
| C.外踝下缘中点上3寸,腓骨前缘 | D.外踝高点上3寸,腓骨前缘 |
| E.外踝后缘中点上3寸,腓骨后缘 | |

【答案】D

【解析】悬钟穴位于外踝高点上3寸,腓骨前缘。

涉及考点 | 悬钟穴的定位

8. 位于外踝高点上 5 寸, 胫骨前缘的腧穴是
- A. 足窍阴
 - B. 足临泣
 - C. 条口
 - D. 光明
 - E. 悬钟

【答案】D

【解析】足窍阴位于第 4 趾外侧趾甲根角旁 0.1 寸。足临泣位于第 4 跖趾关节的后方, 足小趾伸肌腱的外侧。条口位于小腿前外侧, 当犊鼻穴下 8 寸, 距胫骨前缘 1 横指。光明位于外踝高点上 5 寸, 胫骨前缘。悬钟位于外踝高点上 3 寸, 胫骨前缘。

涉及考点 | 光明穴的定位

9. 治疗咽喉肿痛, 宜点刺出血的穴位是
- A. 少商
 - B. 鱼际
 - C. 侠白
 - D. 天府
 - E. 列缺

【答案】A

【解析】少商主治咽喉肿痛、鼻衄、高热等肺系实热证, 癫狂、昏迷。宜浅刺, 或点刺出血。鱼际主治咳嗽、咯血、咽干、咽喉肿痛失音等肺系病证, 以及小儿疳积。宜直刺, 小儿疳积可用割治法。侠白主治咳嗽、气短等肺系病证, 以及干呕, 上臂痛。宜直刺。天府主治咳嗽、气喘、鼻衄等肺系病证, 以及癰气, 上臂痛。宜直刺。列缺主治咳嗽、气喘、咽喉肿痛等肺系病证以及头痛、齿痛等头部疾患。宜向上斜刺。

涉及考点 | 少商穴的操作方法

10. 在三角肌区, 肩峰外侧缘前端与肱骨大结节两骨间凹陷中的穴位是
- A. 肩髎
 - B. 肩贞
 - C. 肩髃
 - D. 肩中俞
 - E. 肩外俞

【答案】C

【解析】肩髃: 在三角肌区, 肩峰外侧缘前端与肱骨大结节两骨间凹陷中。主治: ①肩臂挛痛、上肢不遂等肩、上肢病证。②癰疹, 瘰疬。

涉及考点 | 肩髃穴的定位

11. 中府穴与前正中线的距离是
- A. 1 寸
 - B. 1.5 寸
 - C. 4 寸
 - D. 6 寸
 - E. 8 寸

【答案】D

【解析】中府为肺之募穴, 位于胸部, 横平第 1 肋间隙处, 锁骨下窝外侧, 前正中线旁开 6 寸, 主治咳嗽、气喘、胸满痛等肺部病证以及肩背痛。

涉及考点 | 中府穴的定位

12. 听会穴归属于
- A. 足太阴脾经
 - B. 足阳明胃经
 - C. 足太阳膀胱经
 - D. 足厥阴肝经

E.足少阳胆经

【答案】E

【解析】听会穴是足少阳胆经的常用腧穴之一,位于耳屏间切迹前,下颌骨髁状突的后缘,张口有凹陷处。主治耳鸣、耳聋等耳疾;齿痛,口眼歪斜,面痛。

涉及考点 || 听会穴的经络归属

13.位于腕背横纹桡侧,当拇短伸肌腱与拇长伸肌腱之间的凹陷中的穴位是

- | | |
|------|------|
| A.太渊 | B.神门 |
| C.阳池 | D.阳溪 |
| E.养老 | |

【答案】D

【解析】阳溪位于腕背横纹桡侧,当拇短伸肌腱与拇长伸肌腱之间的凹陷中;太渊位于腕掌侧横纹桡侧端,桡动脉搏动处;神门位于腕部,腕掌侧远端横纹尺侧端,尺侧腕屈肌腱的桡侧凹陷处;阳池位于腕背部横纹中,指伸肌腱的尺侧凹陷处;养老位于前臂背面尺侧,腕背横纹上1寸,尺骨头桡侧凹缘中。

涉及考点 || 阳溪穴的定位

14.患者,女,32岁。行经后小腹部绵绵作痛,喜按,月经色淡,量少。治疗应首选的腧穴是

- | | |
|--------------|--------------|
| A.三阴交、中极、次髎 | B.足三里、太冲、中极 |
| C.丰隆、天枢、气穴 | D.阴陵泉、中极、阳陵泉 |
| E.三阴交、足三里、关元 | |

【答案】E

【解析】患者为痛经虚证,治疗应调补气血,温养冲任,取穴应以足太阴、足阳明经为主,主要选取三阴交、足三里、关元。关元为任脉穴,强身健体要穴,可补益肝肾,温养冲任;足三里补益气血;三阴交为肝脾肾三经之交会穴,可以健脾益气,调补肝肾。肝脾肾精血充盈,胞脉得养,冲任自调。若为实证,则选用三阴交、中极、次髎。

涉及考点 || 痛经的处方主穴

15.章门穴位于

- | | |
|-------------------|-------------------|
| A.腹侧,腋中线第8肋骨端稍下处 | B.腹侧,腋中线第9肋骨端稍下处 |
| C.腹侧,腋中线第10肋骨端稍下处 | D.腹侧,腋中线第11肋骨端稍下处 |
| E.腹侧,腋中线第12肋骨端稍下处 | |

【答案】D

【解析】章门穴属足厥阴肝经,在侧腹部,第11肋游离端的下际。速记口诀:6、7是肝(期门)胆(日月),11、12是脾(章门)肾(京门)。

涉及考点 || 章门穴的定位

16.外劳宫位于手背,第二、三掌骨间的

- | | |
|-------------|-----------|
| A.指掌关节后0.5寸 | B.指掌关节后1寸 |
| C.指掌关节后1.5寸 | D.指掌关节后2寸 |
| E.指掌关节后2.5寸 | |

【答案】A

【解析】指掌关节后0.5寸为外劳宫穴的定位,本穴治疗落枕病证有特效,又名落枕穴。

涉及考点 || 外劳宫的定位

17.化脓灸所属的灸法是

- A.直接灸
- B.间接灸
- C.悬起灸
- D.实按灸
- E.天灸

【答案】A

【解析】化脓灸属于瘢痕灸，直接灸包括瘢痕灸和无瘢痕灸。

涉及考点 || 艾炷灸

18.后头部痛连项部的病位是

- A.太阳经
- B.少阳经
- C.阳明经
- D.少阴经
- E.厥阴经

【答案】A

【解析】太阳经头痛主要见于前额、巅顶、枕部疼痛连及项、背，或由项连肩。文献《冷庐医话·头痛》“头痛属太阳者，自脑后上至巅顶，其痛连项……项强腰脊痛。”

涉及考点 || 头痛部位所属经络

19.治疗眩晕实证的主穴是

- A.百会、太阳、风池、合谷
- B.百会、风池、太冲、内关
- C.百会、风池、肝俞、肾俞、足三里
- C.百会、风池、肝俞、肾俞、足三里
- D.百会、神门、三明交、照海、申脉
- E.颈夹脊、天柱、风池、曲池、悬钟

【答案】B

【解析】首先眩晕实证应当平肝潜阳，化痰定眩。以督脉、足少阳经、手足厥阴经为主。百会位于巅顶，可清利脑窍而定眩。风池位于头部，局部取穴，调理头部气机。太冲为肝之原穴，可平肝潜阳。内关为八脉交会穴，通阴维脉，与太冲配伍，属同名经配穴，加强平肝之功。

涉及考点 || 眩晕的处方

20.位于耳甲艇的后下部，即耳甲 12 区的耳穴是

- A.盆腔
- B.内生殖器
- C.神门
- C.神门
- D.胰胆
- E.肝

【答案】E

【解析】肝位于耳甲艇的后下部，即耳甲 12 区。盆腔位于三角窝后 1/3 的下部，即三角窝 5 区。内生殖器位于三角窝前 1/3 的下部，即三角窝 2 区。神门位于三角窝后 1/3 的下部，即三角窝 4 区。胰胆位于耳甲艇的后上部，即耳甲 11 区。

涉及考点 || 常用耳穴的部位

21.患者牙痛隐隐，时作时止，牙齿浮动，舌红，少苔，脉细数。治疗除主穴外，还应选取的腧穴是

- A.外关、风池
- B.二间、曲池
- C.太冲、劳宫
- C.太冲、劳宫
- D.内庭、二间
- E.太溪、行间

【答案】E

【解析】辨病是牙痛，牙痛隐隐，牙齿浮动，舌红，少苔，脉细数，诊断为阴虚牙痛，阴虚应选

用滋阴清热的腧穴，太溪滋阴，行间清热。

涉及考点 || 牙痛的处方主穴

22. 治疗便秘虚证，在取主穴的基础上，还应选取的腧穴是
- A. 合谷、曲池
 - B. 太冲、中脘
 - C. 神阙、关元
 - D. 足三里、脾俞、气海
 - E. 照海、气海

【答案】D

【解析】治疗便秘的主穴是天枢、大肠俞、上巨虚、支沟。热秘配合谷、曲池；气秘配太冲、中脘；冷秘配神阙、关元；虚秘配足三里、脾俞、气海，兼阴伤津亏者加照海、太溪。

涉及考点 || 便秘的处方配穴

23. 崩漏的发生主要与哪些经脉有关
- A. 肝经、肾经
 - B. 肝经、脾经
 - C. 任脉、带脉
 - D. 任脉、冲脉
 - E. 任脉、督脉

【答案】D

【解析】崩漏多与素体阳盛或劳倦思虑、饮食不节、房劳多产、七情内伤等产生的湿、热、瘀有关。病位在胞宫，与冲、任二脉及肝、脾、肾关系密切。

涉及考点 || 崩漏的辨证论治

24. 针刺治疗太阳头痛应选取的腧穴是
- A. 天柱、后溪、昆仑
 - B. 印堂、合谷、内庭
 - C. 率谷、外关、足临泣
 - D. 四神聪、太冲、内关
 - E. 风门、列缺、足三里

【答案】A

【解析】头痛治疗宜疏调经脉、通络止痛，按局部穴位和远端循经取穴为主，太阳经头痛为后枕部疼痛，天柱位于后枕部，属局部取穴，疏导头部经气，后溪、昆仑为远端循经取穴。

涉及考点 || 头痛的处方主穴

25. 治疗中风中脏腑闭证，除十二井穴外，应选取的是
- A. 督脉、手厥阴经穴
 - B. 任脉、手厥阴经穴
 - C. 督脉、足厥阴经穴
 - D. 任脉、足厥阴经穴
 - E. 任脉、手足厥阴经穴

【答案】A

【解析】中风中脏腑闭证，治疗宜平肝息风，醒脑开窍，取督脉、手厥阴及足太阴经穴为主。主穴为水沟、十二井、太冲、丰隆、劳宫。

涉及考点 || 中风的治法

- (26~27题共用备选答案)
- A. 手太阴肺经
 - B. 手少阴心经
 - C. 足太阴脾经
 - D. 足少阴肾经
 - E. 足厥阴肝经

26. 太冲穴归属的经脉是

【答案】E

27.太渊穴归属的经脉是

【答案】A

【解析】太冲是肝经的原穴、输穴，太渊是肺经的原穴、输穴。

涉及考点 | 太冲穴、太渊穴的经脉归属

(28~29题共用备选答案)

- A.商丘
- B.丘墟
- C.照海
- D.申脉
- E.然谷

28.在踝区,外踝尖直下,外踝下缘与跟骨之间凹陷中的腧穴是

【答案】D

29.在踝区,内踝尖下1寸,内踝下缘边际凹陷中腧穴是

【答案】C

【解析】商丘:位于内踝前下方凹陷中,当舟骨结节与内踝尖连线的中点处。丘墟:足外踝前下方,趾长伸肌腱的外侧凹陷中。照海:内踝尖下1寸,内踝下缘边际凹陷中。申脉:外踝直下方凹陷中。然谷:内踝前下方,足舟骨粗隆下缘凹陷中。

涉及考点 | 照海、申脉的定位

- A.由清音转为鼓音
- B.由清音转为浊音
- C.由清音转为实音
- D.由过清音转为实音
- E.由浊音变为实音

【答案】B

【解析】自肺开始叩诊肝脏浊音界，当由清音转为浊音时，即为肝上界。此处相当于被遮盖的肝顶部，故又称肝相对浊音界。而再向下叩1~2肋间，则浊音变为实音，此处的肝脏不再被肺所遮盖而直接贴近胸壁，称肝绝对浊音界。

涉及考点 | 腹部叩诊

- 47.可见匙状甲的疾病是
- A.支气管扩张症
 - B.发绀型先天性心脏病
 - C.肝硬化
 - D.支气管扩张
 - E.缺铁性贫血

【答案】E

【解析】匙状甲多见于缺铁性贫血，偶见于风湿热、甲癣等。发绀型先天性心脏病、支气管扩张、肝硬化、支气管扩张症可见杵状指。

涉及考点 | 四肢、关节检查

- 48.下列各项，符合中枢性瘫痪表现特点的是
- A.肌张力增高
 - B.肌萎缩明显
 - C.无病理反射
 - D.深反射减弱或消失
 - E.瘫痪范围较局限，以肌群为主

【答案】A

【解析】中枢性瘫痪范围较广，肌张力过高，有病理反射，肌萎缩不明显，深反射亢进；周围性瘫痪范围较局限，以肌群为主，肌张力过低或缺失，无病理反射，肌萎缩明显，深反射减弱或消失。

涉及考点 | 中枢性与周围性瘫痪的鉴别

2年 易错考题

- 1.可引起全身性水肿的疾病是
- A.静脉炎
 - B.丝虫病
 - C.甲状腺功能减退症
 - D.淋巴管炎
 - E.肿瘤压迫

【答案】C

【解析】全身性水肿：①心源性水肿，见于右心衰竭、慢性缩窄性心包炎等。②肾源性水肿，多由各种肾炎、肾病综合征等引起。③肝源性水肿，见于肝硬化、重症肝炎等；④营养不良性水肿，见于低蛋白血症和维生素A缺乏；⑤内分泌源性水肿，见于甲状腺功能减退症、垂体前叶功能减退症等黏液性水肿。A、B、D、E均可见局限性水肿。

涉及考点 | 水肿的病因

- 2.出现泪滴形红细胞的疾病是
- A.乙醇中毒
 - B.骨髓纤维化

- C. 血红蛋白 S 病 D. 自身免疫性溶血性贫血
 E. 缺铁性贫血

【答案】B

【解析】选项 A 可见口形红细胞。选项 B 可见泪滴形红细胞。选项 C 可见镰形红细胞。选项 D 可见球形红细胞。选项 E 可见靶形红细胞。

涉及考点 | 红细胞形态异常

3. 患者，男性，35岁。40分钟前因情绪激动突发胸骨后闷痛，疼痛可向左臂放射，舌下含服硝酸甘油未见缓解。心电图检查存在室性心律失常。既往有冠心病病史。首先考虑

- A. 心绞痛 B. 心肌梗死
 C. 急性心功能不全 D. 干性胸膜炎
 E. 肺梗死

【答案】B

【解析】本题考查的重点在于心绞痛及心肌梗死的鉴别，心绞痛与心肌梗死疼痛区域均位于胸骨后及心前区，均可由于情绪激动诱发，都能表现出疼痛放射。但心绞痛症状轻、时间短（3~5 min）、含服硝酸甘油有效；心肌梗死症状重，时间长（>30 min），硝酸甘油无效。而选项 C、D、E 其发作与情绪无明显关联，且症状均不相符。

涉及考点 | 心绞痛及心肌梗死

4. 下列不属于代谢性酸中毒原因的是
- A. 肾衰竭 B. 糖尿病酮症
 C. 肺通气功能障碍 D. 摄入大量阿司匹林
 E. 腹泻

【答案】C

【解析】代谢性酸中毒的原因包括：①酸性物质产生过多，如糖尿病酮症等。②肾脏排酸保碱功能障碍，如肾功能障碍、肾小管性酸中毒、肾上腺皮质功能低下（阿狄森病）等。③肾外失碱，如腹泻、肠漏等；④酸性药物摄入过多，如阿司匹林等；⑤稀释性酸中毒，如大量输入生理盐水。肺通气功能障碍属于呼吸性酸中毒。

涉及考点 | 代谢性酸中毒的病因

5. 下列各项，可出现脉压减小的是
- A. 主动脉瓣关闭不全 B. 甲状腺功能亢进症
 C. 动脉导管未闭 D. 缩窄性心包炎
 E. 严重贫血

【答案】D

【解析】脉压<30 mmHg 称为脉压减小，见于主动脉瓣狭窄、心力衰竭、休克、心包积液、缩窄性心包炎等。A、B、C、E 均见于脉压增大。

涉及考点 | 血压变异的临床意义

6. 下列各项，出现开瓣音的是
- A. 二尖瓣脱垂 B. 二尖瓣狭窄
 C. 主动脉瓣狭窄 D. 二尖瓣关闭不全
 E. 主动脉瓣关闭不全

【答案】B

【解析】开瓣音(二尖瓣开放拍击音)见于二尖瓣狭窄而瓣膜弹性尚好时,是二尖瓣分离术适应证的重要参考条件,故开瓣音为二尖瓣狭窄病变时出现的病理性杂音,所以本题选B。

涉及考点 | 心音听诊

- 7.主动脉瓣关闭不全的杂音是
- A.舒张期隆隆样杂音
 - B.舒张期叹气样杂音
 - C.收缩期吹风样杂音
 - D.乐音样杂音
 - E.连续性机器样杂音

【答案】B

【解析】选项A可见于二尖瓣狭窄。选项B可见于主动脉瓣关闭不全。选项C可见于二尖瓣关闭不全。选项D可见于感染性心内膜炎及梅毒性主动脉瓣关闭不全。选项E可见于先天性心脏病动脉导管未闭。

涉及考点 | 心脏杂音的特征

- 8.库瓦济埃征阳性可见于
- A.胰头癌
 - B.急性阑尾炎
 - C.急性肠炎
 - D.腹膜炎
 - E.急性胆囊炎

【答案】A

【解析】胰头癌压迫胆总管导致阻塞,出现黄疸进行性加深,胆囊显著肿大,但无压痛,称为库瓦济埃征阳性。

涉及考点 | 腹内脏器触诊

- 9.肌力分几级
- A.7级
 - B.6级
 - C.5级
 - D.4级
 - E.3级

【答案】B

【解析】肌力分为6级,其中0级为全瘫,1~4级为不完全瘫痪(轻瘫),5级为正常肌力。

涉及考点 | 运动功能检查

- 10.糖尿病病人糖化血红蛋白的控制范围是
- A.10%~12%
 - B.8%~10%
 - C.5%~8%
 - D.4%~6%
 - E.2%~3%

【答案】D

【解析】血清糖化血红蛋白不受血糖浓度暂时波动的影响,是糖尿病诊断和监控的重要指标。其正常值为4%~6%。

涉及考点 | 糖类检查

- 11.尿沉渣镜检每高倍视野多少个白细胞即视为异常
- A.>10个
 - B.>8个
 - C.>5个
 - D.>3个
 - E.>1个

【答案】C

【解析】尿沉渣镜检白细胞或脓细胞计数>5个/HP,称镜下脓尿多为泌尿系统感染,见于肾盂肾炎、膀胱炎、尿道炎及肾结核等。

涉及考点 | 尿液显微镜检查

- 12.心电图检查中代表心室除极、复极时间的是
- | | |
|---------|---------|
| A.S-T段 | B.T-P段 |
| C.QRS波群 | D.Q-T间期 |
| E.P-R间期 | |

【答案】C

【解析】选项A反映心室早期缓慢复极的电位和时间变化。选项B反映心室晚期快速复极到下一个心电活动开始的电位和时间变化。选项C反映左、右心室除极过程中的电位和时间变化。选项D反映左、右心室除极与复极全过程的时间。选项E反映电激动过程在房室交界区及其后的希氏束、室内传导系统所产生的微弱变化。

涉及考点 | 心电图各波段的意义

(13~14题共用备选答案)

- | | |
|----------|---------|
| A.十二指肠溃疡 | B.急性胰腺炎 |
| C.穿孔 | D.输尿管结石 |
| E.急性肠炎 | |

13.暴饮暴食后上腹疼痛,向左腰背放散,多见于

【答案】B

14.腹痛,伴有腹泻,多见于

【答案】E

【解析】腹痛伴有腹泻多见于急性肠炎。胃穿孔腹痛剧烈难忍,多有慢性胃炎病史。输尿管结石出现剧烈下腹痛。急性胰腺炎多于暴饮暴食后出现上腹疼痛,向左腰背放散。十二指肠溃疡腹痛长期有规律。

涉及考点 | 腹痛的问诊要点

(15~16题共用备选答案)

- | | |
|----------|----------|
| A.肺结核 | B.支气管扩张症 |
| C.胸膜炎 | D.喉头水肿 |
| E.上呼吸道感染 | |

15.上述各项,常出现咳嗽、咯血伴低热、盗汗的是

【答案】A

16.上述各项,常出现咳嗽、咯血伴大量脓痰的是

【答案】B

【解析】上呼吸道感染无咯血;胸膜炎咳嗽伴胸痛,无咯血;喉头水肿可见咳嗽伴呼吸困难,无咯血;支气管扩张症可见咳嗽、咯血伴大量脓痰;肺结核可见咳嗽、咯血伴低热、盗汗。

涉及考点 | 咳嗽与咳痰的问诊要点

(17~18题共用备选答案)

- | | |
|-----------|----------|
| A.咳大量脓痰 | B.干咳无痰 |
| C.咳铁锈色痰 | D.咯吐大量鲜血 |
| E.咳粉红色泡沫痰 | |

17.急性左心功能不全,常伴有

【答案】E

18.肺炎链球菌肺炎,常伴有

【答案】C

[解析]急性左心功能不全表现为突发严重呼吸困难,强迫坐位,面色灰白,发绀,大汗,烦躁,同时频繁咳嗽,咳粉红色泡沫痰。肺炎链球菌肺炎起病多急骤,高热寒战,全身肌肉酸痛,患侧胸痛,痰少,可带血或呈铁锈色。所以17题选E,18题选C。

涉及考点 | 咳嗽与咳痰的问诊要点

(19~20题共用备选答案)

- | | |
|-------|-------|
| A.深昏迷 | B.浅昏迷 |
| C.嗜睡 | D.昏睡 |
| E.谵妄 | |

19.意识大部分丧失、强刺激也不能唤醒,角膜反射存在的是

【答案】B

20.意识障碍伴错觉、幻觉、躁动不安、谵语的是

【答案】E

[解析]深昏迷表现为意识全部丧失,对疼痛等各种刺激均无反应,角膜反射消失。浅昏迷表现为意识大部分丧失,强刺激也不能唤醒,角膜反射存在。嗜睡表现为持续性睡眠,轻刺激可被唤醒,醒后能回答简单问题或做简单动作,刺激停止后迅速入睡。昏睡表现为熟睡状态,不易唤醒。谵妄表现为意识障碍伴错觉、幻觉、躁动不安、谵语。

涉及考点 | 意识障碍的临床表现

(21~22题共用备选答案)

- | | |
|---------|---------|
| A.慢性病面容 | B.二尖瓣面容 |
| C.伤寒面容 | D.甲亢面容 |
| E.苦笑面容 | |

21.消瘦,两眼球突出,兴奋不安,呈惊恐貌,多见于

【答案】D

22.两颧紫红,口唇发绀,多见于

【答案】B

[解析]苦笑面容见于破伤风;伤寒面容表情淡漠,反应迟钝,呈无欲状态,见于肠伤寒、脑脊髓膜炎、脑炎等高热衰竭患者;慢性病面容面容憔悴,面色晦暗或苍白无华,目光暗淡,见于慢性消耗性疾病,如恶性肿瘤、肝硬化、严重结核病等。

涉及考点 | 异常面容的特点

(23~24题共用备选答案)

- | | |
|----------|------------|
| A.颈部淋巴结 | B.右锁骨上窝淋巴结 |
| C.腋下淋巴结 | D.左锁骨上窝淋巴结 |
| E.腹股沟淋巴结 | |

23.胃癌出现淋巴结转移常见的部位是

【答案】D

24.肺癌出现淋巴结转移常见的部位是

【答案】B

【解析】胃癌常见左锁骨上窝淋巴结转移；肺癌常见右锁骨上窝淋巴结转移；肠癌、卵巢癌可见腹股沟淋巴结转移；头颈部肿瘤可见颈部淋巴结转移；乳腺癌可见腋下淋巴结转移。

涉及考点 | 局部和全身浅表淋巴结肿大

25.主动脉瓣关闭不全，多表现为

- | | |
|--------|---------|
| A.奇脉 | B.颈静脉搏动 |
| C.交替脉 | D.水冲脉 |
| E.脉搏短绌 | |

【答案】D

【解析】奇脉是指吸气时脉搏明显减弱或消失，系左心室搏血量减少所致，见于心脏压塞或心包缩窄。缩窄性心包炎一般心律正常，脉搏细速，有奇脉。颈静脉搏动可见于三尖瓣关闭不全等。交替脉是节律规则而强弱交替的脉搏，必要时嘱患者在呼气中期屏住呼吸，以排除呼吸变化所影响的可能性。常见于高血压性心脏病、急性心肌梗死和主动脉瓣关闭不全等。水冲脉表现为脉搏骤起骤落，犹如潮水涨落，是由于周围血管扩张或存在分流、反流所致。前者常见于甲状腺功能亢进、严重贫血、脚气病等，后者常见于主动脉瓣关闭不全、先天性心脏病动脉导管未闭、动静脉瘘等。主动脉瓣关闭不全时由于出现舒张压下降，脉压加大可出现水冲脉。脉搏短绌见于房颤。

涉及考点 | 血管检查

- C.左心衰竭
E.全心衰竭

【答案】B

【解析】心尖区可闻及舒张期杂音为二尖瓣狭窄的特征。颈静脉怒张、肝肋下2cm为体循环淤血、右心衰竭的表现。同时还有因体循环淤血导致的胃肠道功能紊乱。选项A、D无心脏杂音表现；选项C为肺循环淤血，表现应为端坐呼吸、咳嗽咳痰、粉红色泡沫痰、胸闷心慌、呼吸困难等。

涉及考点 | 慢性心力衰竭的临床表现

66.患者，女，32岁。近两年来间断发生尿路刺激症状，不发热，尿液检查可见白细胞与颗粒管型。应首先考虑的是

- | | |
|----------|----------|
| A.急性肾炎 | B.慢性肾炎 |
| C.慢性肾盂肾炎 | D.急性肾盂肾炎 |
| E.急性膀胱炎 | |

【答案】C

【解析】肾盂肾炎常见于女性，致病菌可经短而直的尿道口逆行感染，临床表现为尿路刺激征，尿检见炎症细胞与颗粒管型。

涉及考点 | 尿路感染的诊断

(67~68题共用备选答案)

- | | |
|-----------|-----------|
| A.瞳孔扩大 | B.瞳孔缩小 |
| C.瞳孔呈白色 | D.两瞳孔大小不等 |
| E.瞳孔形状不规则 | |

67.有机磷农药中毒的瞳孔变化是

【答案】B

涉及考点 | 急性有机磷杀虫药中毒

68.阿托品中毒的瞳孔变化是

【答案】A

【解析】病理情况下，瞳孔缩小，见于虹膜炎症、中毒（有机磷类农药）、药物反应（毛果芸香碱、吗啡、氯丙嗪）等。瞳孔扩大见于外伤、颈交感神经刺激、青光眼绝对期、视神经萎缩、药物影响（阿托品、可卡因）等。双侧瞳孔大小不等：常提示有颅内病变，如脑外伤、脑肿瘤、中枢神经系统梅毒、脑疝等。

涉及考点 | 阿托品和有机磷农药中毒

2年 易错考题

1.患者，男，25岁。发作性干咳3个月，伴有夜间胸闷，无发热、咯血，查体双肺未闻及干湿啰音。为明确诊断应首选的检查是

- | | |
|--------|--------|
| A.胃镜 | B.X线胸片 |
| C.肺功能 | D.心电图 |
| E.心脏彩超 | |

【答案】B

【解析】原发性肺癌常以阵发性刺激性干咳为首发症状，其预后取决于能否做到“三早”，即早发现、早诊断、早治疗。影像学、细胞学和病理学检查是诊断肺癌的重要方法。其中X线胸片为常规检查方法。

涉及考点 || 原发性支气管肺癌的实验室检查及其他检查

2.患者，男，55岁。慢性支气管炎病史5年，近2~3个月咳嗽加重，痰中持续带血，伴胸闷、气急、胸线检查见肺门阴影增大。应首先考虑的是

- A.肺炎
- B.原发性支气管肺癌
- C.肺脓肿
- D.肺结核
- E.慢性支气管炎

【答案】B

【解析】该患者中老年男性，有慢性支气管炎病史，近期有咳嗽、痰中带血，并有胸闷、气急、胸痛等，X线见肺门阴影增大，考虑原发性支气管肺癌可能性大。选项A为肺纹理增粗、紊乱；选项C、D、E应有发热。

涉及考点 || 原发性支气管肺癌的诊断

3.患者，男，59岁。近1个月来，因上腹部不适，食欲减退，体重减轻而疑诊为胃癌。为确诊，首选的检查方法是

- A.癌胚抗原测定
- B.大便隐血试验
- C.X线钡餐检查
- D.胃液分析
- E.胃镜检查

【答案】E

【解析】胃癌不一定见癌胚抗原测定、胃液分析、大便隐血试验、X线钡餐异常，胃镜为诊断早期胃癌的特异性检查。

涉及考点 || 胃癌的实验室检查及其他检查

4.各类原因引起的休克的共同点是

- A.血压下降
- B.有效循环血量的急剧减少
- C.皮肤苍白
- D.四肢湿冷
- E.脉搏加速

【答案】B

【解析】休克是机体遭受强烈的致病因素侵袭后，由于有效循环血量锐减，组织和重要器官血液灌注不足，导致身体内细胞受损、代谢紊乱、器官功能障碍的一种病理状态。

涉及考点 || 休克的临床表现

5.我国肝硬化最主要的病因是

- A.病毒性肝炎
- B.营养不良
- C.慢性酒精中毒
- D.性心力衰竭
- E.慢性细菌性痢疾

【答案】A

【解析】肝硬化的病因：①病毒性肝炎，在我国最为常见，慢性乙型、慢性丙型肝炎均可发展成肝硬化，乙肝合并丙肝则可加速肝硬化的进程。②慢性酒精中毒，主要发生在欧美国家。③非酒精性脂肪性肝炎。④化学药物或毒物。⑤长期胆汁淤积。⑥遗传和代谢性疾病⑦肝淤血，主要由慢性充血。⑧免疫紊乱。

涉及考点 | 肝硬化的病因病机

6.患者,男,60岁。高血压病史15年,突发剧烈头痛,眩晕,恶心,呕吐,失语。查体:无肢体活动障碍,血压200/120 mmHg,神经反射正常。应首先考虑的是

- A.急进型高血压
- B.缓进型高血压
- C.高血压脑病
- D.高血压性脑出血
- E.高血压性心脏病

【答案】C

【解析】患者发病时血压力200/120 mmHg,结合发作时眩晕、失语的表现,可诊断为高血压脑病。肢体活动无障碍,神经反射正常,排除选项D;无心脏损伤的直接证据,排除选项E。

涉及考点 | 原发性高血压的并发症

7.患者,男,65岁。慢性支气管炎及高血压病史10年,近半年活动后自觉气短。检查:血压160/95 mmHg,心脏听诊未闻及器质性杂音,两肺听诊无异常,心电图及X线显示左心室增大,应首先考虑的是

- A.冠心病
- B.高血压性心脏病
- C.风心病
- D.肺心病
- E.病毒性心肌炎

【答案】B

【解析】患者有长期高血压病史,左心室增大,为长期后负荷增加所致。本患者亦有长期慢性支气管炎史,但肺心病常导致右心室肥大、右心衰,排除D;A、C、E与本题关系不大。

涉及考点 | 原发性高血压的并发症

8.患者,男,50岁。高血压病史10年,今日剧烈头痛,眩晕,恶心,呕吐。查体:无肢体活动障碍,血压200/120 mmHg。为快速降压,应选择下列哪种药物治疗

- A.硝普钠
- B.心得安
- C.硝苯吡啶
- D.降压灵
- E.复方降压片

【答案】A

【解析】患者长期高血压病史,此次发病时血压200/120 mmHg,结合发作时临床表现,可诊断为高血压危重症。此时为快速降压首选能直接扩张动静脉的硝普钠,降压迅速、效果显著。

涉及考点 | 原发性高血压的治疗

9.患者,男,40岁。十二指肠溃疡病史15年,近2个月来自感头痛、眩晕而就诊。检查:血压160/100 mmHg,诊断为高血压,下列降压药应慎用的是

- A.利血平
- B.硝苯地平
- C.氢氯噻嗪
- D.肼苯哒嗪
- E.卡托普利

【答案】A

【解析】利血平为一种吲哚型生物碱,根据其药理学特性,有精神抑郁性疾病或病史者、有溃疡病史者、急性局限性肠炎、溃疡性结肠炎、帕金森综合征者禁用。

涉及考点 | 原发性高血压的治疗

10.下列各项,不属于慢性肾炎基本的表现是

- A.蛋白尿
- B.血尿
- C.高血压
- D.水肿
- E.管型尿

【答案】E

【解析】慢性肾炎表现为血尿、蛋白尿、高血压、水肿、肾功能不全。具体情况如下：①血尿：以阶段性肉眼血尿，持续性镜下血尿为主要特点，相差镜检畸形红细胞比例较高。②蛋白尿：以球性蛋白尿为主，可见中大分子蛋白尿。重者表现为明显水肿，合并肾功能不全、感染等并发症，称为肾病综合征。③水肿：以面部水肿为主的肾炎性水肿，也可以下肢至全身的肾病性水肿为主。④肾性高血压。⑤肾功能不全：病程迁延，最终导致尿毒症。

涉及考点 | 慢性肾炎的临床表现

(11~12题共用题干)

患者，女，45岁。确诊为2型糖尿病。平时口服二甲双胍治疗，空腹血糖6.8 mmol/L左右，昨日下午运动后出现上腹部隐痛，无腹泻，伴有乏力、发热，腋测法体温38.0℃，自行服用百服宁1片。今晨出现右下腹部疼痛，并逐渐加重，伴有口干，多饮。查体：急性病容，肺部未闻及啰音，右下腹部压痛及反跳痛(+)，伴腹肌紧张，肠鸣音正常。血常规：白细胞 $13\times10^9/L$ ，血糖19.3 mmol/L，血酮体(-)，血pH值7.36。

11.该患者目前血糖明显升高的原因是

- A.降糖药物用量不足
- B.饮食不当
- C.体温升高
- D.合并感染
- E.服用百服宁

【答案】D

涉及考点 | 糖尿病并发症常见的诱因

12.该患者目前应联合使用的降糖药物是

- A.格列吉特
- B.阿卡波糖
- C.毗格列酮
- D.瑞格列奈
- E.短效胰岛素

【答案】E

【解析】胰岛素治疗各种严重的糖尿病急性或慢性并发症。

涉及考点 | 口服降糖药物治疗

13.患者，女，40岁。3年前发现患有风湿性心脏病，近半年体力活动明显受限，轻度活动即出现心悸，气短。其心功能为

- A.Ⅰ级
- B.Ⅱ级
- C.Ⅲ级
- D.Ⅳ级
- E.以上均非

【答案】C

【解析】心功能分级：
I级：患者患有心脏病但活动不受限制，平时一般活动不引起疲乏、心悸、呼吸困难或心绞痛。
II级：心脏病患者的体力活动受到轻度的限制，休息时无自觉症状，但平时一般活动下可出现疲乏、心悸、呼吸困难或心绞痛。
III级：心脏病患者体力活动明显受限，小于平时一般活动即可引起上述的症状。
IV级：心脏病患者不能从事任何体力活动，休息状态下也出现心衰的症状，体力活动后加重。

涉及考点 | 心功能分级

14.患者,男,45岁。近日发现大便色黑,伴不规则上腹痛。检查:左锁骨上窝触及1个1cm×1.2cm大小的淋巴结,质硬,大便隐血试验(++)。首先考虑的是

- A.消化性溃疡病
- B.胆道感染合并出血
- C.胃癌
- D.血小板减少性紫癜
- E.肝硬化

【答案】C

【解析】患者大便色黑、大便隐血试验(++)，为量较多的上消化道出血，同时伴有不规则上腹痛，左锁骨上窝触及肿大的淋巴结，胃癌常见的淋巴结转移就是左锁骨上淋巴结。

涉及考点 | 胃癌的诊断

15.患者,女,30岁。有风湿性关节炎病史。检查:心尖部可听到4级收缩期杂音,X线显示左心房、左心室增大。应首先考虑的心瓣膜病变是

- A.二尖瓣关闭不全
- B.二尖瓣狭窄
- C.主动脉瓣关闭不全
- D.主动脉瓣狭窄
- E.肺动脉瓣狭窄

【答案】A

【解析】心尖部可听到4级收缩期杂音，为左心室收缩时血液通过二尖瓣反流至左心房，故左心房增大。长期反流将导致左心室有效泵出量不够而发生左心室代偿性肥大，所以本题考虑为风心病导致二尖瓣关闭不全。

涉及考点 | 二尖瓣关闭不全的诊断

(16~17题共用备选答案)

- A.急性粒细胞白血病
- B.急性淋巴细胞白血病
- C.慢性粒细胞白血病
- D.慢性淋巴细胞白血病
- E.慢性再生障碍性贫血

16.VP方案常用于治疗

【答案】B

17.HOAP方案常用于治疗

【答案】A

【解析】VP方案即长春新碱+泼尼松，主要用于急性淋巴细胞性白血病的诱导化疗。HOAP方案包括三尖杉酯碱、阿霉素及泼尼松，主要用于急性粒细胞白血病的化疗。慢性粒细胞白血病常用治疗药物是马利兰、靛玉红等；慢性淋巴细胞白血病常用瘤可宁治疗；慢性再障常用雄激素等治疗。

涉及考点 | 急性白血病的治疗

18.患者,男,42岁。既往脾大,HBsAg阳性。今晨排柏油样便约200mL。应首先考虑的是

- A.急性糜烂性胃炎
- B.消化性溃疡
- C.肝硬化
- D.白血病
- E.胃癌

【答案】C

【解析】患者有乙肝病史，且已出现肝硬化门脉高压的临床表现——脾大。柏油样便应考虑食管-胃底侧支循环内压力过高破裂出血的结果。A、B 胃肠道出血量少，很少出现柏油样

便；D 可有脾大，但无上述其他症状；E 不会出现脾大，且与乙肝无关。

涉及考点 | 肝硬化的诊断

19. 患者巨大脾脏，白细胞计数显著增高，可达 $500 \times 10^9/L$ ，并见少许各种幼稚粒细胞，血小板计数极度增多。治疗应首选

- A. VP 方案
- B. HOAP 方案
- C. 雄性激素
- D. 马利兰
- E. 强的松

【答案】D

【解析】从病例描述可知该患者为慢性粒细胞性白血病，治疗可采用 HOAP 方案及马利兰，但本例中患者血小板计数极度增多，马利兰尤其可用于血小板极度增多的病例。

涉及考点 | 急性白血病的治疗

20. 患者，男，45 岁。因突然呕血入院。10 年前患乙肝，因肝功能损害曾多次住院治疗。近感腹胀，乏力。查体：脾肿大，腹水，应首先考虑的是

- A. 肺结核慢性空洞咯血
- B. 胃溃疡出血
- C. 急性支气管炎出血
- D. 十二指肠溃疡出血
- E. 肝硬化，食管下端静脉丛破裂出血

【答案】E

【解析】该患者为中老年男性，曾有肝脏疾病，近期呕血、腹胀、乏力、脾大、腹水，考虑肝硬化并发上消化道出血可能性大。选项 A、B、C、D 无腹水体征。

涉及考点 | 肝硬化的并发症

21. 与 Graves 病无关的因素是

- A. 体液免疫
- B. 遗传因素
- C. 细胞免疫
- D. 高功能性甲状腺腺瘤
- E. 慢性淋巴细胞甲状腺炎

【答案】E

【解析】Graves 病也就是弥漫性甲状腺肿伴甲亢，是器官特异性自身免疫反应性疾病。Graves 病的典型表现是高代谢症候群、甲状腺肿大和突眼，发病原因包括：①遗传，Graves 病具有遗传易感性，家族中常合并有其他自身免疫反应性甲状腺疾病。②免疫反应，Graves 病可在某些细菌感染的情况下发生免疫反应，出现促甲状腺激素受体抗体，也就是 TRAb 阳性，刺激甲状腺滤泡细胞增生、肥大，分泌甲状腺激素增多。③雌激素，Graves 病患者以女性多见，尤其是育龄期女性，其发病原因可能与雌激素水平增高有关。④精神创伤，严重应急，精神过度兴奋、抑郁均可导致甲状腺激素分泌异常，可能会诱发 Graves 病。

涉及考点 | 弥漫性甲状腺肿伴甲亢的病因

22. 患者，男，42 岁。乙肝病史 10 年，近 2 个月右上腹压痛加重。检查：面部有蜘蛛痣，右上腹压痛，肝肋缘下 3 cm，质硬，ALT 40 U，HBsAg(+)，AFP 500 μg/L。应首先考虑的是

- A. 慢性乙肝活动期
- B. 乙肝合并肝硬化
- C. 乙肝合并胆囊炎
- D. 原发性肝癌
- E. 继发性肝癌

【答案】D

【解析】患者有 10 年乙肝病史，且 HBsAg(+)；体检发现蜘蛛痣、右上腹压痛、肝大、质硬，

为肝硬化表现;查 AFP 升高,故首先考虑为乙肝-肝硬化-原发性肝癌这三阶梯,目前已达第三阶段。排除选项 A、B。HBV 是我国原发性肝癌的重要致病因素之一。需要指出的是,AFP 诊断肝细胞癌的标准应为:AFP>500 μg/L,持续 4 周,或>200 μg/L 持续 8 周。选项 C、E 与该病例无关。

涉及考点 | 原发性肝癌的诊断

23.患者,女,26岁,已婚。突发尿痛、尿频、尿急,腹痛半天。检查:肾区无叩痛,尿中白细胞(++),菌培养为大肠埃希菌。其诊断是

- A.急性肾盂肾炎
- B.肾结核
- C.急性膀胱炎
- D.肾结石
- E.慢性肾炎

【答案】C

【解析】急性膀胱炎发病急骤,常在过于劳累、受凉、长时间憋尿、性生活后发病,病程一般持续 1~2 周自行消退或治疗后消退。其特点是发病“急”、炎症反应“重”、病变部位“浅”。常见的症状有尿频、尿急、尿痛、脓尿和终末血尿,甚至全程肉眼血尿。患者肾区无叩击痛,排除选项 A、B、D、E;尿中白细胞(++),菌培养为大肠埃希菌,排除选项 B、E;急性起病,排除选项 B、D、E。

涉及考点 | 尿路感染的诊断

24.患者,女,30岁。尿频、尿痛 2 天。检查:体温 38 ℃,右肾区叩击痛,尿蛋白(±),尿中红细胞 2~4/HP,白细胞 20~30/HP。应首先考虑的是

- A.急性膀胱炎
- B.急性肾炎
- C.急性肾盂肾炎
- D.尿道综合征
- E.右肾结石

【答案】C

【解析】选项 A 无肾区叩击痛。选项 B 临幊上表现为急性起病,以血尿、蛋白尿、水肿、高血压和肾小球滤过率下降为特点的肾小球疾病。选项 D 反复发作尿频、尿急、尿痛、排尿困难等症幊,而尿常规化验正常,中段尿培养无细菌生长,其发病快、消失也快,呈周期性发作,发作周期不定。选项 E 为突然发作的阵发性刀割样疼痛,疼痛剧烈难忍,有时有大汗、恶心呕吐。可有肉眼血尿,结石并发感染时,尿中出现脓细胞,有尿频、尿痛症幊。

涉及考点 | 尿路感染的诊断

25.抑制尿酸合成的药物是

- A.别嘌呤醇
- B.苯溴马龙
- C.秋水仙碱
- D.吲哚美辛
- E.泼尼松

【答案】A

【解析】别嘌呤醇主要通过抑制黄嘌呤氧化酶,使尿酸的生成减少,从而降低尿酸浓度,适用于尿酸生成过多或不适合使用排尿酸药物者。

涉及考点 | 抑制尿酸的药物

26.不属于贫血常见的体征是

- A.皮肤黏膜苍白
- B.心率增快
- C.心尖部收缩期杂音
- D.匙状指

E.出血倾向

【答案】E

【解析】贫血主要指的是血红蛋白低于正常范围下限的一种常见的临床症状。贫血的症状主要和贫血发生的速度,以及呼吸、循环等系统的代偿能力和耐受能力有关系。临幊上常见的症状有头晕、头痛、失眠、多梦、全身乏力等症状。有时可以发现皮肤粘膜明显的苍白,主要表现在甲床、眼睑等部位。另外还有心悸、心率加快,特别是活动后明显,休息后症状可以稍微减轻。有时可以影响到消化系统引起消化不良,出现腹胀、食欲减退等症状。

涉及考点 | 贫血的体征

(27~29题共用题干)

患者,男,35岁。确诊甲状腺功能亢进症2年余,按医嘱服用抗甲状腺药物治疗,病情缓解,后来因自觉症状缓解自行停用抗甲状腺药物,随后出现心悸、气短、多汗,恶心等症状。查体见双侧眼球外凸明显,巩膜无黄染,甲状腺弥漫性Ⅱ度肿大,心率120次/分。实验室检查:FT3、FT4中度升高,TSH明显降低,血WBC $2.9 \times 10^9/L$ 。

27.该患者血WBC明显降低应首先考虑的病因是

- A.再生障碍性贫血 B.急性白血病
C.甲状腺毒证表现 D.抗甲状腺药的不良反应
E.营养不良

【答案】D

【解析】治疗期每4周复查一次血清甲状腺激素水平,维持期每2个月复查一次血清甲状腺激素。不良反应有粒细胞减少、药疹和中毒性肝病。

涉及考点 | 甲状腺功能亢进的治疗

28.该患者目前最适宜的治疗是

- A.抗甲状腺药物治疗 B.复方碘溶液
C.甲状腺手术治疗 D.糖皮质激素
E.放射性¹³¹I

【答案】E

【解析】放射性¹³¹I治疗,安全简便,临床治愈率高,复发率低。适应证:成人GD伴甲状腺肿大Ⅱ度以上;②ATD治疗失败或过敏;③甲亢手术后复发;④甲状腺毒症心脏病或甲亢伴其他病因的心脏病;⑤甲亢合并白细胞和(或)血小板减少或全血细胞减少;⑥甲亢合并肝、肾等脏器损害;⑦拒绝手术治疗或有手术禁忌证者;⑧浸润性突眼者。

涉及考点 | 甲状腺功能亢进的治疗

29.该患者目前重要的对症治疗是

- A.加强支持治疗 B.预防感染
C.应用β受体阻滞剂 D.应用镇静剂
E.输血治疗

【答案】C

【解析】β受体阻滞剂适用于各类甲亢,但主要在药物治疗的初治期使用,可控制心动过速等临床症状。也用于甲状腺危象、¹³¹I治疗前后及手术前准备。

涉及考点 | 甲状腺功能亢进的治疗

【解析】切断传播途径是控制细菌性疾病的重要措施。从事餐饮、维修、水务等工作的人员，需要长期跟踪，必要时临时离职。注意饮水、粪便和饮食，排除苍蝇，养成饭前和大便后洗手的习惯。

涉及考点 | 细菌性痢疾的预防

2年 易错考题

1. 潜伏期是指

- A. 自病原体侵入机体至典型症状出现
- B. 自病原体侵入机体至排出体外
- C. 自病原体侵入机体至临床症状开始出现
- D. 自接触传染源至患者开始出现症状
- E. 自接触传染源至典型症状出现

【答案】C

【解析】指从病原体侵入机体至出现临床症状前的一段时间。各种传染病的潜伏期不同，数小时、数天、数月甚至数年不等。

涉及考点 | 潜伏期的概念

2. 下列关于慢性重型肝炎临床表现的叙述，不正确的是

- A. 蜘蛛痣
- B. 颅内出血
- C. 腹水
- D. 脾脏肿大
- E. 肝掌

【答案】B

【解析】慢性重型肝炎有明显或持续的肝炎症状，伴肝病面容、肝掌、蜘蛛痣、脾大，ALT 和(或)AST 反复或持续升高，白蛋白降低、丙种球蛋白明显升高。

涉及考点 | 病毒性肝炎的临床表现

3. HIV 中要侵犯的靶细胞是

- A. CD38 细胞
- B. CD4 细胞
- C. CD8 细胞
- D. CD3 细胞
- E. CD27 细胞

【答案】B

【解析】HIV 主要侵犯人体免疫系统，包括 CD4 细胞、巨噬细胞和树突状细胞，主要表现为 CD4 淋巴细胞数量不断减少，导致免疫功能缺陷。

涉及考点 | 艾滋病的发病机制

4. 下列各项，艾滋病早期诊断的临床表现中不包含

- A. 腹泻
- B. 体重减轻
- C. 盗汗
- D. 便血
- E. 发热

【答案】D

【解析】艾滋病临床表现以发热最为常见，可伴盗汗、腹泻和体重减轻，无便血。

涉及考点 | 艾滋病的临床表现

5. 艾滋病可出现持续全身淋巴结肿大的时期是

- A. 任何病期
- B. 艾滋病期

- C. 无症状感染期
- D. 恢复期
- E. 急性 HIV 感染期

【答案】B

【解析】艾滋病期临床表现为持续 1 个月以上的发热、盗汗、腹泻、体重减轻 10% 以上，部分患者表现精神症状，还可出现持续性全身淋巴结肿大。

涉及考点 | 艾滋病的临床表现

- 6. 可经母婴途径传播的疾病是
- A. 伤寒
- B. 艾滋病
- C. 霍乱
- D. 流行性脑脊髓膜炎
- E. 细菌性痢疾

【答案】B

【解析】细菌性痢疾主要通过“粪-口”传播，传播途径包括：接触传播、食物媒介传播、水媒传播、蝇媒传播；流行性脑脊髓膜炎主要传播途径为病原菌借咳嗽、喷嚏、说话等飞沫直接从空气中传播；霍乱、伤寒主要传播途径是通过水、食物、日常生活接触和苍蝇传播；艾滋病传播方式主要有性触摸传播，血液传播，母婴传播。

涉及考点 | 细菌性痢疾、流行性脑脊髓膜炎、霍乱、艾滋病、伤寒的传播途径

- 7. 乙型脑炎(简称乙脑)的主要传染源是
- A. 蚊虫
- B. 乙脑病毒携带者
- C. 乙脑患者
- D. 猪
- E. 野鼠

【答案】D

【解析】流行性乙型脑炎主要分布在亚洲远东和东南亚地区，经蚊传播，多见于夏秋季，临上急起发病，有高热、意识障碍、惊厥、强直性痉挛和脑膜刺激征等，重型患者病后往往留有后遗症。猪是本病主要传染源，蚊虫叮咬是主要传播途径。野鼠是流行性出血热的传染源。

涉及考点 | 流行性乙型脑炎的流行病学

- 8. 中毒型菌痢区别于流行性乙型脑炎最主要的是
- A. 起病急
- B. 粪便镜检可见大量脓、白细胞
- C. 10 岁以下儿童发病率高
- D. 高热、抽搐、昏迷
- E. 多见于春、夏季

【答案】B

【解析】乙脑与中毒型菌痢均多见于夏、秋季，且 10 岁以下儿童发病率较高。中毒型菌痢起病较乙脑更急，常于发病 24 h 内出现高热、抽搐、昏迷等，一般无脑膜刺激征，脑脊液多正常，粪便镜检可见大量脓、白细胞，中毒型菌痢与流行性乙型脑炎最主要区别为粪便镜检可见大量脓、白细胞。

涉及考点 | 流行性乙型脑炎的鉴别诊断

- 9. 流行性脑脊髓膜炎的病原菌是
- A. 抗酸杆菌
- B. 革兰阴性杆菌
- C. 革兰阴性弧菌
- D. 革兰阳性球菌
- E. 革兰阴性球菌

【答案】E

【解析】流行性脑脊髓膜炎是由脑膜炎双球菌引起的化脓性脑膜炎。病原学为脑膜炎双球菌，属奈瑟菌属，革兰染色阴性。临床表现为发热，头痛，呕吐，皮肤黏膜淤点、淤斑及颈项强直等脑膜刺激征。

涉及考点 | 流行性脑脊髓膜炎的病原学

10. 流行性脑脊髓膜炎常见的皮疹是
- A. 单纯疱疹
 - B. 玫瑰色斑丘疹
 - C. 坏疽
 - D. 脓疱疹
 - E. 淤点、淤斑

【答案】E

【解析】流行性脑脊髓膜炎败血症期出现皮肤黏膜淤点、淤斑，初呈鲜红色，迅速增多，扩大。

涉及考点 | 流行性脑脊髓膜炎的临床表现

11. 下列各项，不支持流行性脑脊髓膜炎诊断的脑脊液检查是
- A. 氯化物含量减少
 - B. 蛋白质含量高
 - C. 糖含量明显减少
 - D. 细胞数 $<0.5\times10^9/L$ ，以单个核细胞为主
 - E. 外观混浊呈脓性

【答案】D

【解析】蛋白质含量增高，糖及氯化物含量均减少，排除 A、B、C。脑脊液检查是流脑明确诊断的重要依据。发病过程中，脑脊液压力升高，外观浑浊呈脓性，排除 E。白细胞计数常高达 $20\times10^9/L$ ，以中性粒细胞为主。

涉及考点 | 流行性脑脊髓膜炎的实验室检查

12. 下列关于人感染高致病性禽流感的叙述，不正确的是
- A. 传染源主要为病禽
 - B. 暴发流行多在秋季
 - C. 夏季发病少
 - D. 人类普遍缺乏免疫力
 - E. 传播途径主要经呼吸道

【答案】B

【解析】禽流感一年四季均可发生，冬、春季节多暴发流行，夏季发病较少，多呈散发，症状也较轻。

涉及考点 | 高致病性禽流感流行学

13. 伤寒的主要病变部位在
- A. 乙状结肠
 - B. 小肠上段
 - C. 直肠
 - D. 小肠下段
 - E. 十二指肠

【答案】D

【解析】伤寒的主要病理特征是全身网状内皮系统的增生反应，以回肠（小肠分为空肠与回肠，空肠位于小肠上半段，回肠位于小肠下半段）下段淋巴组织的病变最为显著。

涉及考点 | 伤寒的病理

14. 伤寒最严重的并发症是
- A. 急性胆囊炎
 - B. 中毒性心肌炎
 - C. 肠出血
 - D. 中毒性肝炎

E. 肠穿孔

【答案】E

【解析】肠穿孔是伤寒最严重的并发症，多见于病程第2~3周。多发生于回肠末端，表现为右下腹剧痛，伴有恶心、呕吐、冷汗、呼吸急促、体温与血压下降，经1~2小时腹痛及其他症状暂时缓解，不久体温又迅速上升并出现腹膜炎征象，表现为腹胀、腹痛、腹壁紧张，压痛和反跳痛，肠鸣音减弱，白细胞计数增高伴核左移。

涉及考点 | 伤寒的临床表现

15. 肠穿孔是伤寒最严重的并发症，多发于

A. 空肠末端

B. 直肠末端

C. 回肠末端

D. 横结肠末端

E. 乙状结肠末端

【答案】C

【解析】肠穿孔为伤寒最严重并发症，常发生于病程第2~3周，穿孔部位多发生在回肠末端，成人比小儿多见。

涉及考点 | 伤寒的临床表现

16. 伤寒最具诊断价值的是

A. 肥达反应阴性

B. 白细胞计数减少或正常

C. 仅有“H”抗体效价增高，而“O”抗体效价不高于“H”抗体效价的升高

E. “O”效价≥1:80，“H”效价≥1:160

【答案】E

【解析】肥达试验阳性有辅助诊断意义；“O”效价≥1:80，“H”效价≥1:160，或“O”抗体效价有4倍以上的升高，才有辅助诊断意义；“O”抗体升高只能支持沙门菌感染，不能区分伤寒或副伤寒；单独出现“H”抗体升高，对伤寒的诊断帮助不大；白细胞计数不可诊断伤寒。

涉及考点 | 伤寒的诊断

17. 细菌性痢疾慢性期X线钡灌肠可见的肠道变

A. 肠道动力增强

B. 肠道痉挛，结肠袋出现

C. 肠道痉挛，结肠袋消失

D. 肠黏膜变薄

E. 肠腔增宽

【答案】C

【解析】慢性菌痢X线钡剂可见肠道痉挛，动力改变，结肠袋消失，肠腔狭窄，肠黏膜增厚，肠动力减弱。

涉及考点 | 细菌性痢疾的临床表现

18. 根据禽流感病毒的致病性，禽流感病毒可分为

A. 高致病性、中致病性、低致病性

B. 高致病性、中致病性、低致病性、非致病性

C. 高致病性、低致病性、非致病性

D. 高致病性、低致病性、

E. 有致病性、无致病性

【答案】C

【解析】根据禽流感病毒的致病性，禽流感病毒可分为高致病性、低致病性、非致病性三大类。

涉及考点 | 禽流感病毒的分型

19.霍乱重型患者补液量为

- | | |
|--------------------|---------------------|
| A.>15 000 mL/d | B.8 000~12 000 mL/d |
| C.4 000~8 000 mL/d | D.3 000~4 000 mL/d |
| E.<3 000 mL/d | |

【答案】B

【解析】补液量应根据失水程度决定,轻型脱水者3 000~4 000 mL/d,中型脱水者4 000~8 000 mL/d,重型脱水者8 000~12 000 mL/d。

涉及考点 | 霍乱的治疗

20.下列关于流行型乙型脑炎临床分型的叙述,正确的是

- | | |
|--------------|-----------------|
| A.不典型、典型、暴发型 | B.轻型、普通型、危重型 |
| C.轻型、中型、重型 | D.轻型、普通型、重型、极重型 |
| E.不典型、典型、重型 | |

【答案】D

【解析】流行性乙型脑炎临床分型:轻型、普通型、重型、极重型,流行期间以轻型和普通型患者多见。

涉及考点 | 流行性乙型脑炎的临床表现

(21~22题共用备选答案)

- | | |
|--------|--------|
| A.出血性炎 | B.增生性炎 |
| C.化脓性炎 | D.变质性炎 |
| E.假膜性炎 | |

21.流行性脑脊髓膜炎,病理变化为

【答案】C

22.流行性乙型脑炎,其病理变化为

【答案】D

【解析】选项A是渗出性炎症的一个类型,因炎症灶的血管损伤严重,致使渗出物中含大量红细胞,常见于流行性出血热、钩端螺旋体病和鼠疫等易发生于黏膜、浆膜和肺组织。发生于黏膜者渗出的纤维蛋白原形成的纤维素、坏死组织和嗜中性粒细胞共同形成假膜,又称假膜性炎,见于白喉。选项B的病变特点:①浸润的细胞主要是淋巴细胞、浆细胞和单核细胞。②局部组织破坏主要是由炎细胞引起。③常有较明显的结缔组织、血管和上皮细胞、腺体等实质细胞的增生,在黏膜可形成息肉,在肺常形成炎性假瘤,在管道性脏器可引起狭窄和梗阻。选项C为流行性脑脊髓膜炎的病理变化。选项D为流行性乙型脑炎的病理改变。所以21题选C,22题选D。

涉及考点 | 流行性乙型脑炎、流行性脑脊髓膜炎的病理

23.感染HIV后,临床无明显症状,但血中可检出病毒及抗体,此期的持续时间一般是

- | | |
|----------|--------|
| A.12~15年 | B.6~8年 |
| C.4~5年 | D.1~2年 |
| E.3~4年 | |

【答案】B

【解析】艾滋病无症状感染期:所有的HIV感染者均有这一期。此期病毒处于低水平复制状态,患者无任何临床症状,但血清中可检出病毒及抗体,有传染性,可持续2~10年或更久。

涉及考点 | 艾滋病无症状感染期

24.肺结核患者的哪种标本传染性最强

- A.痰液
- B.血液
- C.尿液
- D.汗液
- E.泪液

【答案】A

【解析】肺结核患者，即常说的痰菌阳性的肺结核。它主要是经过飞沫传播的，即痰菌阳性的肺结核患者在说话、咳嗽、打喷嚏的时候，其空气飞沫中会含有大量的结核杆菌，被正常人群所吸入导致的感染。

涉及考点 | 肺结核的传播途径

25.下列有关狂犬病毒的叙述，正确的是

- A.属弹状病毒科
- B.DNA 病毒
- C.野毒株毒力弱
- D.固定株毒力强
- E.60 ℃ 10 分钟可灭活

【答案】A

【解析】狂犬病毒属于弹状病毒科、狂犬病毒属，外形呈弹状，呈螺旋对称，表面具有包膜。

涉及考点 | 狂犬病的病原学

【答案】E

【解析】医学辅助检查是运用现代物理化学方法、手段进行医学诊断的一门学科,主要研究如何通过实验室技术、医疗仪器设备为临床诊断、治疗提供依据。但所有的方法都有其适用范围,并非是诊断所必需的主要的依赖条件,对疾病的诊断还是需要结合疾病的特点。

涉及考点 | 辅助检查的道德要求

2年 易错考题

1. 对无伤原则的解释,正确的是

- A. 对肿瘤患者进行化疗意味着绝对伤害
- B. 无伤原则就是要求医生对患者丝毫不能伤害
- C. 无伤原则要求对医学行为进行受益与伤害的权衡,把可控伤害控制在最低限度之内
- D. 因绝大多数医疗行为都存在着不同程度的伤害,所以无伤原则是做不到的
- E. 无伤原则就是消除任何医疗伤害

【答案】C

【解析】无伤原则是指在医疗活动中,应该避免对患者的任何身心伤害。从严格意义上讲,无伤害是相对而言的,医疗过程也是一把双刃剑,几乎所有的诊疗措施或治疗手段都有两面性,都难以避免对患者的身心造成不同程度的损伤。这里所说的无伤是医务人员面对患者的治疗要时刻谨记的是考虑以最小的损伤为代价去获取最好的治疗效果。

涉及考点 | 无伤原则

2. 生命价值论指的是

- | | |
|----------------|------------------|
| A. 生命神圣与人道论的统一 | B. 生命神圣与生命质量的统一 |
| C. 美德论与义务论的统一 | D. 生命质量与生命价值论的统一 |
| E. 义务论与公益论的统一 | |

【答案】B

【解析】生命价值论最突出的一点就在于它能将生命的内在价值(生命神圣论)和外在价值(生命质量论)统一起来。并以此来评价生命的价值。

涉及考点 | 生命价值论

【解析】医疗事故是指医疗机构及其医务人员在医疗活动中,违反医疗卫生管理法律、行政法规、部门规章和诊疗护理规范、常规,过失造成患者人身损害的事故。确定是否为医疗事故目前需要医疗事故鉴定委员会鉴定才能认定。选项 C 是由于患者病情的变化而发生的意外,不属于自己范畴。

涉及考点 | 医疗事故的概念

(21~22 题共用备选答案)

- A. 承担责任范围内的传染病监测管理工作
- B. 对违反《中华人民共和国传染病防治法》的行为给予行政处罚
- C. 对甲类传染病疫区实施封锁管理
- D. 在必要时可以采取停工、停业、停课等措施
- E. 承担本单位及负责地段的传染病预防、控制和疫情管理工作

21. 各级各类卫生防疫机构按照专业分工应

【答案】A

22. 各级各类医疗保健机构设立的预防保健组织或人员应

【答案】E

【解析】《传染病防治法实施办法》第四条规定,各级各类卫生防疫机构按照专业分工承担传染病监测管理的责任和范围,由省级政府卫生行政部门确定。第十三条规定,各级各类医疗保健机构的预防保健组织或者人员,在本单位及责任地段内承担下列工作:①传染病疫情报告和管理。②传染病预防和控制工作。③卫生行政部门指定的卫生防治机构交付的传染病防治和监测任务。所以 21 题选 A, 22 题选 E。

涉及考点 | 各级医疗机构在传染病预防控制中的职责

(23~24 题共用备选答案)

- A. 非处方用药
- B. 保健药品
- C. 假药
- D. 劣药
- E. 特殊药品

23. 药品所含成分的名称与国家药品标准或者省、自治区、直辖市药品标准规定不符合的是

【答案】C

24. 药品成分的含量与国家药品标准或者省、自治区、直辖市药品标准规定不符合的是

【答案】D

【解析】按照《药品管理法》规定,药品所含成分与国家药品标准规定的成分不符的,以非药品冒充药品或者以他种药品冒充此种药品的为假药。药品成分的含量不符合国家药品标准的,为劣药。所以 23 题选 C, 24 题选 D。

涉及考点 | 禁止生产、销售假药、劣药

2年 易错考题

1. 下列各项,属于行政处罚的是

- A. 降级
- B. 赔礼道歉
- C. 罚款
- D. 赔偿损失

E.撤职

【答案】C

【解析】行政处罚的种类:①警告。②罚款。③没收违法所得、没收非法财物;④责令停产、停业整顿;⑤暂扣或者吊销执照;⑥行政拘留;⑦法律、行政法规规定的其他行政处罚。

涉及考点 || 卫生行政处罚的种类

2.依照《麻醉药品管理办法》的规定,麻醉药品的处方剂量,每张处方注射剂不得超过多少日的常用量

- | | |
|--------|-------|
| A.14 日 | B.7 日 |
| C.5 日 | D.3 日 |
| E.2 日 | |

【答案】E

【解析】对麻醉药品的规定,①对普通患者:每张处方最大量注射剂不得超过2日常用量,片剂、酊剂、糖浆剂等不得超过3日常用量。②对领有麻醉药品专用卡患者:每张处方最大量注射剂不得超过3日用量,片剂、酊剂、糖浆剂等不得超过7日用量,控缓释剂不得超过15日用量。

涉及考点 || 麻醉药品管理的相关规定

- 3.除特殊需要外,第一类精神药品的处方,每次不得超过多少日的常用量
- | | |
|--------|-------|
| A.14 日 | B.7 日 |
| C.5 日 | D.3 日 |
| E.1 日 | |

【答案】D

【解析】《处方管理办法》第二十三条规定,为门(急)诊患者开具的第一类精神药品注射剂,每张处方为1次常用量;控缓释制剂,每张处方不得超过7日常用量;其他剂型,每张处方不得超过3日常用量。哌甲酯用于治疗儿童多动症时,每张处方不得超过15日常用量。

涉及考点 || 精神药品管理的相关规定

- 4.为保证儿童及时接受预防接种,医疗机构与儿童的监护人员应当
- | | |
|------------|--------|
| A.先由监护人提出 | B.相互配合 |
| C.先由医疗机构提出 | D.订立合同 |
| E.共同协商 | |

【答案】B

【解析】《传染病防治法》第十五条规定,国家对儿童实行预防接种证制度。国家免疫规划项目的预防接种实行免费。医疗机构、疾病预防控制机构与儿童的监护人应当相互配合,保证儿童及时接受预防接种。具体办法由国务院制定。

涉及考点 || 国家建立传染病预防的相关制度

- (5~6题共用备选答案)
- | | |
|--------------|------------|
| A.造成患者器官组织损伤 | B.造成患者重度残疾 |
| C.造成患者中度残疾 | D.造成患者死亡 |
| E.造成患者轻度残疾 | |
| 5.属于二级医疗事故的是 | |

【答案】C

6. 属于三级医疗事故的是

【答案】E

【解析】根据对患者人身造成的损害程度，医疗事故分为四级。一级医疗事故：造成患者死亡、重度残疾的；二级医疗事故：造成患者中度残疾、器官组织损伤导致严重功能障碍的；三级医疗事故：造成患者轻度残疾、器官组织损伤导致一般功能障碍的；四级医疗事故：造成患者明显人身损害的其他后果的。所以5题选C,6题选E。

涉及考点 | 医疗事故的分级

金英杰医学教育