

**2017 年全国卫生专业技术资格考试护理学(中级)
考前压轴密卷**

儿科护理学

模拟试卷(一)

金英杰国家医学考试研究中心 编



答题须知

- 1.考生答题前应先检查试卷封面标示的考试类别和每页页角所标出的考试类别是否与本人准考证上的报考类别一致。
- 2.在开始答题前,请再次核对自己在答题卡上填写的姓名、准考证号、报考类别、考试单元等是否完整无误。
- 3.在开始答题前,请考生检查试卷有无缺损、重印、错印,发现上述情况应立即报告监考员。
- 4.答题卡上的考生信息和答案的所有信息点,必须使用 2B 铅笔按答题卡上“注意事项”栏中的要求填涂,如需要作修改,应用橡皮将原涂黑的地方擦净。
- 5.答题卡上“考场记录”一栏由监考员负责填写,考生不得自行填写。
- 6.答题卡将采用计算机阅卷,请考生注意保持答题卡平整、干净。
- 7.考试开始后半小时内,考生不得交卷离开考场。
- 8.考试结束后,请把试卷和答题卡分别翻放在桌上,不得带出考场。
- 9.监考员验收试卷和答题卡后,经监考员允许,考生方可离开考场。
- 10.考生如违反监考员宣读的“考场指令”和本“答题须知”,其一切后果由本人承担。

模拟试卷(一)

基础知识

一、以下每一道题下面有 A、B、C、D、E 五个备选答案。请从中选择一个最佳答案,并在答题卡上将相应题号的相应这母所属的方框涂黑。

- 关于巨幼细胞贫血的实验室检查结果,不妥的是
 - 属大细胞性贫血
 - 白细胞、血小板增生显著
 - 骨髓检查见红系增生活跃,可见各阶段巨幼红细胞
 - 血清维生素 B 低于正常
 - 血清叶酸低于正常值
- 欲衡量小儿营养状况,首先应做下列哪项检查
 - 头围
 - 测体重
 - 身长的测量
 - 上、下部量
 - 坐高
- 我国流行性乙脑的流行季节主要是
 - 春季
 - 春夏季
 - 夏秋季
 - 秋冬季
 - 冬季
- 用农历计算预产期,应如何推算
 - 月份减 3 或加 9,日期加 7
 - 月份减 3 或加 9,日期加 8
 - 月份减 3 或加 9,日期加 10
 - 月份减 3 或加 9,日期加 13
 - 月份减 3 或加 9,日期加 15
- 初乳具有下列特点,但除外
 - 是产后 5~7 天分泌的乳汁
 - 量足
 - 含蛋白质多,脂肪少
 - 富含免疫物质
 - 有生长发育调节因子
- 支气管自哪级开始参与气体交换
 - 支气管
 - 终末细支气管
 - 呼吸性细支气管
 - 肺泡管
 - 肺泡囊
- 中央型肺癌一般是指发生在
 - 主支气管
 - 叶支气管
 - 段支气管
 - 段支气管以下主支气管
 - 段支气管以上主支气管
- 高钾血症的原因不包括
 - 静脉补钾过快
 - 急性肾功能衰竭
 - 输入大量库存血
 - 持续胃肠减压
 - 代谢性酸中毒
- 下列不属于冠心病危险因素的是
 - 高血压
 - 血脂异常
 - 女性绝经期前
 - 40 岁以上
 - 吸烟
- 对胰腺癌有定性诊断意义的是
 - 超声波
 - CT

- C. 癌胚抗原测定
 D. 细胞学检查
 E. X 线造影
11. 慢性胃炎的确诊依据是
 A. 胃液分析
 B. X 线钡餐
 C. 胃镜检查
 D. 腹部 B 超
 E. 腹部 CT
12. 新生儿出生后, 开始喂哺母乳时间是
 A. 15~30 分钟
 B. 3~4 小时
 C. 6~8 小时
 D. 12 小时
 E. 24 小时
13. 下列属于临产标志的是
 A. 见红, 规律宫缩, 胎头下降
 B. 规律宫缩, 破膜, 胎头下降
 C. 见红, 破膜, 宫口扩张
 D. 见红, 破膜, 规律宫缩
 E. 规律宫缩, 胎头下降, 宫口扩张
14. 新生儿胎粪的特点是
 A. 褐色、干厚
 B. 金黄色、糊状
 C. 陶土色、软膏状
 D. 淡黄色水样便
 E. 墨绿色、黏稠状
15. 结肠癌最常见的组织学类型是
 A. 黏液癌
 B. 腺癌
 C. 未分化癌
 D. 黏液腺癌
 E. 类癌
16. 引起再生障碍性贫血最多见的药物是
 A. 阿司匹林
 B. 柔红霉素
 C. 氯霉素
 D. 保泰松
- E. 环磷酰胺
17. 麻疹的主要传播途径是
 A. 血液传播
 B. 呼吸道传播
 C. 消化道传播
 D. 皮肤接触传播
 E. 间接传播
18. 好发于儿童的卵巢肿瘤是
 A. 无性细胞瘤
 B. 内胚窦瘤
 C. 畸胎瘤
 D. 颗粒细胞瘤
 E. 勃勒纳瘤
19. 乳腺淋巴结转移的常见部位是
 A. 锁骨上淋巴结
 B. 锁骨下淋巴结
 C. 患侧腋下淋巴结
 D. 健侧腋下淋巴结
 E. 胸骨旁淋巴结
20. 大便潜血持续阳性多提示
 A. 浅表性胃炎
 B. 萎缩性胃炎
 C. 胃溃疡
 D. 十二指肠壶腹部溃疡
 E. 胃癌
21. 属于特异性感染的是
 A. 金黄色葡萄球菌感染
 B. 大肠埃希菌感染
 C. 铜绿假单胞菌感染
 D. 乙型溶血性链球菌感染
 E. 破伤风芽胞梭菌感染
22. 女性生命中可发育成熟的卵泡数目是
 A. 200 个或以下
 B. 200~300 个
 C. 300~400 个
 D. 400~500 个
 E. 500 个以上
23. 心肺复苏后, 最常见的继发性病理改

变是

- A. 心肌缺氧性损伤
- B. 肺透明膜形成
- C. 脑缺氧性损伤
- D. 急性胃黏膜糜烂
- E. 肾小管上皮细胞大量坏死

24. 诊断外伤性血气胸最简便可靠的依据是

- A. 病人出现呼吸困难及低血容量症状
- B. 胸腔穿刺抽出血液和气体
- C. X线检查患侧大片密度增高阴影
- D. 叩诊患侧为浊音,呼吸音减弱
- E. 胸部超声探查见有液平面

25. 颅内压的正常范围是

- A. 0.4~0.6 kPa (40~60 mmH₂O)
- B. 0.7~2.0 kPa (70~200 mmH₂O)
- C. 2.1~2.8 kPa (210~280 mmH₂O)
- D. 2.8~3.6 kPa (280~360 mmH₂O)
- E. 3.7~4.6 kPa (370~460 mmH₂O)

26. 属于高渗性脱水病理生理特点的是

- A. 失钠>失水
- B. 失水>失钠
- C. 失水=失钾
- D. 失钾<失水
- E. 失钠>失钾

27. 肠梗阻时,肠腔积液主要来自

- A. 经口饮入尚未被吸收的水
- B. 梗阻近端的胃肠分泌物
- C. 肠腔渗出液
- D. 肠壁血管漏出液
- E. 肠壁炎症渗出液

28. 肝癌特异性的血清标志物是

- A. 谷氨酰转肽酶
- B. 甲胎蛋白
- C. 谷丙转氨酶
- D. 乳酸脱氢酶同工酶
- E. α -抗胰蛋白酶

29. 有家族史的卵巢癌患者为

- A. 8%~12%

- B. 15%~20%

- C. 20%~25%

- D. 25%~30%

- E. 35%以上

30. 卵巢良性肿瘤中临床最常见的是

- A. 脂肪瘤
- B. 黏液性囊腺瘤
- C. 纤维瘤
- D. 浆液性囊腺瘤
- E. 成熟畸胎瘤

31. 与胆道蛔虫病发病无关的是

- A. 胃肠道功能紊乱
- B. 恶心、呕吐
- C. 体温升高
- D. 运动
- E. 驱虫不当

32. 主动脉瓣狭窄引起心功能代偿最主要的是

- A. 心脏节律改变
- B. 左心室肥厚
- C. 回心血容量增加
- D. 左心室腔扩大
- E. 右心房扩张

33. 引起左心室后负荷增加的主要因素是

- A. 二尖瓣狭窄
- B. 静脉回流增加
- C. 相对性主动脉瓣狭窄
- D. 外周血管阻力增加
- E. 动脉血容量增加

34. 急性胃炎按病因及病理变化的不同,分为不同类型,其中最常见的是

- A. 溃疡型
- B. 糜烂型
- C. 单纯型
- D. 出血型
- E. 感染型

35. 慢性支气管炎病情加剧的重要因素是

- A.大气污染
 B.粉尘刺激
 C.吸烟
 D.反复感染
 E.过敏
- 36.临床诊断新生儿低血糖标准为:血糖<
- A.1.2 mmol/L
 B.1.67 mmol/L
 C.2.2 mmol/L
 D.3.2 mmol/L
 E.3.67 mmol/L
- 37.引起上呼吸道感染的最常见病原体是
- A.革兰阳性细菌
 B.病毒
 C.肺炎支原体
 D.肺炎衣原体
 E.真菌
- 38.常见引起胃泌素升高的疾病是
- A.十二指肠球部溃疡
 B.单纯型胃炎
 C.胃溃疡
 D.糜烂型胃炎
 E.慢性萎缩性胃体胃炎
- 39.典型心绞痛的诱因中,应该除外
- A.情绪激动
 B.贫血
 C.体力劳动
 D.睡眠
 E.甲亢
- 40.患者被诊断为子痫前期轻度,其 24 小时尿蛋白定量超过
- A.0.15 g
 B.0.3 g
 C.0.4 g
 D.0.5 g
 E.0.7 g
- 41.先天性巨结肠的发病机制主要由于
- A.结肠的平滑肌发育不良
 B.结肠交感神经丛发育不良
 C.扩张结肠部分的平滑肌和弹力纤维发育不良
 D.结肠肠壁的肌间神经节细胞缺失
 E.病变发生在结肠近端
- 42.对判断新生儿缺血缺氧性脑病的预后有一定参考价值的检查是
- A.神经元特异性烯醇化酶
 B.脑电图
 C.头颅 B 超
 D.CT 扫描
 E.核磁共振
- 43.妊娠期 B 超监护不能显示的项目是
- A.胎肺成熟度
 B.胎方位
 C.有无胎心搏动
 D.胎头双顶径
 E.胎盘位置
- 44.可提示功血的发生是由于黄体功能不足的检查为
- A.基础体温呈单相型
 B.基础体温呈双相型,但上升缓慢,高温相 10 天
 C.经前宫颈黏液结晶检查出现羊齿植物叶状结晶
 D.经前血清孕酮值处在卵泡期水平
 E.经前阴道脱落细胞涂片表现为中高度雌激素作用
- 45.关于复方短效口服避孕药避孕机制的说法,错误的是
- A.抑制排卵
 B.通过异物的局部效应发挥作用
 C.改变子宫内膜形态与功能,不适于受精卵着床
 D.改变宫颈黏液性状使黏液量少、黏度增高,不利精子穿透
 E.受持续的雌、孕激素作用,输卵管的正常分泌和蠕动频率发生改变,从而改变受

精卵正常的运行速度

46.患者,女性,47岁。因子宫内膜癌行全子宫、双附件切除术及盆腔淋巴清扫术,术后48小时拔除尿管后自行排尿,第3天起阴道有尿液流出,同时仍可自行排尿,临床诊断为尿瘘,为明确瘘孔,不需做的辅助检查是

- A.宫腔镜检查
- B.靛胭脂试验
- C.输尿管镜检查
- D.排泄性尿路造影
- E.肾显像

47.吸气性呼吸困难严重者可出现三凹征,三凹征是指

A.胸骨上窝、锁骨上窝和肋间隙在吸气时明显下陷

B.胸骨上窝、锁骨上窝和肋间隙在呼气时明显下陷

C.胸骨上窝、锁骨下窝和肋间隙在吸气时明显下陷

D.胸骨下窝、锁骨上窝和肋间隙在吸气时明显下陷

E.胸骨上窝、锁骨下窝和肋间隙在呼气时明显下陷

48.形成慢性阻塞性肺气肿最常见的病因是

- A.慢性支气管炎
- B.支气管哮喘
- C.支气管扩张
- D.肺结核
- E.肺间质纤维化

49.抗结核化学药物治疗的治疗原则是

- A.早期、联合、足量、规律、全程
- B.早期、联合、足量、规律、长期
- C.早期、联合、适量、规律、全程
- D.早期、联合、适量、规律
- E.早期、联合、适量、全程

50.诊断呼吸衰竭的正确依据是

- A.发绀,呼吸困难

B.肺通气功能明显减退

C.呼吸的节律、频率和幅度发生改变

D.结膜充血、水肿和精神、神经症状

E. $\text{PaCO}_2 > 6.6 \text{ kPa}$ (50 mmHg)、 $\text{PaO}_2 <$

8.0 kPa(60 mmHg)

51.干性支气管扩张的唯一症状是

- A.慢性咳嗽
- B.大量脓痰
- C.咯血
- D.咳痰与体位变化有关
- E.呼吸困难

52.可以导致心脏压力负荷加重的疾病是

- A.主动脉瓣关闭不全
- B.室间隔缺损
- C.甲状腺功能亢进
- D.肺动脉高压
- E.慢性贫血

53.室性期前收缩的心电图特征不包括

- A.提前出现的QRS波群
- B.QRS波群时限超过0.12秒
- C.QRS波宽大畸形
- D.QRS前有P波
- E.代偿间歇完全

54.急性心肌梗死最基本的病因是

- A.体力活动
- B.情绪激动
- C.血压剧升
- D.冠状动脉张力增高
- E.冠状动脉粥样硬化

55.目前最佳的系统性红斑狼疮筛选试验是

- A.狼疮细胞检查
- B.皮肤狼疮带试验
- C.抗核抗体检查
- D.血清补体测定
- E.毛细血管镜检查

56.有机磷农药中毒后,血液中胆碱酯酶活性

- A. 不变
 B. 升至正常人的 70% 以上
 C. 降至正常人的 70% 以下
 D. 升至正常人的 90% 以上
 E. 降至正常人的 90% 以下
57. 患者, 男性, 被汽车撞伤右胸部, 呼吸 20 次/分, 胸部 X 线检查示: 右侧气胸, 肺受压 20%, 处理原则是
- A. 胸穿排气
 B. 观察病情
 C. 胸腔闭式引流
 D. 牵引固定
 E. 手术治疗
58. 诊断膀胱肿瘤最重要、不可或缺的方法是
- A. 膀胱镜检查
 B. 膀胱造影
 C. 双合诊检查
 D. 尿脱落细胞检查
 E. 尿道超声检查
59. 骨巨细胞瘤属于
- A. 骨瘤样病损
 B. 良性肿瘤
 C. 继发性肿瘤
 D. 恶性肿瘤
 E. 潜在恶性肿瘤
60. 擦伤的特点是
- A. 皮下淤血、肿胀
 B. 皮肤水肿
 C. 表皮破损
 D. 皮肤呈多数小裂口及浆液渗出
 E. 创缘较平整, 出血可渗可涌
61. 供移植器官的保存原则是
- A. 常温保存
 B. 低温原则
 C. 延长热缺血时间
 D. 变冷缺血为热缺血
 E. 中断血流后不应立即降温
62. 乳腺癌最常见的病理类型是
- A. 非浸润性癌
 B. 早期浸润性癌
 C. 浸润性特殊癌
 D. 浸润性非特殊癌
 E. 其他罕见癌
63. 腺病毒肺炎的发病年龄多见于
- A. 新生儿
 B. 2~6 个月婴儿
 C. 6~12 个月婴儿
 D. 6~24 个月婴儿
 E. 任何年龄
64. 猩红热治疗首选抗生素是
- A. 红霉素
 B. 青霉素
 C. 新霉素
 D. 庆大霉素
 E. 四环素
65. 符合正常卵巢临床特征的是
- A. 成年女性卵巢约 4 cm × 3 cm × 1 cm 大小
 B. 卵巢由骨盆漏斗韧带与子宫相连
 C. 卵巢髓质内有数以万计的原始卵泡
 D. 位于阔韧带内
 E. 卵巢白膜是一层立方上皮
66. 胎儿纵轴与母体纵轴的关系称为
- A. 胎姿势
 B. 胎儿位置
 C. 胎产式
 D. 胎先露
 E. 胎方位
67. 软产道裂伤多见于
- A. 阴道手术操作不当
 B. 胎盘植入
 C. 凝血功能障碍
 D. 软产道充分扩张
 E. 产程延长
68. 可以早期鉴别葡萄胎和侵蚀性葡萄胎的检查是
- A. 胸部 X 线摄片

- B.刮宫葡萄胎标本
C.B超及彩色多普勒
D.子宫输卵管造影术或宫腔镜
E.血清 β -hCG检测
- 69.引起支气管扩张的最常见病因是
A.支气管先天性发育缺陷
B.支气管外部纤维的牵拉
C.支气管-肺组织感染和阻塞
D.遗传因素
E.机体免疫功能失调
- 70.不属于非特异性感染病原体的是
A.大肠杆菌
B.结核杆菌
C.金黄色葡萄球菌
D.乙型溶血性链球菌
E.铜绿假单胞菌
- 71.患者,男性,77岁。高血压数年,近月来睡眠不佳,排尿困难,体重下降,且有腹部不适感,左侧腹股沟区出现肿块并逐渐增大,可进入阴囊,考虑该患者可能是腹股沟疝,与发病有关的因素是
A.高血压数年
B.睡眠不佳
C.排尿困难
D.腹部不适
E.体重下降
- 72.肾病综合征最根本的病理生理特点是
A.水肿
B.蛋白尿
C.低蛋白血症
D.血清胆固醇增高
E.低密度脂蛋白增高
- 73.膀胱炎的特征性表现不包括
A.尿频
B.尿急
C.尿痛
D.排尿困难
E.晨尿有氨臭味
- 74.患者,女性,55岁。行ECG检查示:P波消失,代之是400次/分左右的f波,QRS波形态正常,QRS波群间隔绝对不规则,心室率通常在每分钟110次,从心电图可诊断
A.房扑
B.室扑
C.房颤
D.室上速
E.室速
- 75.患者,男性,56岁。半年前因原发性肝癌行右半肝切除术,手术后建议其门诊定期随访。最能早期预测癌肿复发的检查是
A.ALT
B.GGT
C.B型超声检查
D.选择性肝动脉造影
E.动态监测AFP的变化
- 76.我国引起慢性肾衰竭的最常见疾病是
A.慢性肾盂肾炎
B.慢性肾小球肾炎
C.狼疮性肾炎
D.高血压肾病
E.糖尿病肾病
- 77.诊断贫血时血红蛋白含量正确的是
A.男性 <160 g/L,女性 <150 g/L
B.男性 <150 g/L,女性 <140 g/L
C.男性 <140 g/L,女性 <130 g/L
D.男性 <130 g/L,女性 <120 g/L
E.男性 <120 g/L,女性 <110 g/L
- 78.确诊CO中毒最主要的依据是
A.CO接触史
B.口唇颜色
C.血液中碳氧血红蛋白含量
D.昏迷的深度
E.缺氧的程度
- 79.对休克的认识正确的是
A.休克就是动脉血压下降的情况
B.休克就是心排出量减少的情况

C.休克就是各种原因引起的组织灌注不足和细胞缺氧的结果

D.休克就是心力衰竭

E.休克是遭受打击后意识丧失

80.应用复苏药物的目的不包括

A.防治感染

B.防治心律失常

C.纠正急性酸中毒

D.补充血容量和电解质

E.防治脑水肿

81.判断甲状腺功能亢进患者病情程度的主要指标是

A.食欲亢进程度

B.脉率增快和脉压增大的程度

C.突眼程度

D.甲状腺肿大程度

E.体重减轻程度

82.腹膜刺激征是指

A.压痛、反跳痛、肌紧张

B.肠鸣音亢进、压痛、反跳痛

C.肠鸣音消失、腹痛、腹泻

D.板状腹、压痛、腹泻

E.反射性呕吐、恶心、腹泻

83.X 线检查可见气液平面及胀气肠袢的时间在肠梗阻发生后

A.1~2 小时

B.2~4 小时

C.4~6 小时

D.6~8 小时

E.8~10 小时

84.不符合肺炎克雷伯杆菌肺炎临床特点的是

A.白红细胞正常或增加

B.咳嗽,咳红棕色胶冻状痰

C.青壮年多见,预后良好

D.起病急、胸痛、畏寒

E.对庆大霉素及第三代头孢菌素敏感

85.患者,男性,54 岁。于晚餐后突发上腹持续性剧痛。考虑急性胰腺炎,其血清淀粉酶升高的规律是

A.发病后 2 小时开始升高,12 小时达高峰

B.发病后 1~2 小时开始升高,24 小时达高峰

C.发病后 24 小时开始升高,48 小时达高峰

D.发病后 12 小时开始升高,72 小时达高峰

E.发病后 48 小时开始升高,72 小时达高峰

二、以下提供若干组考题,每组考题共同在考题前列出 A、B、C、D、E 五个备选答案。请从中选择一个与考题关系最密切的答案,并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。每个备选答案可能被选择一次、多次或不被选择。

(86~87 题共用备选答案)

A.脐部

B.呼吸道

C.消化道

D.皮肤

E.胎盘

86.新生儿感染性肺炎出生前的常见感染途径是

87.新生儿感染性肺炎出生后的常见感染途径是

(88~90 题共用备选答案)

A.游离移植

B.带蒂移植

C.吻合移植

D.输注移植

E.联合移植

88.游离皮片移植属于

89.肾移植属于

90.骨髓移植属于

(91~92 题共用备选答案)

- A.尿培养
B.痰培养
C.血培养
D.粪便培养
E.骨髓培养
- 91.确诊伤寒最常用的方法是
92.细菌性痢疾的确诊依据是
(93~95题共用备选答案)
- A.窦前
B.窦后
C.窦内
D.肝前
E.肝后
- 93.肝炎后肝硬化所致门静脉高压症的主要阻塞部位在
94.血吸虫肝硬化所致门静脉高压症的主要阻塞部位在
95.肝静脉阻塞综合征所致门静脉高压症的主要阻塞部位在
(96~97题共用备选答案)
- A.血红蛋白30~60 g/L
B.血红蛋白<120 g/L
C.血红蛋白<110 g/L
D.血红蛋白90~120 g/L
E.血红蛋白145 g/L
- 96.6个月至6岁小儿贫血的诊断标准是
97.6~14岁小儿贫血的诊断标准是
(98~100题共用备选答案)
- A.圆韧带
B.主韧带
C.阔韧带
D.宫骶韧带
E.骨盆漏斗韧带
- 98.固定子宫于正常位置的韧带是
99.间接保持子宫呈前倾位置的韧带是
100.维持子宫在盆腔正中央的韧带是



相关专业知识

一、以下每一道题下面有 A、B、C、D、E 五个备选答案。请从中选择一个最佳答案,并在答题卡上将相应题号的相应这母所属的方框涂黑。

1. 不属于艾滋病传播途径的是
 - A. 同性性接触
 - B. 异性性接触
 - C. 同桌进餐
 - D. 输血
 - E. 分娩
2. 移位菌群失调的原因不包括
 - A. 使用抗菌药物不恰当
 - B. 外科手术
 - C. 插管或介入治疗
 - D. 免疫功能降低
 - E. 细菌结构变化
3. 治疗鹅口疮错误的是
 - A. 2% 碳酸氢钠液擦洗口腔
 - B. 积极治疗原发病
 - C. 局部涂甲紫
 - D. 加大抗生素剂量
 - E. 局部应用抗真菌药物
4. 无菌物品的保存方法不当的是
 - A. 储物架及运送车要保持干净
 - B. 无菌物品应有合格标志,并标明灭菌日期
 - C. 快速压力蒸汽灭菌物品不论是否潮湿,均可保存 7~14 天
 - D. 储藏房间要保持湿式清扫,避免扬尘
 - E. 无菌物品应与未无菌物品分开存放
5. 下列沟通障碍的原因中不属于发送者障碍的有
 - A. 目的不明,导致信息内容的不确定性
 - B. 表达模糊,导致信息传递错误
 - C. 选择失误,导致信息误解的可能性增大
 - D. 言行不当,导致信息理解错误
 - E. 过度加工,导致信息的模糊或失真
6. 传染病区设置隔离室的主要目的是
 - A. 为病人提供良好的休息环境
 - B. 便于对病人进行监护
 - C. 将感染源与传播的途径分开
 - D. 将感染源与易感宿主从空间上分开
 - E. 方便家属探视
7. 医院感染暴发中流行病学处理的基本步骤,前三步是
 - A. 证实流行或暴发→查找感染源→查找引起感染的因素
 - B. 证实流行或暴发→组织落实有效的控制措施→写出调查报告
 - C. 查找感染源→证实流行或暴发→查找引起感染的因素
 - D. 查找引起感染的因素→证实流行或暴发→查找感染源
 - E. 查找感染源→查找引起感染的因素→证实流行或暴发
8. 口腔科的牙钻属于
 - A. 高度危险性物品
 - B. 中度危险性物品
 - C. 低度危险性物品
 - D. 高度水平消毒物品
 - E. 中度水平消毒物品
9. 当为某冠心病病人进行健康教育时,病人向你表达了他认为吸烟对他的健康不会产生影响,所以即使在患病期间,他仍然不想戒烟,病人的这种行为受到了哪类因素的影响
 - A. 倾向因素
 - B. 促成因素
 - C. 强化因素
 - D. 环境因素
 - E. 学习因素
10. 资源评估属于
 - A. 管理与政策诊断

- B.组织诊断
C.环境诊断
D.社会诊断
E.行为诊断
- 11.下列化学消毒剂中,可用于空气消毒的是
- A.2%戊二醛
B.75%乙醇
C.2%过氧乙酸
D.3%过氧化氢
E.0.5%氯己定
- 12.不耐热、不耐湿的物品消毒宜选用
- A.环氧乙烷气体熏蒸
B.紫外线照射法
C.高压蒸汽法
D.消毒液浸泡法
E.电离辐射法
- 13.关于控制的叙述,错误的是
- A.监视各项活动以保证它们按计划进行并纠正各种重要偏差的过程
B.控制的重要性包括在执行组织计划中的保障作用和和管理职能中的关键作用
C.控制的类型包括前馈控制、同期控制和反馈控制
D.控制的基本过程包括建立标准、衡量绩效和纠正偏差
E.控制的基本方法包括预算控制、质量控制、进度控制和数据控制
- 14.对病人最后的护理结果的质量评价属于
- A.基础质量管理
B.成效管理
C.环节质量管理
D.过程质量管理
E.终末质量管理
- 15.近中期效果评价是指
- A.形成评价
B.过程评价
C.效应评价
D.结局评价
E.总结评价
- 16.注射后处理针头的方法错误的是
- A.用过的针头采用双手“复帽”
B.不将针尖指向身体任何部位
C.使用后不用手去除针头
D.将针头放入防水耐刺穿的容器内
E.用过的针头不再重复使用
- 17.属于原位菌群二度失调的是
- A.正常菌群在原有部位发生了数量的暂时性变化
B.正常菌群在原有部位发生了种类结构的暂时性变化
C.正常菌群在原有部位比例发生了病理性波动
D.正常菌群转移到另一部位定植或定居
E.可逆性失调
- 18.连续使用的氧气湿化瓶应
- A.每周消毒 2 次,用后终末消毒,干燥保存
B.每日清洁,用后消毒,干燥保存
C.每日消毒,用后终末消毒,干燥保存
D.每周 1 次消毒,用后终末消毒,干燥保存
E.专人专用,用后进行终末消毒
- 19.护理管理的实践性下列哪句不妥
- A.护理工作时间性强,要按时完成护理服务
B.护理工作面广量大,护士常处于劳累状态
C.护理工作要保证 24 小时连续不间断
D.护理工作责任性强,护士常处于紧张状态
E.护士为护理对象提供健康服务就是管理过程
- 20.微生物从外界环境落到人体,并在一定部位不断生长、繁殖后代,这种现象称为
- A.植入
B.转移
C.定植

- D.定居
E.易位
- 21.根据标准预防的概念,下列不被看作具有传染性的物质是
- A.粪便和尿液
B.体液
C.分泌物
D.血液
E.汗液
- 22.科学管理理论的基本出发点为
- A.提高劳动生产率
B.实行科学化管理
C.调动人的积极性
D.体现公平的分配制度
E.建立健全的管理系统
- 23.护理部根据护理专业的发展变化及时调整工作模式,遵循的动态管理原则是
- A.系统原则
B.效益原则
C.弹性原则
D.人本原则
E.价值原则
- 24.感染病人使用后的器械,正确的处理程序是
- A.消毒、去污、清洗、灭菌
B.去污、清洗、消毒、灭菌
C.清洗、去污、消毒、灭菌
D.去污、消毒、清洗、灭菌
E.清洗、灭菌、消毒、去污
- 25.在确定健康教育的计划目标时错误的是
- A.总体目标必须最终得以实现
B.具体目标是由三个“W”和两个“H”组成
C.总体目标是宏观的,较为笼统的
D.总体目标可分解为多个具体目标
E.具体目标是一些具体的量化的指标
- 26.危害健康的行为不包括
- A.高脂高糖低纤维素饮食
B.A型行为
C.不良生活习惯
D.戒烟
E.C型行为
- 27.除下列哪项外,均是采用观察法收集的资料
- A.测量患者的体温
B.听右下肺有无湿啰音
C.触摸皮肤温度、湿度
D.阅读患者的查体记录
E.查看患者尿液的颜色
- 28.可达到高水平消毒法的是
- A.聚维酮碘
B.苯扎溴铵
C.过氧化氢
D.氯己定
E.乙醇
- 29.喹诺酮类抗菌药的主要作用机制是
- A.干扰细菌细胞壁合成
B.损伤细胞膜
C.影响细菌蛋白质的合成
D.抑制细菌核酸的形成
E.抑制固醇类药物的合成
- 30.真菌引起的医院感染中,最常见的致病菌是
- A.毛霉菌
B.隐球菌
C.光滑念珠菌
D.白色念珠菌
E.李斯特菌
- 31.社交距离通常是指
- A.1.2~4 m
B.4 m 以外
C.50~120 cm
D.50 cm 以内
E.100 cm 以内
- 32.基础护理合格率的评价属于
- A.基础质量评价
B.服务质量评价
C.环节质量评价
D.过程质量评价

- E. 终末质量评价
33. 下列属于高度危险物品的是
- A. 胃镜
B. 体温表
C. 便盆
D. 导尿管
E. 压舌板
34. 经粪-口途径传播的肝炎病毒有
- A. 甲型、丙型肝炎病毒
B. 甲型、戊型肝炎病毒
C. 乙型、丙型肝炎病毒
D. 丙型、戊型肝炎病毒
E. 甲型、乙型肝炎病毒
35. 下列区域物体表面消毒不合格的是
- A. 普通手术室, 细菌总数 ≤ 5 cfu/cm², 未检出致病菌
B. 急诊抢救室, 细菌总数 ≤ 10 cfu/cm², 未检出致病菌
C. 肝炎病房, 细菌总数 ≤ 15 cfu/cm², 未检出致病菌
D. 注射室, 细菌总数 ≤ 15 cfu/cm², 未检出致病菌
E. 新生儿室的工作人员, 细菌总数 ≤ 5 cfu/cm², 未检出致病菌
36. 手术前需预防性使用抗生素的是
- A. 经阴道子宫切除术
B. 甲状腺手术
C. 疝修补术
D. 子宫肌瘤切除术
E. 扁桃体摘除术
37. 我国护理管理标准规定一级医院医师与护理人员之比为
- A. 1 : 2
B. 1 : 3
C. 1 : 4
D. 1 : 1
E. 2 : 3
38. 被公认为“科学管理之父”的管理学家是
- A. 卢因
B. 泰勒
C. 韦伯
D. 亚当斯
E. 梅奥
39. 医疗用品污染后的危害程度可分为几类
- A. 1 类
B. 3 类
C. 5 类
D. 7 类
E. 9 类
40. “爱探究、好攻击、易激惹、喜欢自我表现”属于哪一行为发展阶段的主要表现
- A. 被动发展阶段
B. 主动发展阶段
C. 自主发展阶段
D. 巩固发展阶段
E. 自我发展阶段
41. 不属于目标管理局限性的是
- A. 目标制定有难度
B. 限制管理者能力发挥
C. 缺乏灵活性
D. 常忽视成本估计
E. 缺乏连续性
42. 随着计算机技术的日益成熟和广泛应用, 管理幅度管理层的理论也发生着革命性的变化, 不符合目前变化的是
- A. 中层管理功能正逐渐由计算机完成
B. 组织管理幅度变宽
C. 组织管理层级变少
D. 组织日益由扁平化走向高耸型
E. 信息传递加快
43. 组织图不能提供的信息是
- A. 指挥关系
B. 人、财、物的流向
C. 管理幅度
D. 集中与分散
E. 组织规模
44. 护理人才结构的群体结构不包括
- A. 专业结构

- B.能级结构
C.年龄结构
D.知识结构
E.智能结构
- 45.“条条大路通罗马”描述的有效沟通的策略是
- A.避免一味说教
B.使用恰当的沟通方式
C.考虑接受者的观点和立场
D.以行动强化语言
E.充分利用反馈机制
- 46.不属于协调基本要求的是
- A.及时协调与连续协调相结合
B.从根本上解决问题
C.调动当事者的积极性
D.以大多数人的利益为主
E.相互尊重
- 47.病房护士长最有效的监督方法是
- A.听取所有护士的汇报
B.直接观察
C.指派专人监督
D.护士之间相互尊重
E.护士之间相互监督
- 48.质量观的演变过程中,提出“全面顾客满意”概念的阶段是
- A.“符合性质量”阶段
B.“适用性质量”阶段
C.“满意性质量”阶段
D.“卓越性质量”阶段
E.“全面质量满意”阶段
- 49.在护理质量管理中树立“第一次把事情做对”观念的护理质量管理基本原则是
- A.以患者为中心原则
B.预防为主原则
C.工作标准“零缺陷”原则
D.全员参与原则
E.基于事实的决策方法原则
- 50.按教育目的或内容进行分类,不属于健康教育研究领域范畴的是
- A.学校健康教育
B.防治疾病健康教育
C.营养健康教育
D.环境保护健康教育
E.生殖健康教育
- 51.对信息和讯息的界定不正确的是
- A.讯息是一种信息
B.信息泛指人类社会传播的一切内容
C.讯息传播产生传、受双方有意义的交换
D.讯息传播产生传、受双方之间的互动
E.讯息是由信息符号构成的抽象信息
- 52.小组讨论时,一般适宜的小组人数为
- A.2~5人
B.3~6人
C.6~10人
D.10~15人以上
E.15~20人
- 53.患者在门诊诊疗过程中接受的健康教育称为
- A.住院教育
B.病房教育
C.随访教育
D.门诊教育
E.入院教育
- 54.在实施患者健康教育时,首先要进行的是
- A.确定患者教育目标
B.分析患者的需求
C.制订患者教育计划
D.考虑患者教育的形式
E.评价教育需求
- 55.属于医院获得性感染的是
- A.新生儿呕吐
B.新生儿水痘
C.新生儿红斑
D.新生儿黄疸
E.新生儿脐红
- 56.影响人体微生态平衡的因素不包括
- A.免疫系统疾病
B.腰穿

- C.长期服用抗生素
D.慢性咽炎
E.长期静脉输液
- 57.紫外线灯照射强度监测至少应
- A.每月一次
B.每季度一次
C.每半年一次
D.每年一次
E.每一年半一次
- 58.医务人员应立即洗手的条件是
- A.接触患者的分泌物前
B.接触患者的血液前
C.脱去污染手套后
D.接触同一个患者身体的同一部位时
E.接触污染器械前
- 59.甲型肝炎传播途径不包括
- A.粪-口途径
B.密切接触
C.垂直传播
D.粪便污染食物
E.粪便污染水源
- 60.乙型肝炎的传播途径是
- A.通过共同就餐传播
B.通过拥抱传播
C.通过共用牙刷和剃刀
D.通过空气传播
E.通过握手传播
- 61.系统的特性不包括
- A.整体性
B.目的性
C.相关性
D.内部适应性
E.层次性
- 62.护理仪器设备的维护计划是
- A.战略性计划
B.战术性计划
C.综合性计划
D.长期计划
E.短期计划
- 63.目标管理的基本精神是

- A.以自我管理为中心
B.员工参与管理
C.重视成果
D.强调自我评价
E.以共同制定的目标为依据
- 64.沟通障碍中属于接受者障碍的是
- A.目的不明
B.表达模糊
C.选择失误
D.过度加工
E.言行不当
- 65.有效沟通策略中不正确的是
- A.使用正式沟通的方式
B.考虑接受者的观点和立场
C.充分利用反馈机制
D.以行动强化语言
E.避免一味说教
- 66.正确的谈话技巧是
- A.善于掌控下属发言内容
B.善于启发下属聆听,控制情绪
C.善于启发下属讲真情实话
D.善于抓住所有问题
E.善于规避敏感话题
- 67.医疗护理所用材料及药品购买控制,其控制的对象类型是
- A.作业
B.人员
C.信息
D.财务
E.组织绩效
- 68.不属于护理管理控制关键点的是
- A.高危时间
B.高危患者
C.高危护士
D.关键制度
E.所有科室
- 69.获取患者满意程度的最佳方式是
- A.问卷调查
B.电话随访
C.患者投诉

- D. 与患者直接沟通
E. 第三方调查
70. 健康促进的三个基本策略是
A. 提倡、协调、控制
B. 提倡、赋权、协助
C. 控制、赋权、协调
D. 控制、赋权、倡导
E. 倡导、赋权、协调
71. 不属于健康促进活动领域的是
A. 制定促进健康的公共政策
B. 描述人群的健康状况
C. 发展个人技能
D. 加强社区行动
E. 调整卫生服务方向
72. 人的行为的基本构成要素有行为主体、行为客体、行为环境、行为手段和
A. 行为动机
B. 行为目的
C. 行为计划
D. 行为过程
E. 行为结果
73. 人类的行为因遗传、环境以及学习经历的不同而千差万别, 丰富多彩, 表现出较大的
A. 目的性
B. 可塑性
C. 一致性
D. 差异性
E. 规律性
74. 危害健康行为的主要特点是危害性、明显和稳定性以及
A. 连续性
B. 单一性
C. 危险性
D. 多样性
E. 习得性
75. 健康信息应具有的特点中, 针对性是指
A. 健康信息的选择、制作、传递必须针对传播者的需求和特点
B. 健康信息的选择、制作、传递必须针对传播媒介的特点
C. 健康信息的选择、制作、传递必须针对受者的需求和特点
D. 健康信息的选择、制作、传递必须针对传播环境的特点
E. 健康信息的选择、制作、传递必须针对主管部门的需求和特点
76. 健康传播中受者在接触信息时普遍存在的心理特点不包括
A. 求异
B. 求真
C. 求短
D. 求新
E. 求近

二、以下提供若干组考题, 每组考题共同在考题前列出 A、B、C、D、E 五个备选答案。请从中选择一个与考题关系最密切的答案, 并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。每个备选答案可能被选择一次、多次或不被选择。

- (77~78 题共用备选答案)
- A. 胃炎
B. 痰中培养大肠埃希杆菌
C. 阑尾炎
D. 新生儿腹泻
E. 产后乳腺炎
77. 通过消毒、灭菌、隔离、无菌技术等措施可有效地预防和控制的是
78. 通过合理使用抗菌药物和免疫抑制
- 类药物降低感染风险的是
(79~81 题共用备选答案)
- A. 高压蒸汽灭菌
B. 干热灭菌
C. 滤过除菌
D. 紫外线
E. 煮沸消毒
79. 空气的消毒宜采用
80. 动物免疫血清的除菌宜采用

- 81.手术用金属器械宜采用
(82~83 题共用备选答案)
- A.戴清洁手套
 - B.戴一次性手套
 - C.戴医用口罩
 - D.戴口罩
 - E.穿隔离衣
- 82.医务人员接触血液及污染物品时应
- 83.进行手术等无菌操作时应
(84~86 题共用备选答案)
- A.信息源
 - B.编码
 - C.传递信息
 - D.解码
 - E.反馈
- 84.信息被译成能理解的一系列符号的过程属于沟通步骤中
- 85.包括接受、译码和理解三个环节的沟通步骤是
- 86.信息沟通属于沟通步骤中的
(87~89 题共用备选答案)
- A.目标控制
 - B.进度控制
 - C.预算控制
 - D.质量控制
 - E.技术控制
- 87.将实际情况与预算计划对比检查,及时发现问题、纠正偏差的控制方法是
- 88.对生产和工作的进程在时间上进行控制的方法是
- 89.把执行结果与预期目标及标准进行对照检查,以发现问题,采取纠偏措施的控制
(90~91 题共用备选答案)
- A.呼吸机相关性肺炎
 - B.呼吸衰竭
 - C.肺癌
 - D.新生儿腹泻
 - E.结肠癌
- 90.属于医院感染的是
- 91.不属于医院感染的是
(92~94 题共用备选答案)
- A.碘伏消毒液原液局部擦拭 2 遍
 - B.碘伏消毒液原液局部擦拭
 - C.20 000 mg/mL 葡萄糖酸氯己定擦拭
 - D.有效含量>1 g/L 氯己定乙醇溶液局部擦拭 2~3 遍
 - E.3%过氧化氢冲洗
- 92.适用于穿刺部位的皮肤消毒的方法为
- 93.适用于手术切口部位的皮肤清洁方法为
- 94.适用于伤口创面消毒的冲洗方法为
(95~97 题共用备选答案)
- A.管理的科学性
 - B.管理的自然属性
 - C.管理的广泛性
 - D.人和时间
 - E.能源和信息
- 95.管理的基本特征
- 96.护理管理的特点
- 97.管理二重性的体现
(98~100 题共用备选答案)
- A.倒放
 - B.竖放
 - C.平放
 - D.斜放
 - E.侧放
- 98.手术器械包、硬式容器应
- 99.盆、盘、碗类物品应
- 100.纸袋、纸塑包装应

专业知识

一、以下每一道题下面有 A、B、C、D、E 五个备选答案。请从中选择一个最佳答案,并在答题卡上将相应题号的相应这母所属的方框涂黑。

1. 儿科护理学的任务不包括
 - A. 增强儿童体格
 - B. 提高儿童智能
 - C. 培养特长
 - D. 降低发病率
 - E. 降低死亡率
2. 儿童护理学工作范围描述错误的是
 - A. 医学
 - B. 心理学
 - C. 社会学
 - D. 周易学
 - E. 教育学
3. 婴儿出生后以最初 3 个月生长最快,出现第一个生长高峰,至青春期又猛然加快,出现第二个生长高峰,这个现象体现了生长发育的
 - A. 连续性和阶段性
 - B. 各系统器官发育的不平衡性
 - C. 顺序性
 - D. 个体差异
 - E. 以上皆是
4. 脊髓灰质炎减毒活疫苗接种剂次为
 - A. 1 次
 - B. 2 次
 - C. 3 次
 - D. 4 次
 - E. 5 次
5. 患儿认为道德行为与疾病有关,能注意到疾病的程度,但无法用术语描述的年龄段是
 - A. 2~7 岁
 - B. 7~11 岁
 - C. 11~14 岁
 - D. 15~17 岁
 - E. 18 岁~成人
6. 属于早产儿的是
 - A. 胎龄满 24 周的新生儿
 - B. 胎龄满 27 周的新生儿
 - C. 胎龄满 28 周的新生儿
 - D. 胎龄满 37 周的新生儿
 - E. 胎龄满 38 周的新生儿
7. 新生儿体温调节的特点是
 - A. 能量储备较多
 - B. 以寒战等物理产热为主
 - C. 皮肤体表面积小,不易散热
 - D. 以棕色脂肪化学产热为主
 - E. 中枢发育较成熟
8. 早产儿的特点是
 - A. 足底纹理少
 - B. 头发分条清楚
 - C. 乳腺有结节
 - D. 皮肤毳毛少
 - E. 指甲达到指尖
9. 新生儿窒息时,医护人员采取首要的复苏步骤是
 - A. 清理呼吸道
 - B. 建立呼吸
 - C. 维持正常循环
 - D. 药物治疗
 - E. 评价和环境
10. 为窒息新生儿进行 ABCDE 复苏时,贯穿于整个复苏过程的是
 - A. 清理呼吸道
 - B. 建立呼吸
 - C. 维持正常循环
 - D. 药物治疗
 - E. 评价和环境
11. 对新生儿颅内出血叙述错误的是
 - A. 症状轻重与出血部位及出血量有关
 - B. 一般生后 1~2 天内出现症状

- C.意识表现为过度兴奋或抑制
D.颅内压增高
E.肌张力正常
- 12.足月新生儿生理性黄疸的特点中除外
- A.生后2~3天出现黄染
B.2周内黄疸消退
C.肝功能正常
D.食欲正常
E.血清胆红素小于257 μmol/L
- 13.生后24小时内出现黄疸者,应首先考虑
- A.新生儿肝炎
B.胆道闭锁
C.新生儿溶血病
D.败血症
E.生理性黄疸
- 14.新生儿肺透明膜病的特点是
- A.生后即出现呼吸困难
B.呼吸窘迫进行性加重
C.鼻翼扇动,出现青紫
D.吸气时胸廓凹陷
E.呼气性呻吟
- 15.宫内感染性肺炎的症状常出现在生后
- A.4~6小时
B.6~12小时
C.12~14小时
D.3~5天
E.1周
- 16.金黄色葡萄球菌肺炎可选用的治疗药物为
- A.青霉素
B.红霉素
C.阿米卡星
D.利巴韦林
E.头孢菌素
- 17.胆红素脑病后遗症期的表现除外
- A.骨骼畸形
B.听力下降
C.手足徐动
D.智力落后
E.牙釉质发育不良
- 18.中和破伤风痉挛毒素的药物为
- A.破伤风抗毒素
B.地西洋
C.青霉素
D.甲硝唑
E.苯巴比妥
- 19.新生儿最常见的低血糖为
- A.先天性
B.一过性
C.顽固性
D.代谢性
E.医源性
- 20.新生儿低血糖可与其他疾病相鉴别的临床表现为
- A.反应差或烦躁
B.哭声异常、肌张力低
C.易激惹、惊厥
D.补充葡萄糖后症状消失
E.呼吸暂停
- 21.需静脉点滴氢化可的松的新生儿低血糖状况为
- A.无症状低血糖
B.无症状低血糖进食葡萄糖无效
C.有症状低血糖
D.持续或反复低血糖
E.一过性低血糖
- 22.重度营养不良体重低于正常平均值
- A.15%
B.20%
C.30%
D.35%
E.40%
- 23.营养不良患儿治症原则错误的是
- A.调整饮食
B.祛除病因
C.输成分血
D.控制感染

- E.治疗并发症
- 24.不属于肥胖症患儿治疗原则的是
- 控制饮食
 - 加强运动
 - 药物
 - 限制外出
 - 心理治疗
- 25.患儿,女,10个月。诊断重症佝偻病合并肺炎,给予肌肉注射维生素 D
- 2 500~75 000 μg
 - 7 500~15 000 μg
 - 15 000~20 000 μg
 - 20 000~25 000 μg
 - 25 000~30 000 μg
- 26.婴儿期引起高热惊厥最常见的原因是
- 高血钙
 - 高血钾
 - 低血钠
 - 低血钾
 - 低血钙
- 27.维生素 D 缺乏性手足搐搦症治疗原则为
- 补维生素 D、补钙、止惊
 - 补钙、止惊、补维生素 D
 - 补维生素 D、止惊、补钙
 - 止惊、补维生素 D、补钙
 - 止惊、补钙、补维生素 D
- 28.婴儿发生溢乳的原因是
- 胃排空快
 - 胃容量小
 - 胃较垂直
 - 幽门括约肌发育好,贲门肌发育差
 - 幽门括约肌发育差,贲门肌发育好
- 29.小儿 5 岁时食管的长度为
- 10 cm
 - 12 cm
 - 14 cm
 - 16 cm
 - 18 cm
- 30.新生儿胃容量约为
- 10~30 ml
 - 30~60 ml
 - 50~80 ml
 - 70~100 ml
 - 90~150 ml
- 31.关于母乳喂养儿的粪便描述正确的是
- 墨绿色,黏稠,无臭味
 - 金黄色,糊状,无臭味,1~2次/天
 - 淡黄色,成形,有臭味,2~4次/天
 - 金黄色,均匀糊状,无臭味,2~4次/天
 - 软,黄,半成形
- 32.母乳喂养儿肠道主要的细菌是
- 肠链球菌
 - 大肠埃希菌
 - 双歧杆菌
 - 变形杆菌
 - 嗜酸杆菌
- 33.肠套叠的临床表现中,一般不会出现
- 腹痛
 - 发热
 - 呕吐
 - 腹块
 - 便血
- 34.用空气灌肠的方法治疗肠套叠,适用于
- 病程在 24 小时内,全身情况好,无腹胀、高热、中毒症状者
 - 病程在 48 小时内,全身情况好,无腹胀、高热、中毒症状者
 - 病程在 48~72 小时内,全身情况好,无腹胀、高热、中毒症状者
 - 病程在 24 小时内,伴有腹胀、高热、有中毒症状者
 - 病程在 48 小时内,伴有腹胀、高热、有中毒症状者
- 35.婴儿下呼吸道解剖特点是
- 黏液腺分泌不足
 - 管腔相对狭窄

- C.纵隔组织缺乏弹力
D.肺间质发育差
E.肺血管发育差
- 36.各种类型小儿肺炎的共同症状是
A.发热、咳嗽、喘及肺部细湿啰音
B.发热、咳嗽、肺部呼吸音粗糙
C.发热、咳嗽
D.发热、咳嗽、肺都干性啰音为主
E.发热、咳嗽、肺部哮鸣音为主
- 37.肺炎患儿发生严重腹胀对机体最大的危害是
A.进食减少
B.活动受限
C.影响呼吸
D.感觉痛苦
E.入睡困难
- 38.不属于哮喘性支气管炎的治疗原则的是
A.补液
B.控制感染
C.祛痰止咳
D.平喘
E.镇静
- 39.患儿,女,6个月。高热,中毒症状明显。呻吟,双肺有中细湿啰音,皮有少量猩红热样疹,诊断为金黄色葡萄球菌肺炎,其抗生素应用至体温正常后
A.1周
B.2周
C.3周
D.4周
E.5周
- 40.患儿,男,11个月。发热、咳嗽2天,以肺炎收入院。入院第2天,突然烦躁不安、呼吸急促,发绀。查体:体温38℃,呼吸70次/分,心率186次/分,心音低钝,两肺细湿啰音增多,肝肋下3.5cm。该患儿此时治疗措施最关键的是
A.大剂量使用镇静剂
B.间断吸氧
C.使用利尿剂
D.使用快速洋地黄制剂
E.吸痰清理呼吸道
- 41.卵圆孔瓣膜解剖上关闭的年龄是在出生后
A.1~2个月
B.2~3个月
C.4~6个月
D.5~7个月
E.7~9个月
- 42.常见的青紫型先天性心脏病是
A.室间隔缺损
B.房间隔缺损
C.动脉导管未闭
D.法洛四联症
E.肺动脉狭窄
- 43.小儿病毒性心肌炎的主要临床表现,不包括
A.不同程度心功能不全
B.心动过速、期前收缩
C.发病前有病毒感染史
D.乏力、咽痛、腹痛
E.反复发热惊厥
- 44.以下选项叙述正确的是
A.急性原发性血小板减少性紫癜一般无感染病史
B.急性原发性血小板减少性紫癜呈自限性经过,大部分转为慢性
C.慢性原发性血小板减少性紫癜多见于学龄儿童,病程超过6个月
D.原发性血小板减少性紫癜外周血血小板 $<100 \times 10^9/L$
E.原发性血小板减少性紫癜骨髓象巨核细胞数正常或减少
- 45.原发性肾病综合征最常见的并发症,也是引起死亡的原因是
A.感染
B.电解质紊乱和低血容量
C.高凝状态及血栓形成
D.急性肾衰竭

- E.生长延迟
- 46.患儿,女,20天。过期产儿。出生体重4.2 kg,哭声低哑,反应迟钝,食量少,黄疸未退,便秘,体重低,腹胀。该患儿最可能的诊断是
- A.甲状腺功能减低症
 B.苯丙酮尿症
 C.先天愚型
 D.先天性巨结肠
 E.黏多糖病
- 47.治疗先天性甲状腺功能减低症用甲状腺片治疗开始剂量(mg/d),下列哪项是正确的
- A.1~5
 B.5~10
 C.10~15
 D.15~20
 E.20~25
- 48.新生儿腰椎穿刺进针位置选择
- A.1~2 腰椎间隙
 B.2~3 腰椎间隙
 C.3~4 腰椎间隙
 D.4~5 腰椎间隙
 E.3~5 腰椎间隙
- 49.化脓性脑膜炎出现颅压高时首选的脱水剂是
- A.50%葡萄糖液
 B.20%甘露醇
 C.50%甘油口服
 D.呋塞米
 E.地塞米松
- 50.婴儿颅内压增高的主要标志是
- A.烦躁、嗜睡
 B.频繁、喷射性呕吐
 C.前囟张力增加
 D.肌张力增加
 E.惊厥
- 51.注意缺陷多动障碍病儿的临床表现不包括
- A.注意力缺陷
 B.活动过度
 C.任性冲动
 D.情绪不稳
 E.神经检查多异常,智商偏低
- 52.风湿性心肌炎患儿,应早期使用糖皮质激素,其疗程是
- A.1~2周
 B.3~4周
 C.5~6周
 D.8~12周
 E.12~16周
- 53.患儿,男,3岁。因发热,四肢关节游走性肿痛而入院查体发现,心率快176次/分,心音低钝,颈静脉怒张,肝大。立即进行治疗,不正确的是
- A.吸氧
 B.洋地黄制剂
 C.利尿剂
 D.维持电解质平衡
 E.阿司匹林
- 54.关于21-三体综合征下列哪项不正确
- A.本病不属于常染色体畸变
 B.小儿染色体病中最常见的一种
 C.母亲年龄越大本病的发病率越高
 D.60%的患儿在胎儿早期即夭折流产
 E.活婴中发生率约1/(600~800)
- 55.水痘的好发季节是
- A.夏秋
 B.秋冬
 C.冬春
 D.夏季
 E.春夏
- 56.确定传染病的隔离期的重要依据是
- A.潜伏期
 B.传染期
 C.前驱期
 D.症状明显期
 E.恢复期
- 57.下列哪项不是水痘的常见并发症

- A.蜂窝组织炎
B.脓包疮
C.丹毒
D.水痘脑炎
E.结核
- 58.猩红热病原治疗首选
A.红霉素
B.四环素
C.青霉素
D.头孢菌素
E.氯霉素
- 59.猩红热患儿皮疹特点,以下哪项不符合
A.皮疹粗糙,砂纸样
B.常有散在糠屑样脱皮
C.在腋窝、腹股沟等皮肤皱褶处皮疹稀疏
D.常在24小时内遍及全身
E.疹间皮肤亦呈红色
- 60.细菌性痢疾病理改变最严重的部位是
A.盲肠
B.直肠和乙状结肠
C.降结肠
D.回肠末端
E.升结肠
- 61.结核病预防性用药的指征不包括
A.结核菌素试验阳性者
B.密切接触家庭内开放性肺结核者
C.结核菌素试验新近由阴性转为阳性者
D.结核菌素试验阳性伴结核中毒症状者
E.3岁以下未接种卡介苗而结核菌素试验阳性者
- 62.结核病短程疗法的疗程一般为
A.3个月
B.6个月
C.9个月
D.12个月

E.18个月

63.患儿,男,8岁。因“低热、干咳、疲乏、食欲减退3周入院”。患儿于3周前无明显诱因出现低热,最高体温38.1℃,夜间易出汗,间中咳嗽、无痰。家中祖父有结核病病史,患儿未接种卡介苗。该患儿最可能的临床诊断是什么

- A.支原体肺炎
B.支气管肺炎
C.腺病毒肺炎
D.原发性肺结核
E.粟粒型肺结核

64.小儿结核性脑膜炎中期的主要临床表现为

- A.脑膜刺激征阳性
B.昏迷
C.频繁惊厥
D.性情
E.精神呆滞

(65~66题共用题干)

患儿,男,2岁。因糖尿病入院。

65.家属提出的不合理要求是

- A.为患儿测量血糖
B.与相关科室联系
C.观察有无并发症
D.自己为患儿提供饮食
E.监测患儿父母血糖

66.护士小吴护理该患儿时的任务不包括

- A.测量生命体征
B.按医嘱给药
C.为家属测量体温
D.建议患儿父母测量血糖
E.对家属进行相关知识的指导

(67~69题共用题干)

妈妈因担心10个月大女儿营养摄入不足,到儿童保健中心咨询。你作为保健门诊的护士为其做健康宣教。

67.告诉家长婴儿时期每天需要的能量为

- A. 55 kcal(230 kJ/kg)
 B. 150 kcal/kg(627 kJ/kg)
 C. 200 kcal/kg(836 kJ/kg)
 D. 1 100 kcal/kg(4 600 kJ/kg)
 E. 1 500 kcal/kg(6 270 kJ/kg)

68. 安排该小儿每天膳食中蛋白质、脂肪、碳水化合物提供热量的比值为

- A. 50%~60% : 15% : 35%~50%
 B. 35%~50% : 15% : 50%~60%
 C. 8%~15% : 35%~50% : 55%~65%
 D. 15% : 50%~60% : 35%~50%
 E. 50%~60% : 35%~50% : 15%

69. 此婴儿每天需要的水

- A. 100 ml/kg
 B. 125 ml/kg
 C. 150 ml/kg
 D. 175 ml/kg
 E. 200 ml/kg

(70~71 题共用题干)

一新生儿, 出生时胎龄为 295 天, 体重为 4 100 g, 出生体重位于同胎龄儿平均体重的第 90 百分位以上。

70. 该新生儿属于

- A. 早早产儿
 B. 早产儿
 C. 足月儿
 D. 过渡足月儿
 E. 过期产儿

71. 按体重和胎龄的关系分, 属于

- A. 正常体重儿
 B. 小于胎龄儿
 C. 适于胎龄儿
 D. 大于胎龄儿
 E. 巨大儿

(72~73 题共用题干)

患儿, 男, 1 岁。腹泻 3 月余。患儿发病以来食欲差。查体: 烦躁不安、明显消瘦、肌肉松弛, 体重 7.2 kg, 诊断为营养不良。

72. 该患儿属于

- A. 正常体重

- B. 轻度营养不良
 C. 中度营养不良
 D. 重度营养不良
 E. 极重度营养不良

73. 此患儿辅助检查中最突出的变化是

- A. 血清白蛋白浓度降低
 B. 胰岛素样生长因子 1(IGF-1) 水平下降
 C. 血清酶活性、血糖、血浆胆固醇水平降低
 D. 各种电解质、维生素及微量元素缺乏
 E. 生长激素分泌反而增多

(74~76 题共用题干)

患儿, 男, 3 岁。突然出现脐周持续性腹痛, 伴腹泻, 初为黄色水样便, 次数不定, 后转为红色果酱样血便, 伴特殊腥臭味, 同时患儿有腹胀、呕吐。查体: T 39℃, 精神萎靡, 腹部不固定性压痛。

74. 该患儿的诊断首先考虑为

- A. 腹泻
 B. 肠梗阻
 C. 肠套叠
 D. 消化不良
 E. 急性坏死性小肠结肠炎

75. 对该患儿饮食管理采取的措施是

- A. 禁食, 胃肠减压
 B. 喂糖水
 C. 喂稀释的牛奶
 D. 低脂饮食
 E. 少渣饮食

76. 该患儿宜采取的体位是

- A. 仰卧位
 B. 坐位
 C. 俯卧位
 D. 膝胸位
 E. 侧卧位或半卧位

(77~79 题共用题干)

患儿, 男, 18 个月。近 3 个月出现疲乏无力, 注意力不集中, 面色苍白, 轻微异食癖现象, 血常规: 血红蛋白 80 g/L, 红细胞 $2.5 \times$

$10^{12}/L$ 。

77.该患儿最可能的诊断是

- A.急性白血病
- B.再生障碍性贫血
- C.巨幼细胞贫血
- D.缺铁性贫血
- E.特发性血小板减少性紫癜

78.发生该病的主要发病机制是

- A.缺乏叶酸
- B.缺乏贮存铁
- C.缺乏维生素 B_{12}
- D.红细胞合成障碍
- E.骨髓造血功能障碍

79.患儿确诊后,医生及时给予补充所缺乏的造血物质,患儿治疗有效的最早期表现是

- A.面色红润
- B.网织红细胞升高
- C.血红蛋白升高
- D.铁蛋白升高
- E.红细胞升高

(80~81 题共用题干)

患儿,女,5个月。高热 $40^{\circ}C$ 5天,烦躁不安,抽搐3次。左外耳道积脓,左乳突处压痛。前囟紧张,布氏征(+),克氏征(+),血 WBC $19 \times 10^9/L$,糖 $2.7 mmol/L$,氯化物 $115 mmol/L$ 。

80.确诊该患儿主要依据

- A.病史
- B.血常规
- C.脑脊液检查
- D.神经系统检查
- E.头部 CT

81.不符合该患儿的治疗原则的是

- A.一旦确诊,尽快进行抗生素治疗
- B.选择对病原菌敏感的抗生素
- C.静脉给药
- D.用药至症状消失

E.易通过血脑屏障的抗生素

(82~86 题共用题干)

患儿,男,7岁。8月份外出旅游时发病。表现高热、惊厥3次急诊入院。体温 $39.5^{\circ}C$,面色苍白,四肢厥冷,意识模糊。

82.护士考虑该患儿是

- A.高热惊厥
- B.中毒型细菌性痢疾
- C.乙型脑炎
- D.麻疹脑炎
- E.结核性脑膜炎

83.为尽快做出诊断,医生急查大便,护士正确的做法是

- A.患儿无大便时,口服泻剂留取大便
- B.标本多次采集,集中送检
- C.如标本难以采集,可取隔日大便送检
- D.开塞露灌肠取便
- E.选取大便黏液脓血部分送检

84.本病确诊的最直接证据是

- A.黏液脓血便
- B.发病季节、不洁饮食及接触史
- C.血常规:白细胞升高
- D.大便培养出痢疾杆菌
- E.大便镜检:大量脓白细胞

85.确诊后,为预防传播,护士告诉家长隔离时间是

- A.临床症状好转
- B.临床症状消失
- C.3次大便培养阴性
- D.2次大便培养阴性
- E.1次大便培养阴性

86.本病最严重的临床表现是

- A.高热
- B.反复惊厥
- C.黏液脓血便
- D.感染性休克
- E.频繁吐泻

二、以下提供若干组考题,每组考题共同在考题前列出 A、B、C、D、E 五个备选答案。请从中选择一个与考题关系最密切的答案,并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。每个备选答案可能被选择一次、多次或不被选择。

(87~88 题共用备选答案)

- A. 乙肝疫苗
- B. 卡介苗
- C. 脊髓灰质炎疫苗
- D. 百日咳疫苗
- E. 麻疹疫苗

87. 属于基因工程疫苗的是

88. 属于灭活疫苗是

(89~91 题共用备选答案)

- A. 青霉素
- B. 红霉素
- C. 阿米卡星
- D. 利巴韦林
- E. 头孢菌素

89. 金黄色葡萄球菌肺炎选用

90. 支原体肺炎选用

91. 肺炎链球菌肺炎选用

(92~94 题共用备选答案)

- A. 20% 以上
- B. 25%~40%
- C. 40% 以上
- D. 30%~49%
- E. 50% 以上

92. 肥胖标准是体重超过同性别、同身高(长)正常小儿体重均值

93. 重度肥胖标准是体重超过同性别、同身高(长)正常小儿体重均值

94. 重度营养不良是体重低于同性别、同

身高(长)正常小儿体重均值

(95~97 题共用备选答案)

- A. 1.5~2 小时
- B. 2~3 小时
- C. 3~4 小时
- D. 4~5 小时
- E. 5~6 小时

95. 水在胃内排空的时间为

96. 母乳在胃内排空的时间为

97. 牛奶在胃内排空的时间为

(98~100 题共用备选答案)

A. 蛔虫移行发育

B. 蛔虫钻孔

C. 成虫游走

D. 成虫钻入胆道

E. 成虫代谢物被吸收

98. 某患儿因蛔虫病入院治疗,其表现为不安、易惊、磨牙、异食癖。嗜酸性粒细胞显著增高。造成这些临床表现的原因可能是

99. 蛔虫病患者出现发热、乏力、阵发性咳嗽,胸闷、痰少,痰中带血丝。出现这些临床表现的原因可能是

100. 若蛔虫病患者突起剧烈腹痛难忍,以右上腹为主,放射至右肩部及背部,并伴有频繁呕吐,出现这些临床表现的原因可能是

专业实践能力

一、以下每一道题下面有 A、B、C、D、E 五个备选答案。请从中选择一个最佳答案,并在答题卡上将相应题号的相应这母所属的方框涂黑。

- 1.关于护士素质要求下列哪项描述是错误的
- A.具有健康的体魄和豁达的胸怀
 - B.良好的忍耐力和自我控制能力
 - C.诚实的品格和慎独的修养
 - D.敏锐的观察力和分析判断能力
 - E.自主控制约束患儿的能力
- 2.青春后期的发育特点是
- A.体格生长明显加速
 - B.体格生长速度达到高峰
 - C.体格生长停止
 - D.刚刚开始生殖系统的发育
 - E.生殖系统发育已开始,但不成熟
- 3.皮肤感觉不包括
- A.触觉
 - B.痛觉
 - C.温度觉
 - D.浅感觉
 - E.深感觉
- 4.新生儿保健的重点应放在
- A.生后第 1 小时
 - B.生后 10 天内
 - C.生后 1 周
 - D.生后第 1 天
 - E.生后半个月内
- 5.培养幼儿良好生活习惯不包括
- A.睡眠习惯
 - B.个人卫生习惯
 - C.学习习惯
 - D.饮食习惯
 - E.排便习惯
- 6.学龄前儿童常见的心理行为问题为
- A.违拗
 - B.发脾气
 - C.出走
 - D.吮拇指、咬指甲
 - E.自杀
- 7.足月新生儿生后开奶的时间
- A.生后 1 小时之内
 - B.生后 2 小时
 - C.生后 4 小时
 - D.生后 10 小时
 - E.生后 24 小时
- 8.7~9 个月婴儿不可添加的辅食有
- A.饼干
 - B.烂面条
 - C.稠粥
 - D.水果
 - E.碎肉
- 9.学龄前儿童膳食安排错误的是
- A.粗粮、细粮搭配
 - B.避免坚硬食物
 - C.食品多样化
 - D.软硬接近成人
 - E.因生长发育平稳,蛋白质供给能量占 10%
- 10.对于婴儿住院时的护理叙述不正确的是
- A.呼唤患儿的全名
 - B.尽量保持患儿住院前的生活习惯
 - C.给予抚摸、拥抱、微笑
 - D.提供适当的感知觉刺激
 - E.协助进行动作训练
- 11.呼吸道感染(尤其是肺炎)、咳嗽明显时应
- A.少用祛痰药、多用镇咳药
 - B.多用祛痰药、少用镇咳药
 - C.同时使用祛痰药和镇咳药

- D.常规使用可待因
E.不使用祛痰药和镇咳药
- 12.外周静脉置入中心静脉导管的首选静脉是
- A.手背静脉
B.头静脉
C.肘正中静脉
D.贵要静脉
E.颈静脉
- 13.早产儿首要的护理措施是
- A.保暖
B.合理喂养
C.预防感染
D.密切观察病情
E.健康教育
- 14.新生儿窒息复苏胸外按压的深度为
- A.胸廓前后径 1/6
B.胸廓前后径 1/5
C.胸廓前后径 1/4
D.胸廓前后径 1/3
E.胸廓前后径 1/2
- 15.新生儿缺血缺氧性脑病的治疗叙述错误的是
- A.吠塞米肌内注射
B.吠塞米静脉推注
C.首选苯巴比妥控制惊厥
D.顽固性抽搐者加用安定
E.严重脑水肿可用甘露醇
- 16.新生儿颅内出血的护理错误的是
- A.保持安静,避免刺激
B.经常翻身,防止肺炎
C.注意保暖,必要时给氧
D.头肩部抬高 $15^{\circ} \sim 30^{\circ}$,以减轻脑水肿
E.不能进食者,给予鼻饲,少量多餐
- 17.新生儿颅内出血进行时,最先的治疗措施为
- A.及时注射维生素 K
B.及时吸氧
C.保持安静
D.注意保暖
E.补充营养
- 18.新生儿黄疸最常采用的治疗措施是
- A.抗生素
B.蓝光疗法
C.换血疗法
D.输血或白蛋白
E.暂不处理,继续观察
- 19.胆红素脑病多发生在生后
- A.4 小时内
B.12 小时内
C.24 小时内
D.1~2 天
E.2~7 天
- 20.患儿,男,胎龄 35 周。因胎动减少行剖宫产。出生后 4 小时出现进行性呼吸困难、呼气性呻吟、全身青紫,最可能的诊断是
- A.新生儿颅内出血
B.新生儿胆红素脑病
C.新生儿肺透明膜病
D.新生儿肺炎
E.新生儿败血症
- 21.新生儿,日龄 5 天。近 2 天来拒奶、不哭、少动。查体:体温 29°C ,面颊、四肢皮肤暗红色,僵硬。最适宜的处理方法是
- A.立即放入 $37 \sim 38^{\circ}\text{C}$ 的暖箱中
B.放入 $37 \sim 38^{\circ}\text{C}$ 的温水中行温水浴
C.放入 $30 \sim 32^{\circ}\text{C}$ 暖箱中
D.立即放入比其体温高 $1 \sim 2^{\circ}\text{C}$ 的暖箱中,每小时提高 $0.5 \sim 1^{\circ}\text{C}$
E.在一般病室中自然复温
- 22.患儿臀部、双下肢硬肿,其面积约占全身的
- A.20%
B.26%
C.34%
D.40%
E.48%
- 23.对缺血缺氧性脑病脑功能恢复有作

用的干预措施除外

- A.早期动作训练
- B.治疗师的干预
- C.早期治疗
- D.父母给予的抚触
- E.绝对卧床至康复

24.肥胖患儿控制饮食错误的是

- A.遵循逐渐减少的原则
- B.低脂肪
- C.优质高蛋白
- D.低糖
- E.青春期控制蛋白质摄入

25.营养不良伴下列哪种情况可静脉输

注白蛋白

- A.食欲很差
- B.吞咽困难
- C.吸吮力弱
- D.完全不能进食者
- E.低蛋白血症

26.患儿,男,12个月。维生素D缺乏性

佝偻病,建议家长带患儿活动正确的是

- A.尽早练习行走
- B.被动锻炼时要用力牵拉
- C.胸廓畸形做仰卧展胸运动
- D.“O”形腿按摩外侧肌群
- E.“X”形腿按摩外侧肌群

27.患儿,女,5个月。重症佝偻病,医嘱

肌肉注射维生素D,下列做法错误的是

- A.选用较粗的针头
- B.每次更换注射部位
- C.深部肌肉注射
- D.末次注射1个月后改为口服预防量
- E.注射后2~3日加服钙剂

28.儿科常用口服补液盐(ORS)溶液内

不含

- A.氯化钠
- B.氯化钾
- C.氯化钙
- D.葡萄糖

E.碳酸氢钠

29.在使用过程中需适时查血尿酸的是

- A.异烟肼
- B.利福平
- C.链霉素
- D.乙胺丁醇
- E.吡嗪酰胺

30.患儿,男,10个月。因腹泻、频繁呕吐就诊。遵医嘱予以禁食。护士告知家长患儿需禁食的时间为

- A.1~2小时
- B.2~4小时
- C.4~6小时
- D.6~8小时
- E.8~10小时

31.患儿,男,1岁。腹泻3天,每天4~5次,伴有轻度呕吐,皮肤弹性稍差。护士对家长饮食管理的指导不正确的是

- A.暂禁食4~6小时
- B.减少食量,停止不当饮食
- C.饮食调整应由少到多,由稀到稠
- D.可继续母乳喂养,但需暂停辅食
- E.应根据患儿的耐受情况对饮食进行调整

32.对急性坏死性小肠结肠炎的治疗,有助于清除肠坏死组织的治疗是

- A.禁食
- B.应用抗生素
- C.胃肠减压
- D.应用胰蛋白酶
- E.手术治疗

33.肠套叠患儿手术治疗后证明胃肠功能恢复正常的是

- A.不再哭闹,安静入睡
- B.停止呕吐
- C.排气、排便
- D.腹部肿块消失
- E.腹软,无压痛

34.口服补液盐(ORS)溶液中,钾的浓

度为

- A.0.1%
- B.0.15%
- C.0.2%
- D.0.25%
- E.0.3%

35.加水 100 ml 口服补液盐(ORS)溶液的张力是

- A.1/4 张
- B.1/3 张
- C.1/2 张
- D.等张
- E.2/3 张

36.新生儿时期需进行补液时,除急需扩充血容量者外,一般输液速度每小时不应超过

- A.2 ml/kg
- B.4 ml/kg
- C.6 ml/kg
- D.8 ml/kg
- E.10 ml/kg

37.预防急性上呼吸道感染发生,以下错误的是

- A.居住环境阳光充足,避免污染
- B.加强锻炼
- C.合理喂养
- D.上呼吸道感染流行季节做好隔离工作
- E.预防性的服用抗生素

38.患儿,男,2岁。发热,咳嗽2天,体温 37.9℃,呼吸困难,口周发绀,听诊右肺底闻及细湿啰音,诊断肺炎,该患儿最主要的护理诊断是

- A.体温过高
- B.气体交换受损
- C.清理呼吸道无效
- D.营养失调:低于机体需要量
- E.潜在并发症:心衰

39.对于肺炎患儿,病房适宜温度和相对

湿度是

- A.16~18℃,40%
- B.18~20℃,60%
- C.20~22℃,70%
- D.22~24℃,80%
- E.24~26℃,90%

40.肺炎患儿鼻前庭导管给氧,流量和浓度是

- A.0.5~1 L/min,<40%
- B.2~4 L/min,<50%
- C.5~6 L/min,<60%
- D.7~8 L/min,<70%
- E.9~10 L/min,<80%

41.保持呼吸道通畅,可采取的护理措施有

- A.经常清理鼻咽部的分泌物
- B.翻身叩背,体位引流
- C.超声雾化吸入
- D.定时吸痰
- E.以上都对

42.支气管哮喘最主要的护理诊断是

- A.体液过多
- B.焦虑
- C.有感染危险
- D.潜在并发症:心衰
- E.低效性呼吸型态

43.法洛四联症患儿发生缺氧发作时,应采取的卧位是

- A.仰卧位
- B.俯卧位
- C.坐位
- D.侧卧位
- E.膝胸位

44.不属于治疗病毒性心肌炎的药物是

- A.辅酶 Q₁₀
- B.1,6-二磷酸果糖
- C.维生素 C
- D.强心苷
- E.芪冬颐心口服液

45.病毒性心肌炎患儿总休息时间不得少于

- A.3个月
- B.4个月
- C.5个月
- D.6个月
- E.12个月

46.病毒性心肌炎恢复期应限制活动至少

- A.2个月
- B.3个月
- C.4个月
- D.5个月
- E.6个月

47.以下关于贫血的主要治疗措施不正确的是

A.营养性缺铁性贫血:祛除病因,补充铁剂

B.营养性巨幼细胞性贫血:祛除病因、补充维生素 B_{12} 、叶酸及维生素C

C.再生障碍性贫血:应用激素、中药、输血、抗生素、骨髓移植

D.G-6-PD缺乏症:祛除诱因,保持尿液呈酸性,输血

E.地中海贫血:对症治疗,输血和去铁治疗及脾切除术

48.关于铁剂的用药指导错误的是

- A.从小剂量开始,逐渐增加至全量
- B.与牛乳同服可以促进铁剂的吸收
- C.使用吸管服用铁剂以防牙齿被染黑
- D.首次注射右旋糖酐铁后应观察1小时
- E.一般在血红蛋白恢复正常后再继续用药8周

49.治疗特发性血小板减少性紫癜常与肾上腺皮质激素合用-促进疗效的药物是

- A.小剂量丙球蛋白
- B.大剂量丙球蛋白
- C.小剂量白蛋白
- D.大剂量白蛋白

E. α -干扰素

50.患儿,男,4岁。患有特发性血小板减少性紫癜,近期出现不爱活动、毛发干枯、发育迟缓、皮肤黏膜苍白、全身无力、头晕等现象,此期针对该现象的有效治疗是

- A.输注浓缩红细胞
- B.输注洗涤红细胞
- C.输注红细胞悬液
- D.输注血小板浓缩悬液
- E.输注新鲜血浆

51.给血友病患者输注凝血因子VIII应保持

- A.8小时1次
- B.10小时1次
- C.12小时1次
- D.18小时1次
- E.24小时1次

52.对于血友病患者的护理措施叙述正确的是

- A.出血部位早期应局部热敷
- B.凝血因子IX需每12小时输注1次
- C.疼痛主要发生在四肢
- D.出血停止时可做适当体疗以防关节畸形
- E.皮肤、黏膜出血者主要靠药物治疗止血

53.急性肾小球肾炎可下床轻微活动的标准是

- A.肉眼血尿消失、水肿消退、血压降至正常
- B.肉眼血尿消失、血压下降
- C.肉眼血尿消失、水肿消退、自觉症状好转
- D.水肿减退、体温正常
- E.血沉正常、体温正常、自觉症状好转

54.肾病综合征患儿水肿较重时护理应采取

- A.严格禁止钠的摄入
- B.绝对卧床休息至水肿消退

- C.保持患儿皮肤湿润
 D.少翻身以免皮肤擦伤
 E.休息时在肢体突出部位垫棉垫
- 55.下尿路感染的治疗首选
 A.复方磺胺甲噁唑
 B.氨苄西林
 C.头孢噻肟钠
 D.庆大霉素
 E.头孢曲松钠
- 56.患儿,女,7个月。近2天出现发热,在排尿时哭闹,尿液内有絮状物,略有臭味,初步诊断为“尿路感染”。为该患儿留取尿培养标本时操作正确的是
 A.放置留尿器取中段尿
 B.洗净会阴后放置留尿器取尿
 C.洗净会阴并用乙醇消毒后取尿
 D.30分钟未取到尿液需再次消毒
 E.尿标本若在30分钟内不能送检须放在冰箱内冷冻
- 57.无甲状腺组织的先天性甲状腺功能减低症出现症状的时间是
 A.出生时
 B.婴儿早期
 C.3~6个月
 D.6~9个月
 E.9~10个月
- 58.新生儿甲状腺功能减低症下列哪项是错误的
 A.精神及动作反应迟钝
 B.食量少,吞咽缓慢,常腹泻
 C.很少哭吵,声音嘶哑
 D.生理性黄疸时间延长
 E.不爱活动,多睡
- 59.颅内压增高时错误的护理措施是
 A.保持室内安静
 B.抬高头肩部侧卧位
 C.护理操作集中进行
 D.严密观察生命体征
 E.静脉用降低颅内压药应先慢后快
- 60.患儿腰椎穿刺术后,去枕平卧6h的目的是防止出现
 A.休克
 B.脑疝
 C.头痛
 D.惊厥
 E.呕吐
- 61.化脓性脑膜炎的护理应除外
 A.平卧头侧位
 B.控制输液速度
 C.昏迷时注意保护角膜
 D.按医嘱予甘露醇降颅压
 E.及早发现脑水肿,预防脑疝
- 62.关于小儿脑瘫,下列不正确的是
 A.功能训练和理疗是重要的治疗方法
 B.病情常进行性发展
 C.常有不同程度的脑皮质萎缩和脑室扩大
 D.病因为围产期窒息及核黄疸等
 E.常合并有精神发育异常
- 63.患儿,男,2岁4个月。出现发热、头痛、呕吐、烦躁,诊断为化脓性脑膜炎。其不正确的护理措施为
 A.严密观察患儿生命体征及瞳孔变化
 B.记录24小时出入量,防止体液不足
 C.保持室内安静,避免一切刺激
 D.为防止患儿呕吐,应减少患儿食物摄入
 E.给予20%甘露醇,降低颅内压
- 64.患儿,男,4个月。吐奶拒食,嗜睡2天。查体:前囟饱满,脐部少许脓性分泌物。该患儿的护理措施中哪项不正确
 A.功能训练和理疗并举
 B.防止外伤和意外
 C.教育家长进行肢体训练
 D.配合针刺治疗
 E.大量服用中枢抑制剂
- 65.风湿热患儿若伴有心力衰竭,心功能恢复正常后需再卧床

- A.1~2周
- B.2~3周
- C.3~4周
- D.1~2月
- E.3个月

66.幼年特发性关节炎与风湿热的主要区别是

- A.发热
- B.心肌炎
- C.关节炎
- D.X线显示关节面骨质损害
- E.血沉加快

67.幼年特发性关节炎急性期的关节护理,错误的是

- A.注意姿势,减轻疼痛
- B.预防压疮
- C.保持关节功能位
- D.保持关节屈曲姿势
- E.使用支架,避免关节畸形

(68~69题共用题干)

护士小吴在护理患病的小贝时,不仅注意满足小贝身心需要,以和蔼的态度、精湛的技术为小贝和家长服务,而且根据其年龄,帮助发展技能,及时纠正行为问题。同时认真回答家校提出的问题,向小贝家长进行科学育儿的宣传。

68.小吴所承担的正确角色是

- A.管理者/教养者/护理者
- B.护理者/管理者/咨询者
- C.管理者/教养者/教育者
- D.护理者/教养者/教育者
- E.咨询者/代言者/护理者

69.她的工作和其他科护士相比最明显的不同是要

- A.精湛的护理技术
- B.关注小儿技能的发展
- C.经常与家属交流
- D.加强临床护理
- E.满足心理需要

(70~71题共用题干)

患儿,男,7岁。平素体健,接种疫苗30分钟后,面色苍白,四肢湿冷,脉细速,呼吸困难。

70.此患儿最有可能发生了

- A.晕针
- B.低血糖
- C.过敏性休克
- D.过敏性皮炎
- E.感染中毒性休克

71.此时应采取的最关键措施是

- A.保暖
- B.平卧位
- C.饮糖水
- D.保持安静
- E.静脉注射1:1000肾上腺素

(72~75题共用题干)

母亲小章产后1小时,作为护士对她进行健康宣教。

72.告诉小章母乳喂养有很多优点,除外

- A.清蛋白较多
- B.含饱和脂肪酸多
- C.乙型乳糖为主
- D.钙磷比例合适
- E.含脂肪酶

73.有关母乳喂养指导不正确的是

- A.母乳喂养是最佳方式
- B.出生后即可让小兒试吸吮乳头
- C.规定喂母乳的间隔时间和哺喂时间
- D.乳母要保持充足的睡眠
- E.哺乳期间应多进汤水

74.指导母乳喂养正确的方法是

- A.一般采取卧位
- B.使患兒口含乳头及大部分乳晕
- C.母亲用两手指托住乳房防止堵住患兒鼻孔

儿鼻孔

- D.勿使一侧乳房排空后再喂另一侧
- E.喂后使患兒左侧卧位防止溢奶

75.告知母亲小章一般断乳时间为

- A.4~6 个月
- B.6~8 个月
- C.8~10 个月
- D.10~12 个月
- E.18 个月

(76~77 题共用题干)

患儿,男,3 岁。体重约为 14 kg。急性支气管炎入院,遵医嘱给予头孢拉定。已知头孢拉定针剂(粉剂)每瓶 0.5 g,小儿用量每天 50 mg/kg,一天 2 次,肌注。

76.若用 5 ml 注射用水稀释,则每毫升内含头孢拉定为

- A.40 mg
- B.60 mg
- C.80 mg
- D.100 mg
- E.120 mg

77.该小儿一天应用的剂量是

- A.400 mg
- B.500 mg
- C.600 mg
- D.700 mg
- E.800 mg

(78~80 题共用题干)

患儿,女,生后 3 天。皮肤、巩膜出现黄染,精神、食欲尚好,大便黄色糊状,查血清胆红素浓度 128 $\mu\text{mol/L}$,血常规无异常,小儿血型为 O 型,其母为 B 型。

78.该女婴最可能是

- A.溶血性黄疸
- B.阻塞性黄疸
- C.先天性黄疸
- D.肝细胞性黄疸
- E.生理性黄疸

79.此时最佳的处理措施为

- A.给予肝酶诱导剂
- B.立即蓝光照射
- C.观察黄疸变化
- D.给保肝药物

E.输清蛋白

80.对该女婴最主要的观察重点是

- A.尿量
- B.瞳孔
- C.体温变化
- D.体重
- E.皮肤、巩膜黄染的程度

(81~82 题共用题干)

患儿,女,4 个月。主因夜惊、夜啼睡眠不安,烦躁易激惹,到保健门诊就医。初步诊断为维生素 D 缺乏性佝偻病。

81.该患儿可能处在哪一期

- A.初期
- B.活动期
- C.激期
- D.恢复期
- E.后遗症期

82.口服维生素 D 预防量至少应到

- A.1 岁
- B.2 岁
- C.3 岁
- D.4 岁
- E.5 岁

(83~84 题共用题干)

患儿,男,7 岁。体重,33 kg,重度肥胖,参加减肥夏令营。

83.作为指导护士建议患儿每天可按理想体重所需热量减少

- A.5%
- B.10%
- C.15%
- D.20%
- E.30%

84.每天指导患儿活动坚持至少

- A.0.5 小时
- B.1 小时
- C.2 小时
- D.3 小时
- E.4 小时

(85~87 题共用题干)

患儿,女,2岁。运动发育落后,下肢肌张力增高,抱起时双腿交叉呈剪刀样。

85.该患儿的医疗诊断是

- A.大脑发育不全
- B.脑性瘫痪
- C.进行性肌营养不良
- D.脑膜炎后遗症
- E.癫痫

86.该患儿的首优护理问题是

- A.营养失调
- B.躯体移动障碍
- C.社交障碍
- D.有外伤的危险
- E.有感染的危险

87.该患儿的护理措施中不正确的是

- A.功能训练和理疗并举
- B.防止外伤和意外
- C.教育家长进行肢体训练
- D.配合针刺治疗
- E.大量服用中枢抑制剂

(88~90 题共用题干)

患儿,男,3岁。有饮食不洁史,高热2小时,体温40℃,呕吐一次,面色苍白,四肢冰冷,神志不清。

88.最有可能的诊断是

- A.流行性乙型脑炎
- B.中毒性细菌性痢疾
- C.病毒性脑炎
- D.结核性脑膜炎
- E.败血症

89.为进一步确诊,应立即进行的检查是

- A.胸片
- B.血常规
- C.脑脊液检查
- D.粪便检查
- E.血培养

90.防止出现循环衰竭治疗中错误的是

- A.低分子右旋糖酐扩容
- B.碳酸氢钠纠正酸中毒
- C.根据心功能使用毛花苷C
- D.多巴胺解除微循环痉挛
- E.1:4液扩容

二、以下提供若干组考题,每组考题共同在考题前列出A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个与考题关系最密切的答案,并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。每个备选答案可能被选择一次、多次或不被选择。

(91~93 题共用备选答案)

- A.连续性
- B.各系统器官发育的不平衡性
- C.顺序性
- D.个体差异
- E.阶段性

91.人体神经系统发育较早,生殖系统发育较晚,淋巴系统则先快而后回缩,该现象体现了生长发育的

92.小儿在一定范围内由于受到遗传、营养、环境、教养等因素的影响而产生了生长发育的

93.婴儿出生后先抬头,后抬胸,再会坐、立、行体现了生长发育的

(94~95 题共用备选答案)

- A.口服
- B.皮内注射
- C.皮下注射
- D.肌肉注射
- E.静脉注射

94.卡介苗的接种方法是

95.百白破混合疫苗的接种方法是

(96~98 题共用备选答案)

- A.水果汁、菜汤、鱼肝油制剂
- B.米汤、米糊、稀粥
- C.蛋黄、鱼泥、豆腐、动物血、菜泥、水果泥
- D.粥、烂面、饼干、蛋、鱼、肝泥、肉末

E. 稠粥、软饭、挂面、馒头、面包、豆制品、碎肉、油

96. 1~3 个月的辅助食品

97. 7~9 个月的辅助食品

98. 10~12 个月的辅助食品

(99~100 题共用备选答案)

A. 20~22 ℃

B. 22~24 ℃

C. 24~26 ℃

D. 26~28 ℃

E. 28~30 ℃

99. 足月儿病室环境温度为

100. 早产儿病室环境温度为



考前点睛班