

2020 年护士执业资格考试 12 日考题汇总 (网友回忆版)

婴儿死亡后尸检时间, 冷冻后放几天? 尸体解剖时间是多长时间

今天上午居然考了个布洛芬的作用机制

铜绿假单胞菌感染选什么溶液

输液时荨麻疹属于什么反应

护士的责任

中毒性痢疾常见病原体

视频题: 中凹卧位

1: 铺无菌盘时, 其无菌盘的有效期为: A

- A、4 小时
- B、12 小时
- C、24 小时
- D、8 小时
- E、48 小时

2: 不宜行保留灌肠的患者是 D

- A. 肠炎患者
- B. 长期失眠患者
- C. 慢性痢疾患者
- D. 直肠手术后患者
- E. 输液量多少

1. 下列信息中, 属于客观资料的是

- A. 头痛 2 天
- B. 感到恶心
- C. 体温 39℃
- D. 不易入睡
- E. 常有咳嗽

2. 某甲状腺功能亢进患者, 行基础代谢率测定时间宜在

- A. 下午 6 点、餐后和静卧
- B. 清晨、空腹和静卧
- C. 下午 4 点, 静卧
- D. 午间 12 点、餐后和静卧
- E. 下午 2 点, 静卧

一岁半小孩输液首选

答案: 头皮静脉

考试用书考点还原: 头皮静脉: 由于头皮静脉分布较广, 互相沟通, 交错成网, 且表浅易见, 不宜滑动, 便于固定, 因此, 常用于小儿的静脉输液。较大的头皮静脉有颞浅静脉、额静脉、枕静脉和耳后静脉。

铁和奥美拉唑不能同用的原因

答案：服用抑酸药物会影响铁的吸收。

顺铂会引起的最严重的输液反应是

答案：静脉炎

考试用书考点还原：

静脉炎出现的原因

(1) 主要原因是长期输注高浓度、刺激性较强的药液或静脉内放置刺激性较强的塑料导管时间过长，引起局部静脉壁化学炎性反应。

(2) 也可由于在输液过程中未能严格执行无菌操作，导致局部静脉感染。

输血出现荨麻疹是什么

答案：过敏反应

肌肉注射容易损伤的是哪个神经

答案：坐骨神经

氧的弥散能力是二氧化碳的多少倍

- A. 1/10 倍
- B. 1/20 倍
- C. 10 倍
- D. 20 倍
- E. 40 倍

疝的组成不包括

- A. 疝块
- B. 疝外被盖
- C. 疝内容物
- D. 疝环
- E. 疝囊

1. 患者女，41岁。患有肥厚型心肌病，因胸痛1小时急诊入院，首要的护理措施是

- A. 预防呼吸道感染
- B. 建立静脉通路
- C. 给予高热量饮食
- D. 给予1~2L/min吸氧
- E. 绝对卧床

2. 患者男，60岁。疑诊急性心肌梗死。最有诊断价值的心电图特征是

- A. T波倒置
- B. ST段弓背抬高
- C. P波高尖
- D. 出现Q波
- E. QRS波群增宽

1. 胆汁参与消化作用的主要成分是

金英杰教育

www.jinyingjie.com

- A. 胆色素
- B. 胆盐
- C. 胆固醇
- D. 脂肪酶
- E. 蛋白酶

答案：B

2. 常用于铜绿假单胞菌感染的漱口溶液是

- A. 0.3%醋酸溶液
- B. 0.1%醋酸溶液
- C. 1%~4%碳酸氢钠溶液
- D. 2%~3%硼酸溶液
- E. 1%~3%过氧化氢溶液

3. 发生医疗纠纷需要进行尸检，尸检时间应在死亡内多长时间内进行

- A. 12h 内
- B. 48h 内
- C. 72h 内
- D. 24h 内
- E. 36h 内

答案：B

4. 护患关系中最重要非技术关系是

- A. 道德关系
- B. 利益关系
- C. 工作关系
- D. 文化关系
- E. 法律关系

答案：A

5. 麻疹并发的肺炎类型是

- A. 支气管肺炎
- B. 间质性肺炎
- C. 真菌性肺炎
- D. 大叶性肺炎
- E. 支原体肺炎

答案：A

6. 人体是以什么为中心

- A. 五脏
- B. 经络系统
- C. 精、气、血、津液
- D. 六腑
- E. 五体、五官、九窍、四肢

答案：A

6. 关于原发性胃癌，错误的是

- A. 手术是治疗胃癌的首选方法
- B. 早期无明显症状和体征

- C. 血液转移为晚期胃癌最主要的转移途径
- D. 早期均出现恶心、呕吐宿食及进食梗阻感
- E. 好发于胃窦部

7. 50岁。诊断为风湿性心瓣膜病入院。目前该患者主诉活动无耐力的最主要相关因素是

- A. 冠状动脉灌注不足致心肌收缩无力
- B. 心排血量减少致组织缺血
- C. 胃肠道缺血致营养不良
- D. 体循环淤血致机体水肿
- E. 肺淤血致呼吸困难

1：护士的责任

答案及解析

帮助病人消除恐惧感，保持愉快的情绪;协助医生做好对病人及其家属的咨询，辅导，接诊

和治疗工作

2：中毒性痢疾常见病原体

答案及解析

痢疾杆菌

病原是痢疾杆菌、属于肠杆菌的志贺菌属

3：青霉素应用的首要注意事项

答案及解析

应用青霉素前应进行皮试，皮试阳性者禁用。

第一、应用青霉素前应进行皮试，皮试阳性者禁用。

第二、应该应用青霉素时应有完整的抢救设备，万一发生过敏反应可以及时有效地进行抢救。

第三、应用完青霉素应观察二十分钟，患者无不适感才可离开。

第四、不应该在极度饥饿时应用青霉素，以防空腹时积血对药物耐受性降低，诱发晕针等不良反应。

第五、两次应用时间不应相隔太近，速度不应太快。

第六、如果患者当天应用青霉素之后出现头晕，心慌，心悸，呼吸困难等应及时到医院就诊。

4：有输血过敏反应患者，现准备术中用血，最好是选用

答案及解析

急性等容血液稀释

考点：自体输血就是当病人需要输血时，输入病人自己预先储存的血液或失血回收的血液

5：患者家属质疑患者死亡要求尸检，最多可冷冻几天

答案及解析

具备尸体冻存条件的，可以延长至 7 日

6：患者家属质疑患者死亡要求尸检要在几个小时之内

答案及解析

应当在死亡后 48 小时内进行尸检

7：缺铁性贫血于再生障碍性贫血的区别

答案及解析

缺铁性贫血主要是由于体内缺少铁元素，从而导致血红蛋白数量减少。而再生障碍性贫血是由于造血的骨髓出现了疾病而导致的。

8：稽留热

答案及解析

金英杰教育

www.jinyingjie.com

体温上升后即恒定地维持在 39°C-40°C 的高水平，达数天或数周。24 小时内体温波动范围不超过 1°C

9：护患关系的三种基本模式

答案及解析

主动-被动型、指导-合作型、共同参与型

10：病室内噪音的控制应低于

答案及解析

45dB

病室内噪音的控制应低于 45dB，白天病区较理想的噪声强度为 35~40dB。噪声强度在 50~60dB 时，即能产生相当的干扰。当其高达 120dB 以上，可造成高频率的听力损失，甚至永久性失聪。长时间处于 90dB 以上高音量环境中，能导致耳鸣、血压升高、血管收缩、肌肉紧张，以及出现焦躁、易怒、头痛、失眠等症状。

11：心肺复苏的定义

答案及解析

心肺复苏术简称 CPR，是针对骤停的心脏和呼吸采取的救命技术。

真题 12：肝硬化患者并发上消化道出血时首选的药物是

答案及解析

垂体加压素

肝硬化患者并发上消化道出血多由食管-胃底静脉曲张破裂出血引起，首选的止血药是垂体加压素，通过减少门静脉血流量，降低门静脉压而控制出血。西咪替丁和奥美拉唑常用于消化性溃疡出血的治疗。

13：中凹卧位需将床头及床尾抬起的角度分别为

答案及解析

10°~20°，20°~30°

中凹卧位：要求：病人头胸抬高 10°~20°，下肢抬高 20°~30°适用范围：休克病人。

14：腮腺炎隔离时间

答案及解析

21 天

腮腺炎隔离时间为 21 天

15：处理针刺伤的首要步骤是

答案及解析

挤出污血

考点：处理针刺伤的首要步骤是挤出污血，然后冲洗、消毒

16：某护士在抽吸药液的过程中，不慎被掰开的安瓿瓶划伤手指，不妥的处理方法是

答案及解析

从伤口远心端向近心端挤压近心端挤压

考点：损伤后应从近心端向远心端挤压受伤部位

17：无菌盘在未污染的情况下有效期为

金英杰教育

www.jinyingjie.com

答案及解析

4 小时

下午

1: 按照《医疗事故处理条例》，医务人员在医疗活动中发生医疗事故争议的，应当

答案及解析

立即上报所在科室负责人

考点：医务人员在医疗活动中发生或者发现医疗事故、可能引起医疗事故的医疗过失行为或者发生医疗事故争议的，应立即向所在科室负责人报告，科室负责人应及时向本医疗机构负责医疗服务质量监控的部门或者专(兼)职人员报告;负责医疗服务质量监控的部门或者专(兼)职人员接到报告后，应立即进行调查、核实，将有关情况如实向本医疗机构的负责人报告，并向患者通报、解释。

2: 医生医嘱错误时，护士执行后患者死亡后患者死亡，责任在谁

答案及解析

如果明知是错误的还执行，因而造成严重后果，医生、护士按比例共同承担法律责任

3: 某护士在执行医嘱时，发现主治医生的处方有问题,该护士正确的做法是

答案及解析

立刻告诉主治医生

考点：护士在执行医嘱时，发现主治医生的处方有问题，应拒绝执行医嘱，并立即告诉主治医生。

4: 器官捐献的基本原则

答案及解析

任何组织和个人都不能强迫、欺骗或者利诱他人捐献人体器官，也不得通过捐献人体器官牟取任何经济利益

5: 患者，男，72岁。来自偏远山区，因次日要行胃部切除术，护士告诉患者：“您明天要手术，从现在开始，不要喝水，不要吃饭。”患者答应。第2天术前护士询问患者时，患者回答说：“我按你说的没有喝水，也没有吃饭，就喝了两袋牛奶。”影响护患沟通的因素为

答案及解析

金英杰教育

www.jinyingjie.com

理解差异

考点：护士在与患者的沟通过程中，由于护患双方在年龄、职业、教育程度、生活环境等方面的不同，产生理解差异，从而影响了护患沟通

6：关于尿液颜色的描述，正确的是

答案及解析

乳糜尿呈乳白色

考点：乳糜尿呈乳白色，由于尿液中有淋巴液，主要见于丝虫病。溶血反应的尿液呈酱油色。

胆红素尿呈深黄色或黄褐色，振荡后泡沫亦成黄色，主要见于阻塞性黄疸及肝细胞性黄疸。

血尿呈红色或棕色，含红细胞量多时呈洗肉水色，主要见于急性肾小球肾炎，泌尿系统结石、肿瘤]结核及感染等，脓尿尿液呈白色浑浊。

7：患儿，男，20日龄。口腔黏膜有白色乳凝状物附着，呈小片状。经检查诊断为“鹅口疮”。为患儿清洁口腔宜使用

答案及解析

2%碳酸氢钠溶液

8：老年病室温度应控制在

答案及解析

22~24℃

考点：婴儿室手术室、产房、老年病房等的室温以 22~24℃为宜。

9：一般病室温度应控制在

答案及解析

18~22℃

一般室温以 18~22℃为宜

10：七情的概述

答案及解析

喜、怒、忧、思、悲、恐、惊七种情志变化

11：八纲辨证不包括

答案及解析

浮沉

八纲分为表里、寒热、虚实、阴阳。

12: 接种卡介苗的正确方法是

- A.前臂掌侧下段 ID
- B.三角肌下缘 ID
- C.三角肌:下缘 H
- D..上臂三角肌 H
- E.臀大肌 IM

答案及解析

解析:接种卡介苗应用皮内注射法,皮内注射法是将少量无菌药液注入皮下组织的方法,左手绷紧皮肤,右手持注射器,示指固定针栓,针头斜面向上,并与皮肤呈 5° 角。皮内注射预防接种常选择上臂三角肌下缘(B对)呼吸深快,口唇发绀。

13: 患者 50 岁。诊断为风湿性心瓣膜病入院。目前该患者主诉活动无耐力的最主要的相关因素是

- A.冠状动脉灌注不足致心肌收缩无力
- B.心排血量减少致组织缺血
- C.胃肠道缺血致营养不良
- D.体循环淤血致机体水肿
- E.肺淤血致呼吸困难

答案及解析

解析:活动无耐力的最主要的相关因素是与心排出量减少有关。

1: 小儿腹泻轻度脱水的补液量

答案及解析

一般轻度脱水约 90~120ml/kg

2: 胆总管结石位置(图片题)

答案及解析

胆总管结石多位于胆总管的中下段

3: 对于先兆早产的孕妇,首要的治疗是

:答案及解析

金英杰教育

www.jinyingjie.com

抑制宫缩

考点：兆早产的首要治疗为抑制宫缩，同时还要积极控制感染、治疗合并症和并发症。对于宫缩进行性增强、有宫内感染、继续妊娠弊大于利、已达孕 34 周等孕妇，应终止妊娠。对于 35 周前的先兆早产患者应当给予糖皮质激素促胎肺成熟，降低新生儿死亡率、呼吸窘迫综合征的发病率。

4: 患者，男性，21 岁，大面积皮肤烧伤合并呼吸道烧伤，怀疑有铜绿假单胞菌感染。为该患者实施口腔护理时应选用的溶液是

- A.0.1%醋酸溶液
- B.复方硼酸溶液
- C.0.2%呋喃西林溶液
- D.2%~ 3%硼酸溶液
- E.生理盐水

答案及解析

A

【视频题】装热水袋分五个步骤，让我们看哪个步骤错了

【视频题】一个瘫痪的一个病人，给他护理，五步，然后就说哪一步错了。